

牙痛的初诊



疼痛	采集内容
时间	疼痛有多久？以前有过这样的疼痛吗？
位置	疼痛在何部位？是哪些牙齿？ 有无放射痛？
性质	自发痛还是激发痛？像什么样的痛？ 是钝痛还是锐痛？
规律	什么时间开始痛？是持续痛还是阵发痛？是 变化不定还是疼痛有特殊的模式？
伴随症状	有没有什么其他不适？
刺激缓解因素	什么因素使疼痛加重？ 什么因素使疼痛缓解？



疼痛的性质

· 自发痛 { 急性 多为尖锐疼痛
慢性 多为 钝痛

· 刺激痛 疼痛是否由刺激引起



疼痛的部位

能定位

不能定位



牙痛的鉴别




- 深龋
- 牙髓炎
 - 可复性牙髓炎
 - 不可复性牙髓炎
- 牙周炎
- 根尖周炎
- 其他

(一) 深龋

- 冷热刺激敏感
- 冷热刺激进洞引起疼痛
- 刺激一去除，疼痛立即停止



（二）可复性牙髓炎与不可复性牙髓炎的区别：

- 用温度刺激检测时，都可产生疼痛，当刺激去除后，前者疼痛立即消失，而后者则疼痛持续较久；
 - 前者无自发痛史，而后者常有自发痛。
- 

1、可复性牙髓炎的诊断要点：

- 主诉对温度一过性敏感，但**无自发痛**
- 有引起牙髓病变的牙体损害或其他病因
- 牙髓活力测试阈值降低或一过性敏感

【临床表现】

1、症状：

1 当患牙受到冷热温度刺激或酸甜化学刺激时，立即出现瞬间的疼痛反应，当刺激一去除，疼痛立即消失。

2 没有自发性疼痛。

(3) 叩痛（一）

4 牙髓活力测试反应降低，常出现一过性敏感

5 可找到能引起牙髓病变的牙体病损或牙周组织损害等病因；


2、不可复性牙髓炎

包括

- 急性牙髓炎（acute pulpitis）
- 慢性牙髓炎（chronic pulpitis）




急性牙髓炎的诊断要点：

- 典型的疼痛症状，发病急，疼痛剧烈
 - 患牙有引起牙髓病变的牙体损害或其他病因
 - 温度测试及叩诊可帮助定位患牙
- 



【临床表现】

- 1 自发性、阵发性疼痛；
 - 2 夜间痛；
 - 3 温度刺激加剧疼痛；
 - 4 疼痛沿三叉神经分布区域放射，不能自行定位。
- 

【临床表现】

体查：

- 1 牙体硬组织疾病 或 深牙周袋；
- 2 探诊引发剧痛；
- 3 温度测试**敏感**，牙髓活力测试**敏感或迟钝**；
- 4 可有垂直叩痛。



牙隐裂伴牙髓炎

【临床表现】

1. 未查及龋洞及深牙周袋
2. 可查见牙合面 有裂痕越过牙边缘嵴（呈墨浸样）
3. 咬合征阳性
4. 伴有牙髓炎或根尖周炎表现

Company Logo



【治疗要点】

1. 降低咬合
2. 制作带环或临时冠，以防在治疗期间牙齿裂开
3. 正确判断牙髓状态（牙髓充血或不可复性牙髓炎），决定是否做根管治疗。

逆行性牙髓炎 (retrograde pulpitis)

1. 有急性牙髓炎的症状
2. 可查到有深达根尖的牙周袋
3. X-ray有助于诊断

Company Logo

诊断要点

1. 近期出现牙髓炎症状，叩痛明显
2. 未查及引发牙髓病变的牙体硬组织疾病
3. 患牙有严重的牙周炎（伴有较深牙周袋或根分叉暴露）

逆行性牙髓炎感染来源于患牙周病所致的**深牙周袋**。

袋内的细菌及毒素通过**根尖孔或侧、副根管逆行进入牙髓**，引起根部牙髓的慢性炎症，也可由局限的慢性牙髓炎急性发作。

Company Logo



【临床表现】

- 1、急性牙髓炎症状；
- 2、慢性牙髓炎症状；
- 3、患牙均有较长时间牙周病史和较严重的牙周病；
- 4、无引发牙髓炎的牙体硬组织疾病；
- 5、叩诊（+）~（++），浊音。

Company Logo



【诊断要点】

- 不发生剧烈的自发性疼痛
- 长期冷热刺激病痛史和（或）自发痛史
- 咬合不适或轻度叩痛
- 可定位患牙
- 有引起牙髓病变的牙体损害或其他病因
- 温度测试以及叩诊可助定位患牙

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/457153015142006123>