

眼科专科护士考试试题及答案

1、感染性眼内炎常见临床表现不包括：（ ）

- A、视力下降
- B、眼球疼痛
- C、无充血
- D、红光反射消失

答案：C

2、术前准备中，病历与晶体核对的项目包括：

- A、姓名
- B、病历号
- C、眼别和晶体类型及度数
- D、以上都对

答案：D

3、部分性调节性内斜视的特点之一是：（ ）

- A、屈光矫正后仍残余内斜视
- B、发病较晚，在3岁以后
- C、内斜常呈交替性
- D、用调节视标易出现内斜视
- E、多为轻度远视

答案：A

4、美国老年协会对延伸护理的定义不包括以下哪项内容（ ）

- A、入院计划
- B、出院计划
- C、转诊
- D、回归家庭或社区后的持续随访

答案：A

5、以下关于干眼临床检查顺序描述正确的是？（ ）

- A、病史询问-症状询问-裂隙灯检查-泪膜破裂时间-荧光素染色-泪液分泌试验-睑板腺形态和功能检查-其他所需的辅助检查
- B、病史询问-症状询问-裂隙灯检查-泪膜破裂时间-泪液分泌试验-荧光素染色-睑板腺形态和功能检查-其他所需的辅助检查
- C、病史询问-症状询问泪液-分泌试验-裂隙灯检查-泪膜破裂时间-荧光素染色-睑板腺形态和功能检查-其他所需的辅助检查
- D、病史询问-症状询问-裂隙灯检查-泪液分泌试验-荧光素染色-泪膜破裂时间-睑板腺形态和功能检查-其他所需的辅助检查

答案：A

6、下列是南丁格尔的代表作的是()

- A、《护理札记》
- B、《关心：女性主义的伦理学和道德教育》
- C、《妇女与罪恶》
- D、《学会关心—教育的另一种模式》

答案：A

7、玻璃体化学成分含量最多的是()

- A、粘弹剂
- B、胶原
- C、水
- D、透明质酸钠

答案：C

8、视网膜中央动脉阻塞时瞳孔表现为()

- A、散大
- B、有的大，有的小
- C、正常大小
- D、缩小
- E、以上全对

答案：A

9、医疗机构应当对多重耐药菌感染患者和定植患者实施隔离措施不正确的是?()

- A、首选单隔离
- B、两人或者三人间
- C、可以将同类多重耐药菌感染患者或者定植患者安置在同一房间
- D、不可以同其他非多重耐药菌感染患者安置在同一房间

答案：B

10、小梁切除术中固定眼球常用哪种缝线做直肌牵引：()

- A、6-0 丝线
- B、10-0 缝线
- C、8-0 缝线
- D、4-0 黑线

答案：D

11、甲状腺相关性眼病患者哪条眼外肌最易受累?()

- A、下直肌

- B、外直肌
- C、提上睑肌
- D、以上都可能

答案：A

12、问题分类系统是由环境、生理、健康相关行为、()4领域共同组成

- A、社会心理
- B、安全意识
- C、认知行为
- D、意识形态

答案：A

13、实践眼科专科医护一体化过程包括()

- A、建立患者健康档案
- B、医护共同评估患者整体情况
- C、医护共同参与对患者的随访
- D、以上都是

答案：D

14、哪项检查用于检测泪膜稳定性？()

- A、泪液分泌试验
- B、眼表荧光素染色
- C、泪膜破裂时间
- D、眼红指数

答案：C

15、研究论文正文的书写内容不包括()

- A、结果
- B、讨论
- C、前言
- D、参考文献

答案：D

16、医院训练相较于家庭训练，存在的优点有()

- A、依从性高
- B、效果好
- C、训练人员专业
- D、以上都是

答案：D

17、“5S”活动的原则是()

- A、自我管理、勤俭节约、持之以恒，核心和精髓是素养
- B、科学性与艺术性
- C、设定目标及优先次序
- D、科学性和服务型
- E、培养和保护护士的良好素质

答案：A

18、人工晶体植入后解剖位置()

- A、睫状沟
- B、虹膜后
- C、晶体后囊前
- D、悬韧带前

答案：C

19、眼睑的结构由外向内依次为?()

- A、皮肤、肌层、纤维层、睑结膜
- B、皮肤、纤维层、肌层、睑结膜
- C、皮肤、肌层、纤维层、球结膜
- D、皮肤、纤维层、肌层、球结膜

答案：A

20、彩色色码图可直接显示角膜表面的屈光状态和高度：()

- A、冷色代表平坦的角膜区域
- B、暖色代表陡峭的角膜区域
- C、绿色是中间色
- D、以上都对

答案：D

21、眼眶骨折术后复视的护理措施中错误的是?()

- A、指导患者进行眼球运动训练
- B、观察患者复视程度
- C、术眼加压包扎，热敷
- D、消除患者焦虑、恐惧心理

答案：C

22、小梁切除手术中结膜下放置丝裂霉素的常用浓度为：()

- A、1~2mg/ml
- B、3~5mg/ml
- C、0.6~0.8mg/ml
- D、0.2~0.5mg/ml

答案：D

23、可以使各处理组分配更加平衡的随机分组方法是()

- A、单随机分组
- B、整群随机
- C、分层随机分组
- D、区组随机分组

答案：D

24、护理质量评价指标描述正确的是()

- A、代表性指重要性
- B、可操作性指可行性
- C、敏感性指具有代表性
- D、特异性指不能被取代

答案：D

25、下面属于文献内容特征检索语言的是()

- A、学科分类
- B、主题词
- C、著者姓名
- D、书名

答案：B

26、晶体脱位在 B 超显示中会有什么特点()

- A、玻璃体内椭圆形的光环，边界不清晰，内为无回声区
- B、脱离时间短，晶体光环回声强，可轻微移动，时间长回声增强，可见明确的声影
- C、一般固定于球壁的某一方向，不随眼球运动而动
- D、眼轴变长，球壁不规整，局限性呈锥形，矩形或弧形后凸

答案：C

27、人工晶体领用时出库单与晶体核对?()

- A、规格型号
- B、有效期
- C、度数
- D、以上都对

答案：D

28、干眼常见症状除外()

- A、干涩感或异物感
- B、畏光

- C、烧灼感
- D、眼痛伴同侧头痛

答案：D

29、眼球轻微钝挫伤时，下列描述正确的是？（ ）

- A、角膜形态正常
- B、房水冲击型虹膜及晶状体
- C、晶状体变形
- D、虹膜没有承受打击

答案：B

30、小梁切除术的眼压控制率在（ ）

- A、60%
- B、70%
- C、75%
- D、80%

答案：C

31、下列哪种疾病可通过产前 B 超观察到：（ ）

- A、先天性泪囊囊肿
- B、先天性鼻泪管阻塞
- C、先天性泪点缺失
- D、先天性泪管缺失

答案：A

32、球后注射是将局麻药注射入哪个位置（ ）

- A、结膜下
- B、肌锥间隙内
- C、肌锥旁
- D、肌锥后

答案：B

33、术中玻璃体涂片回报：G+球菌，经验性眼内注药为：（ ）

- A、万古霉素
- B、庆大霉素
- C、头孢他定
- D、地塞米松

答案：A

34、连续书写多少时间后需要休息眼睛？（ ）

- A、20 分钟

- B、30 分钟
- C、1 小时
- D、2 小时

答案：B

35、关于屈光手术术前宣教，下列正确的是()

- A、术前无需点抗生素眼药水
- B、手术当日可使用发胶
- C、停戴普通隐形眼镜一周以上
- D、停戴角膜塑形镜 2 周以上～

答案：C

36、球后出血预防对策中，错误的是()

- A、操作者熟悉眼及眼眶的解剖结构，掌握正确的操作方法，具备娴熟的操作技术
- B、操作完毕嘱病人勿用力挤压眼球，勿做重体力劳动
- C、可局部热敷，注意休息，以防球后继发性出血
- D、药前应抽取有无回血，无回血方可注药，若有回血应立即停止操作，压迫注射部位不少于 5min

答案：C

37、下列哪项属于深层激光角膜屈光手术()

- A、PRK
- B、T-PRK
- C、Epi-LASIK
- D、SMILE

答案：D

38、根据 Wilson 方法积血量分级，前房出血 2 级为:()

- A、前房出血占前房体积 1/4
- B、前房出血占前房体积～1/3
- C、前房出血占前房体积 1/3-1/2
- D、前房出血占前房体积全部

答案：C

39、治疗视网膜中央静脉阻塞的原则()

- A、控制眼压
- B、控制血糖
- C、降低血黏度
- D、降低眼压

E、以上全对

答案：E

40、鼻腔泪囊吻合术术前行泪囊碘油造影检查的目的是()

- A、排除急性泪囊炎可能
- B、排除泪囊肿瘤可能
- C、明确泪囊形态大小，排除手术禁忌证
- D、以上都不是

答案：C

41、眼痉挛患者 A. 型肉毒毒素注射方法错误的是：()

- A、上、下眼睑中内 1/3、中外 1/3
- B、外眦处皮下眼轮匝肌
- C、一次注射总量不限定
- D、可在眉弓处注射 1 个位点

答案：C

42、以下哪项是错误的()

- A、远视眼是焦点成像在网膜后方
- B、青少年要进行近视防控
- C、家长要定期安排孩子检查眼睛
- D、周边离焦设计只有在隐形眼镜上进行应用和设计

答案：D

43、高度近视并发的白内障常表现为()

- A、核性白内障
- B、周边性白内障
- C、后发性白内障
- D、晶体囊膜白内障

答案：A

44、A. I 技术与眼科医生在眼底筛查的比较()

- A、AI 技术的筛查不如普通眼科医师的精准
- B、AI 技术可以替代眼底医师进行眼底诊断。
- C、AI 技术只有在三甲医院中才能实现应用
- D、眼底病专业医师的培养比 AI 技术的应用更实在。

答案：B

45、灌注瓶高度与灌注压力的关系，通常用到的灌注压是 40.8cm，
()mmhg。

- A、20

B、30

C、40

D、50

答案：B

46、54年美国著名企业管理家彼得·德鲁克提出了()

A、目标管理办法

B、PDCA 循环管理

C、“5S”管理

D、护理质量保证

E、时间管理

答案：A

47、小梁切除术的主切口部位是的()

A、结膜

B、巩膜

C、角巩膜缘

D、任何部位都可以

答案：C

48、湿性 A. MD 病变特点主要脉络膜新生血管形成, OCT 影像主要特点是可见黄斑下方 RPE 隆起, RPE 下方见团状()反射

A、高

B、中等

C、低

D、非常低

答案：A

49、视网膜中央动脉阻塞此病多发生()

A、老年人

B、青年人

C、重体力劳动者

D、用脑工作

答案：A

50、泪膜最内层是哪一层? ()

A、脂质层

B、粘蛋白层

C、水液层

D、透明层

答案：B

51、2003年国际日间手术协会推荐日间手术定义为：在1个工作日内完成的手术，除外在医师诊所或医院开展的门诊手术。（）

- A、患者入院、手术和出院
- B、患者入院及出院
- C、患者入院及手术
- D、患者手术及出院

答案：A

52、造影前准备不包括以下哪项（）

- A、详细询问患者既往史及过敏史
- B、空腹
- C、准备皮试
- D、准备急救药品和器材

答案：B

53、属于类实验性研究的设计是（）

- A、断面研究
- B、纵向研究
- C、分析性研究
- D、非随机对照研究

答案：D

54、小梁切除手术中结膜下放置丝裂霉素的常用浓度为（）

- A、1~2mg/ml
- B、3~5mg/ml
- C、0.6~0.8mg/ml
- D、0.2~0.5mg/ml

答案：D

55、以下哪个不是医院伦理委员会的职能（）

- A、职称评审
- B、建议咨询
- C、制定规范
- D、教育培训

答案：A

56、当患者视力下降、眼痛就诊，可以暂时不做下面哪项检查（）

- A、视力检查
- B、眼压测量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/458140105044006037>