

公共卫生与预防医学考试题库

第一部分 单选题(300题)

1、手术台上器械护士需要增加无菌纱布,巡回护士取用的正确方法是【单选题】——

- A. 用消毒的手指拿取纱布
- B. 其他都不对
- C. 用灭菌换药镊子夹取纱布
- D. 戴手套拿取纱布 用无菌持物钳夹取纱布

【答案】：E

2、张某,大面积烧伤病人,创面出现铜绿假单胞菌感染,创面换药后敷料的正确处理方法为【单选题】——

- A. 扔入污物桶
- B. 焚烧
- C. 清洗后放日光下曝晒
- D. 清洗后再消毒 灭菌后再清洗

【答案】：B

3、手术部位感染的常见诱因【单选题】——

- A. 留置导尿管
- B. 气管切开
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

4、交叉感染【单选题】——

- A. 病人在家中已发生的感染
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

【答案】：C

5、牙科手机和耐湿热、需要灭菌的口腔诊疗器械,首选灭菌方法为【单选题】——

- A. 环氧乙烷熏蒸灭菌
- B. 压力蒸汽灭菌
- C. 等离子体灭菌
- D. 化学方法进行浸泡灭菌 煮沸消毒

【答案】：B

6、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查,错误的是【单选题】——

- A. 在使用抗菌药物前送标本
- B. 为节约经费,应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
- C. 采集标本后及时送检
- D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】：B

7、丙型病毒性肝炎宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：D

8、灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的是【单选题】——

- A. 过氧乙酸浸泡灭菌法
- B. 辐射灭菌法
- C. 戊二醛浸泡灭菌法
- D. 环氧乙烷灭菌法 压力蒸汽灭菌法

【答案】：E

9、B-D 试验只适用于【单选题】——

- A. 下排气压力蒸汽灭菌器检测
- B. 预真空压力蒸汽灭菌器监测
- C. 流动蒸汽灭菌器的监测
- D. 环氧乙烷灭菌器的监测 化学消毒液浸泡消毒时

【答案】： B

10、一次性使用的注射器使用后正确的做法是【单选题】——

- A. 直接放入耐刺、防渗漏的利器盒
- B. 使用后的一次性针头应重新套上针头套
- C. 使用后用手直接分离针头
- D. 使用后先浸泡再用手直接分离针头 使用后的针头连同注射器丢入医用垃圾桶内处理

【答案】： A

11、对病室进行紫外线消毒,下列做法错误的是【单选题】——

- A. 紫外线穿透性差,被消毒的物品不可有任何遮蔽
- B. 灯管使用期限不能超过 2000 小时
- C. 紫外线灯管要保持清洁透亮
- D. 为检查紫外线杀菌效果,定期进行空气细菌培养 照射前,先做好病室的清洁工作

【答案】： B

12、医院感染控制措施中泌尿道感染已证实有效的措施是【单选题】——

- A. 全身预防性抗生素的使用
- B. 膀胱冲洗或灭菌生理盐水或抗生素冲洗
- C. 限制插管时间,插入时的无菌技术,保持密闭引流
- D. 引流袋内加入抗菌剂,抗微生物药物包裹的导尿管 每天灭菌剂清洁会阴

【答案】： C

13、关于输血科预防医院内感染的措施,下列哪项是错误的【单选题】

- A. 保持环境清洁,每天清洁桌面
- B. 被血液污染的台面可用苯扎溴铵消毒处理
- C. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平
- D. 血浆置换术应在II类环境中进行并注意消毒隔离 每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和真菌

【答案】: B

14、下列细菌是目前医院感染常见的细菌,但除外【单选题】

- A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 沙门菌
- D. 铜绿假单胞菌 克雷伯肺炎杆菌

【答案】: C

15、根据我国卫生标准回答以下问题:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的应是【单选题】

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: A

16、为阳离子表面活性剂,对阴离子表面活性剂有拮抗作用的是【单选题】

- A. 乙醇
- B. 甲醛
- C. 苯扎溴铵
- D. 过氧乙酸 纯乳酸

【答案】: C

17、母婴室的医院感染管理错误的是【单选题】——

- A. 每名婴儿床位的占地面积不应少于 0.5-1m²
- B. 每张产妇床位的使用面积不应少于 5.5-6.5m²
- C. 严格探视制度,探视者应着清洁服装,洗手后方可接触婴儿
- D. 婴儿有感染性疾病时,应及时与其他婴儿隔离,但患儿母亲不需隔离 产妇在传染病急性期,应暂停哺乳

【答案】：D

18、下列各项中错误的是【单选题】——

- A. 医护人员在采血、输血前后要洗手
- B. 每批一次性注射器均应注明出厂日期、灭菌日期和有效期
- C. 使用过的一次性注射器、输血器材应消毒毁灭或焚烧
- D. 实验工作人员不能用口吸管,处理污物时要戴手套 艾滋病的潜伏期内无传染性

【答案】：E

19、烧伤病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：B

20、根据我国卫生标准回答以下问题:对本地区的医院内感染管理进行技术指导的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：B

21、有关医院内感染预防与控制的概念,错误的是【单选题】——

- A.

部分医院内感染是可以预防的

- B. 洗手是预防医院内感染的重要措施
- C. 医院内感染一定是由于消毒隔离缺陷所致
- D. 内源性医院内感染是医院内感染的重要原因 滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】：C

22、下述哪项不属于微生物【单选题】——

- A. 病毒
- B. 支原体
- C. 细菌
- D. 衣原体 钩虫

【答案】：E

23、关于医院内感染的概念,错误的是【单选题】——

- A. 医院内感染是指在医院内获得的感染
- B. 与上次住院有关的感染是医院内感染
- C. 出院之后发生的感染可能不是医院内感染
- D. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院内感染 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院内感染

【答案】：E

24、有关医院感染预防与控制的概念错误的是【单选题】——

- A. 洗手是预防医院感染的重要措施
- B. 滥用抗感染药物可致二重感染
- C. 部分医院感染是可以预防的
- D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致

【答案】：E

25、对高压蒸汽灭菌效果的监测,最可靠的方法是【单选题】——

- A. 化学指示卡法

B. 生物测试法

C.

化学指示管法

D. 化学指示胶带法 留点温度计法

【答案】：B

26、医院感染管理中,应重点管控的传染来源是【单选题】——

A. 动物

B. 血液制品

C. 各种病人

D. 食品 病原携带者

【答案】：C

27、保管无菌物品哪项是错误的【单选题】——

A. 无菌物品应放在清洁干燥、固定的地方

B. 取出的无菌物品不得放回无菌容器内

C. 无菌包必须注明灭菌日期

D. 无菌物与非无菌物应分别放置 已启用的无菌包,48h后必须重新灭菌

【答案】：E

28、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最迟不得超过【单选题】——

A. 72h

B. 48h

C. 24h

D. 12h 4h

【答案】：D

29、无菌盘铺好后有效期不超过多长时间【单选题】——

A. 2h

B. 12h

C. 16h

D. 4h 8h

【答案】：D

30、根据我国卫生标准回答以下问题:使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】: D

31、传染病区使用拖把的描述哪项是正确的【单选题】——

- A. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用
- B. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用
- C. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净
- D. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用 拖把应有明显的标记,严格分区使用

【答案】: A

32、为预防医院感染的发生,新生儿病房床位之间的间距不少于【单选题】——

- A. 100cm
- B. 90cm
- C. 80cm
- D. 70cm 60cm

【答案】: B

33、严密隔离的措施不对的是【单选题】——

- A. 隔离病房应经常开窗通风,不同类感染患者可同居一室
- B. 入室人员需戴口罩、穿隔离衣及戴手套。一切物品专用
- C.

接触每个患者及其污染物后,必须洗手

D. 污染的敷料及用品应装袋贴标签,送消毒处理 接触者尽可能注射疫苗或采取预防措施

【答案】: A

34、需要采取肠道隔离的疾病是【单选题】——

A. 肺结核

B. 艾滋病

C. 器官移植者

D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】: E

35、有关医院感染预防与控制的概念,错误的是【单选题】——

A. 部分医院感染是可以预防的

B. 洗手是预防医院感染的重要措施

C. 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致

D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 滥用抗感染药物可致二重感染

【答案】: C

36、除灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的压力蒸气灭菌法外,目前最常用的低温灭菌方法是【单选题】——

A. 环氧乙烷灭菌法

B. 戊二醛浸泡灭菌法

C. 辐射灭菌法

D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 微波灭菌法

【答案】: A

37、外科刷手时间每次【单选题】——

A. 3分钟以上

B. 1分钟以上

C. 2分钟以上

D. 5 分钟以上 4 分钟以上

【答案】： A

38、医院工作中洗手指征不正确的是【单选题】——

- A. 在进入和离开病房前洗手
- B. 处理干净的物品前,处理污染的物品后洗手
- C. 在高危病房中接触同一患者的不同部位前、后不必洗手
- D. 与任何患者长时间和密切接触后洗手 护理特殊易感患者前、后及在接触伤口前、后洗手

【答案】：C

39、医务人员在诊疗埃博拉患者时,须做好那种隔离措施【单选题】——

- A. 接触隔离
- B. 床边隔离
- C. 保护性隔离
- D. 空气隔离 消化道隔离

【答案】：A

40、使用无菌容器正确操作的是【单选题】——

- A. 容器内无菌物取出后,未污染物品可放回
- B. 开盖30分钟内盖好,以防污染
- C. 手指不可触及容器内面及边缘,盖的内面朝上
- D. 手抓边缘,以便持物牢靠 盖的内面朝下,以便放置稳妥

【答案】：C

41、肾移植患者应采取哪种隔离措施【单选题】——

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 消化道隔离 保护性隔离

【答案】：E

42、为预防医院感染的发生新生儿病房每张床位占地面积不应少于【单选题】——

- A.

5m²

B. 4m²

C. 3m²

D. 2m² 1m²

【答案】：C

43、新紫外线灯管输出功率不低于【单选题】——

A. 60uw/cm²

B. 100uw/cm²

C. 80uw/cm²

D. 90uw/cm² 110uw/cm²

【答案】：D

44、免疫功能低下病人的医院感染预防,下列哪项错误【单选题】——

A. 保护皮肤粘膜的完整性

B. 广谱抗生素肠道预防感染

C. 保护性隔离

D. 治疗局部感染病灶 疫苗注射

【答案】：B

45、关于消毒灭菌方法的选择,错误的是【单选题】——

A. 耐热耐湿的物品首选压力蒸气灭菌法灭菌

B. 手术器具与物品首选压力蒸气灭菌法灭菌

C. 消毒首选物理方法,不能用物理方法消毒时选择化学消毒方法消毒

D. 不耐热的物品如各种导管、精密仪器、人工移植物可以选择化学灭菌方法,如环氧乙烷灭菌 化学灭菌剂浸泡灭菌方便实用,应加以推广

【答案】：E

46、下列监测的控制指标中,哪项是错误的【单选题】——

A. 凡经消毒的物品不能检出任何微生物

- B. 手术室医务人员手上带菌数应少于 5 个/cm²
- C.

新生儿室、儿科病室的物体表面不得检出沙门菌

D. 手术室、产房、新生儿室空气中含菌量应少于 200 个/m³ 紫外线消毒灯管在使用中的功率应大于 70 μW/cm²

【答案】：A

47、发现医院感染流行或暴发流行趋势时,进行流行病学调查的基本步骤的第一步是【单选题】——

- A. 查找感染的
- B. 证实流行或暴发
- C. 查找引起感染的因素
- D. 分析流行或暴发的原因 制定防范措施

【答案】：B

48、肠道隔离的要求哪项不对【单选题】——

- A. 患者尽可能住隔离室,相同疾病可居一室
- B. 接触感染物时戴手套,若容易污染衣服时穿隔离衣,不需戴口罩
- C. 接触患者及污染物后,护理另一患者前要洗手
- D. 被粪便污染的物品要先清洗再送消毒处理 探视者进入隔离室前应通知值班护士

【答案】：D

49、目前医院内感染的研究对象主要是【单选题】——

- A. 住院患者
- B. 工作人员
- C. 陪护人员
- D. 探视人员 门诊患者

【答案】：A

50、根据我国下列卫生标准回答:对本地区的医院内感染管理进行技术指导的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C.

各级医院的医院感染管理委员会

- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：B

51、发现医院感染流行趋势时,医院感染科应在多长时间内报告医院主管领导和主管部门【单选题】——

- A. 48h
B. 36h
C. 24h
D. 12h 6h

【答案】：C

52、医疗废物【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
B. 带血的敷料
C. 两者均是
D. 两者均否

【答案】：C

53、根据我国卫生标准回答:监督、指导医师和医技人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
B. 省医院感染管理专家咨询委员会
C. 各级医院的医院感染管理委员会
D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：E

54、须现配现用的消毒剂是【单选题】——

- A. 过氧乙酸
B. 乙醇
C. 苯扎溴铵

D. 纯乳酸 甲醛

【答案】：A

55、和破损皮肤、黏膜相接触,而不进入无菌的组织内的器材【单选题】——

- A. 应用物理灭菌方法
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法
- D. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂 应用灭菌剂或高效消毒剂

【答案】：E

56、关于洗手指征,下述哪项是错误的【单选题】——

- A. 接触病人前后
- B. 进行无菌技术操作前后
- C. 戴口罩和穿、脱隔离衣前后
- D. 接触血液、体液和被污染的物品前后 脱手套后无须洗手

【答案】：E

57、无菌盘铺好后有效时间不超过【单选题】——

- A. 4h
- B. 6h
- C. 8h
- D. 5h 7h

【答案】：A

58、艾滋病人感染的预防,下列哪项错误【单选题】——

- A. 晚期病人应接受保护性隔离
- B. 病人血中 CD4+T 淋巴细胞 $<0.2 \times 10^9/L$ 时应接受抗肺孢子虫感染的预防
- C. 一旦发病即应用广谱抗菌药预防全身感染
- D. 医务人员受 HIV 污染针头刺伤,应立即报告并接受药物(AZT)预防 确诊并发感染应早期抗生素治疗

【答案】：C

59、给传染病患者发药,下述哪一项是错误的【单选题】——

- A. 协助同一病种的患者服药后,再给另一病种患者喂药
- B. 用过的药杯放在消毒液内浸泡
- C. 全病区发药完毕,按常规消毒药杯
- D. 车下层放盆,内盛消毒液 将备好的药及水壶放在治疗车上

【答案】：A

60、免疫功能低下病人的医院内感染预防,下列哪项错误【单选题】——

- A. 保护皮肤黏膜的完整性
- B. 广谱抗生素肠道预防感染
- C. 保护性隔离
- D. 治疗局部感染病灶 疫苗注射

【答案】：B

61、根据我国卫生标准回答:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】：A

62、根据我国卫生标准回答以下问题:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C.

细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】：A

63、煮沸消毒灭菌时,错误的操作是【单选题】——

- A. 大小相同的盆应重叠
- B. 玻璃类用纱布包好
- C. 物品完全浸没在水中
- D. 煮沸过程中再加物品,应在第二次水沸后重新计时 有轴节的器械宜打开

【答案】：A

64、洗手过程中手触及未消毒物品应【单选题】——

- A. 更改浸泡用药液
- B. 重新洗手
- C. 延长浸泡时间
- D. 继续原有洗手步骤 多戴一副手套

【答案】：B

65、超广谱酶(ESBLs)菌株所致感染的最佳选药是【单选题】——

- A. 头孢西丁
- B. 阿莫西林
- C. 哌拉西林
- D. 头孢噻肟 氨曲南

【答案】：A

66、严密隔离的标志是【单选题】——

- A. 红色标志
- B. 棕色标志
- C. 黄色标志

D. 绿色标志 灰色标志

【答案】： C

- 67、对医院新建设施提出卫生学标准的审定意见【单选题】——
- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
 - B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
 - C. 医院的医院感染管理委员会
 - D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：C

- 68、从医疗护理角度讲戴手套的作用不正确的是【单选题】——
- A. 手套可减少患者身上的微生物传播给医务人员的可能性
 - B. 手套可以防止医务人员把自身手上的菌群转移给患者的可能性
 - C. 手套可以防止医务人员成为传播微生物的媒介
 - D. 手套可以防止医务人员将从患者或环境中污染的病原在人群中传播 戴手套后可以不必洗手

【答案】：E

- 69、预真空蒸汽灭菌器手术器械包的体积不得超过多少【单选题】——

- A. 30cm×30cm×30cm
- B. 30cm×30cm×50cm
- C. 30cm×30cm×45cm
- D. 30cm×30cm×25cm 35cm×35cm×50cm

【答案】：B

- 70、根据我国卫生标准回答:接触黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】：B

71、I类、II类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu/cm}^2$,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu/cm}^2$,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu/cm}^2$,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu/cm}^2$,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu/cm}^2$,未检出致病菌

【答案】：D

72、层流洁净室【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu/m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu/cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu/cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu/m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu/cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu/cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu/m}^3$,物体表面 $\leq 10\text{cfu/cm}^3$,医护人员手 $\leq 10\text{cfu/cm}^2$
- D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu/cm}^3$,医护人员手 $\leq 15\text{cfu/cm}^2$ 空气 $\leq 1000\text{cfu/m}^3$,物体表面 $\leq 8\text{cfu/cm}^3$,医护人员手 $\leq 8\text{cfu/cm}^2$?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：A

73、霍乱病人应采取【单选题】——

- A. 接触隔离
- B. 保护性隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 消化道隔离 严密隔离

【答案】：E

74、关于医院感染的概念错误的是：【单选题】——

- A. 入院时处于潜伏期的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C.

慢性感染急性发作是医院感染

- D. 与上次住院有关的感染是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的感染不是医院感染

【答案】：C

75、属于低效消毒剂的是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
B. 新洁尔灭
C. 两者均是
D. 两者均否

【答案】：C

76、取无菌纱布的正确方法是【单选题】——

- A. 戴手套拿取纱布
B. 以上都不是
C. 用灭菌换药镊子夹取纱布
D. 用无菌持物钳夹取纱布 用消毒的手指拿取纱布

【答案】：D

77、使用无菌包的正确方法是【单选题】——

- A. 打开无菌包时,必须保护包内面的无菌面
B. 从无菌包内取出的物品若未使用,应立即放回包内
C. 无菌包潮湿时,应待干燥后再用
D. 打开无菌包时,应用手指捏住包布四角的内面展开 无菌包打开后无须注明开包日期和时间

【答案】：A

78、取无菌溶液时,先倒去少量溶液的的目的是【单选题】——

- A. 冲洗瓶口
B. 练习操作,以便从原处倒出
C. 减少瓶内溶液
D. 检查液体是否清亮 检查瓶口是否有裂缝

【答案】：A

79、传染病区所采取的隔离措施,下列不正确【单选题】——

- A. 同住一室的不同的呼吸道传染病患者只要做好床边隔离
- B. 给同一种病种患者测血压时可不换血压计
- C. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房
- D. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣 严密隔离患者禁止走出病房

【答案】： A

80、预防免疫功能低下病人发生医院内感染,下述哪项是不正确的【单选题】——

- A. 注射相关疫苗
- B. 全身使用广谱抗生素预防感染
- C. 治疗局部感染病灶
- D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】： B

81、某医院收入一痢疾患者,该患者在入院时又感染了白喉杆菌,入院后发生白喉,这属于【单选题】——

- A. 交叉感染
- B. 医源性感染
- C. 自身感染
- D. 带入感染 以上都不是

【答案】： D

82、医院感染区别于其他感染的不同点错误的是【单选题】——

- A. 医院感染的菌株大多为多重耐药性
- B. 易感人群抵抗力低,病死率高
- C. 在医院内一旦发生医院感染很容易引发群发性感染
- D. 在医院感染治疗效果不好,一般不会出现死亡 医院感染病原体来源广泛

【答案】： D

83、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最好在几小时内实施
【单选题】——

- A. 24h
- B. 12h
- C. 8h
- D. 4h 2h

【答案】： D

84、根据我国卫生标准回答以下问题：接触皮肤的医疗用品【单选题】
——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ，致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ，致病性微生物不得检出

【答案】： C

85、关于医院感染知识培训错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 非专职人员每年不少于 2 小时培训
- C. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- D. 实习医师必须培训 进修医师必须培训

【答案】： B

86、属半污染区的区域是【单选题】——

- A. 治疗室、值班室
- B. 走廊及病区化验室
- C. 配餐室与更衣室
- D. 浴室、洗涤间 病室及厕所

【答案】： B

87、消毒的含义是【单选题】——

- A. 杀灭物品上的所有微生物
- B. 杀灭物品上的芽孢
- C. 消灭包括细菌芽孢在内的各种病原微生物
- D. 消除物品上的一切污秽 消灭除细菌芽孢外的各种病原微生物

【答案】：E

88、输血科预防医院感染的措施错误的是：【单选题】——

- A. 每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和霉菌
- B. 保持环境清洁,每天清洁桌面
- C. 血浆置换术应在Ⅱ类环境中进行并注意消毒隔离
- D. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平
被血液污染的台面可用新洁尔灭消毒处理

【答案】：E

89、患者出院后,需将其用过的被褥在阳光下曝晒6小时,可达到哪种效果【单选题】——

- A. 隔离
- B. 清洁
- C. 灭菌
- D. 灭虱 消毒

【答案】：E

90、下列不属于内源性感染情况的是【单选题】——

- A. 寄居部位的改变
- B. 宿主的局部或全身免疫功能下降
- C. 菌群失调和二重感染
- D. 通过空气或水源的感染 潜在感染活化:如疱疹病毒、结核等

【答案】：D

91、医疗废物为【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：C

92、根据我国卫生标准回答以下问题：根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求，对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

93、下列关于禽流感的描述不对的是【单选题】——

- A. 是禽流行性感冒的简称
- B. 由A型禽流感病毒引起的一种禽类传染病
- C. 由H5N1血清型引起的禽流感称高致病性禽流感
- D. 属甲类传染病之一 人感染高致病性禽流感可以在人与人之间传播

【答案】：D

94、传染病区使用的拖把【单选题】——

- A. 每次使用后清水冲洗，悬挂晾干备用
- B. 先用1000mg/L有效氯消毒剂适量倒在污染地面30min后，用拖把拖干净
- C. 应先消毒，用500mg/L有效氯消毒液浸泡30min，再用水洗干净，然后用500mg/L有效氯消毒液浸泡30min，悬挂晾干备用
- D. 拖把应有明显的标记，严格分区使用

拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用

【答案】： C

95、关于医院感染知识培训要求,下述中错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- C. 非专职人员每年培训不少于 2 小时
- D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】： C

96、关于使用中的灭菌剂的监测正确的是【单选题】——

- A. 生物监测每周一次
- B. 生物监测每天一次
- C. 生物监测不得检出致病微生物
- D. 化学监测每月一次 灭菌后的物品不得检出任何微生物

【答案】： E

97、传染病院应设置在下列哪个地方【单选题】——

- A. 远离公共场所
- B. 交通便利的地方
- C. 城市中心
- D. 靠近综合性医院 水源充足的地方

【答案】： A

98、III类区域空气消毒合格的标准是【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 400\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 300\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌

【答案】： C

99、对门诊胃镜室使用过的纤维胃镜进行消毒,应该选择的消毒溶液是

【单选题】——

- A. 1%氯胺溶液
- B. 5%碘伏
- C. 0.1%苯扎溴铵溶液
- D. 2%碱性戊二醛溶液 0.2%过氧乙酸溶液

【答案】： D

100、医院发现一次性使用无菌医疗用品不合格产品或质量可疑产品时,应【单选题】——

- A. 立即停止使用,与供应商联系进行退、换货处理
- B. 立即停止使用,并报告医院管理部门进行退、换货处理
- C. 可继续使用,但应注意密切观察有无不良反应发生
- D. 立即停止使用,并及时报告当地药品监督管理部门,不得自行作退、换货处理 立即停止使用,并及时报告医院管理部门,就地销毁不合格产品

【答案】： D

101、下列关于自身感染的描述正确的是【单选题】——

- A. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- B. 病人在家中已发生的感染
- C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染 病原体来源于病人本身的感染

【答案】： E

102、治疗室的管理中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 注射治疗时要铺无菌盘,抽出的药液存放不能超过2小时
- B. 治疗室中开启的各种溶酶不能超过24小时
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需在4小时内使用
- D. 碘酒、乙醇瓶应保持密闭,每周更换并灭菌容器1~2次

经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不能超过 48 小时

【答案】: E

103、婴儿室【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】: B

104、巴氏消毒常用消毒指标是【单选题】——

- A. 消毒温度为 $65 \sim 75^{\circ}\text{C}$,作用时间 $10 \sim 15\text{min}$
- B. 消毒温度为 $70 \sim 80^{\circ}\text{C}$,作用时间 $5 \sim 8\text{min}$
- C. 消毒温度为 $45 \sim 55^{\circ}\text{C}$,作用时间 $20 \sim 25\text{min}$
- D. 消毒温度为 $85 \sim 95^{\circ}\text{C}$,作用时间 $10 \sim 15\text{min}$ 消毒温度为 62°C ,作用时间 30min

【答案】: E

105、无菌盘铺好后有效期不超过【单选题】——

- A. 8h
- B. 2h
- C. 16h
- D. 12h 4h

【答案】: E

106、美国一护士在护理埃博拉感染患者时,也被诊断为埃博拉出血热,其属【单选题】——

- A. 外来病毒感染
- B. 非接触性感染
- C. 自患传染性疾病
- D. 医院感染 因空气造成的感染

【答案】: D

107、医院感染控制措施中血管内装置感染,已证实有效的措施错误的是【单选题】——

- A. 所有导管均应为密闭系统并限制插管的持续时间
- B. 局部皮肤准备,插管时的无菌技术,疑有感染应立即拔除导管
- C. 中心血管导管插管时外科灭菌
- D. 限制敷料更换的频率,短期使用抗生素包裹的导管,限制插管时间
抗微生物药膏用于皮肤准备

【答案】： E

108、下列抗菌药物中哪一种为窄谱抗菌药【单选题】——

- A. 万古霉素
- B. 阿米卡星
- C. 阿奇霉素
- D. 磷霉素 环丙沙星

【答案】： A

109、WHO 认为医院监测的最终目标是【单选题】——

- A. 为了减少医院感染和由此所造成的损失
- B. 降低医院感染率,减少获得医院感染的危险因素
- C. 建立医院的医院感染发病率基线
- D. 利用调查资料说服医务人员遵守感染控制规范与指南 评价效果,调整和修改感染控制规范

【答案】： A

110、以下哪个手术属于 I 类手术【单选题】——

- A. 脑胶质瘤切除术
- B. 肛瘘切除术
- C. 胰十二指肠切除术
- D. 前列腺摘除术 肺叶切除术

【答案】： A

111、根据我国卫生标准回答以下问题:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

112、细菌耐药最常见的机制是【单选题】——

- A. 细菌改变代谢途径
- B. 产生抗生素灭活酶
- C. 抗菌药物作用靶位改变
- D. 细菌细胞膜渗透性改变使抗菌药物不易进入细菌细胞 细菌细胞将抗菌药物排除细菌

【答案】：B

113、属于低水平消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 碘伏
- D. 氯己定 异丙醇

【答案】：D

114、每日 I 级手术间开始前,提前开启净化空调系统时间【单选题】——

- A. 10 分钟
- B. 30 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟 40 分钟

【答案】：B

115、下列消毒剂中属高水平消毒剂的是【单选题】——

A. 戊二醛

B.

聚维酮(络合碘)

- C. 苯扎溴铵(新洁尔灭)
- D. 乙醇 碘酊

【答案】：A

116、做洁净手术间空气培养,培养皿暴露时间【单选题】——

- A. 10 分钟
- B. 20 分钟
- C. 15 分钟
- D. 30 分钟 40 分钟

【答案】：D

117、为节省时间,护士给传染病患者发药时所使用的下述哪一项方法是错误的【单选题】——

- A. 用过的药杯放在消毒液内浸泡
- B. 车下层放盆,内盛消毒液
- C. 按床号依次给患者服药
- D. 全病区发药完毕,按常规消毒药杯 将备好的药及水壶放在治疗车上

【答案】：C

118、根据我国下列卫生标准回答:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

119、肝炎肠道门诊的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 诊室、人员、器械、用具固定

B. 挂号、候诊与普通门诊分开

C.

肝炎按黄疸和无黄疸进行隔离

- D. 取药、注射、采血、化验与普通病人分开 接触病人后洗手

【答案】：C

120、一次性使用无菌医疗用品用后的处理正确的是【单选题】——

- A. 进行消毒、毁形、进行无害化处理
B. 经消毒灭菌后重复使用
C. 集中管理,统一交废品公司回收利用
D. 经管理部门统一进行消毒处理后可重复使用 先浸泡,再清洗,然后再进行灭菌处理

【答案】：A

121、张某,以“急性甲型肝炎”收住院治疗,病人正在治疗期间。对该病人应做何种隔离【单选题】——

- A. 保护性隔离
B. 消化道隔离
C. 严密隔离
D. 昆虫隔离 呼吸道隔离

【答案】：B

122、属于高度危险性物品的是【单选题】——

- A. 手术器械和用品
B. 体温表
C. 呼吸机管道
D. 胃肠道内窥镜和气管镜 麻醉机管道

【答案】：A

123、调查医院感染的最佳方法【单选题】——

- A. 从医院微生物室获得病例来源
B. 临床医师填报病例
C. 专职护士到病室前瞻性发现病例
D. 病室监控护士报告病例

专职护士到病案室从出院病历中查找病例

【答案】：C

124、用平车护送伤寒患者摄片,正确的方法是【单选题】——

- A. 协助患者直接卧于平车上
- B. 铺清洁大单于平车上,协助其卧上
- C. 协助患者卧于平车上后,再盖上一条清洁大单
- D. 患者更换清洁衣裤后,卧于平车上 将患者床单铺在平车上,协助其卧上

【答案】：B

125、下列哪项违反了隔离原则【单选题】——

- A. 给同一种病种患者测血压时可不换血压计
- B. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣
- C. 严密隔离患者禁止走出病室
- D. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房 只要做好床边隔离,不同的呼吸道传染病患者可同住一室

【答案】：E

126、手术部位感染的常见诱因是【单选题】——

- A. 留置导尿管
- B. 气管切开
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

127、医源性感染【单选题】——

- A. 病原体来源于病人本身的感染
- B. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人 病人在家中已发生的感染

【答案】：B

128、医院内感染主要发生在【单选题】——

- A. 门诊、急诊病人
- B. 探视者
- C. 医务人员
- D. 住院病人 陪护人员

【答案】：D

129、医院感染的病原特点不对的是【单选题】——

- A. 90%为条件致病微生物,少数为致病微生物
- B. 一种病原引起多部位感染或一个部位有多种细菌感染
- C. 近年来 G-杆菌中非发酵菌和 G+球中的表皮葡萄球菌以及真菌下降趋势
- D. 多为耐药菌或多重耐药菌 免疫功能低下患者的病原谱广,病原随抗生素应用或免疫功能缺损程度而有变迁

【答案】：C

130、隔离衣一般情况下更换时间是【单选题】——

- A. 72h
- B. 24h
- C. 6h
- D. 12h 48h

【答案】：B

131、根据我国卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

132、下列概念中不正确的是:【单选题】——

- A.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/465301201332011204>