

初级护师考试真题精选及答案 8 篇

初级护师考试真题精选及答案 8 篇 第 1 篇

张女士，45 岁，诊断为“十二指肠溃疡”。其排泄物消毒时适宜选择的方法是

- A. 浸泡法
- B. 擦拭法
- C. 喷雾法
- D. 熏蒸法
- E. 干粉搅拌法

正确答案：E

下列对弗洛伊德理论的批评，不公允的是（ ）

- A、潜意识的思想不是新东西
- B、该理论过于主观，完全不可验证
- C、使用了不具代表性的数据建立他的理论
- D、过分强调本能
- E、对普遍的人性消极面的描述

参考答案：B

35 岁，女性，风湿性心脏病心力衰竭患者，应用洋地黄和利尿剂后，出现恶心、呕吐，心电图示室性早搏呈二联律及三联律。其次应注意补充

- A. 硫酸镁
- B. 钾盐及苯妥英钠
- C. 氯化钙
- D. 碘剂
- E. 高渗葡萄糖

正确答案：B

由于水摄入不足，尿量及尿比重可出现下列哪种情况

- A. 尿量减少，比重低
- B. 尿量减少，比重增加
- C. 尿量正常，比重正常
- D. 尿量增加，比重高
- E. 无尿

正确答案：B

护理人员在未取得执业证书期间可以做的临床护理工作是

- A、与患者沟通观察病情
- B、静脉穿刺
- C、肌内注射
- D、过敏试验
- E、给患者服药

参考答案：A

初级护师考试真题精选及答案 8 篇 第 2 篇

肠外营养病人导管护理措施正确的是()。A. 首选周围静脉途径 B. 可经中心静脉途径输血 S

肠外营养病人导管护理措施正确的是()。

- A. 首选周围静脉途径
- B. 可经中心静脉途径输血
- C. 不要经中心静脉导管输血
- D. 怀疑导管败血症时，首选抗生素治疗
- E. 营养支持在 2 周以上者应经周围静脉途径给营养液

正确答案：C

患者张某，女性，意识不清，评估确认患者目前存在以下护理问题，你认为应该首先解决的问题是

- A. 便秘

- B. 语言沟通障碍
- C. 清理呼吸道无效
- D. 皮肤完整性受损
- E. 营养失调：低于机体需要量

正确答案：C 相比较而言，意识不清的患者应首先选择促进患者呼吸、预防窒息的问题，因此 C 选项是正确的。

张某，70 岁，在今晨输液过程中突然出现急性肺水肿，下列措施中与减轻心脏负担无关的是

- A、停止输液
- B、给予镇静药物
- C、端坐体位
- D、四肢轮流结扎
- E、酒精湿化吸氧

参考答案：E

严禁行肛门检查

- A. 前置胎盘
- B. 胎盘早期剥离
- C. 子宫破裂

- D. 胎膜早破
- E. 脐带脱垂

正确答案：A

引起维生素 D 缺乏性佝偻病的最主要原因是

- A. 生长过速
- B. 日光照射不足
- C. 维生素 D 摄入不足
- D. 胃肠道疾病
- E. 肝胆疾病

正确答案：B 皮肤中的 7-脱氢胆固醇(7-DHC)，是维生素 D 生物合成的前体，经日光中紫外线照射(波长 290~320nm)，转变为胆骨化醇，即内源性维生素 D₃，是人体维生素 D 的主要来源。

初级护师考试真题精选及答案 8 篇 第 3 篇

下列有关脊髓灰质炎的描述，错误的是

- A、潜伏期后出现瘫痪
- B、可以出现脑神经核受累
- C、可预防接种

- D、脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病
- E、近年来发病率明显增高

参考答案：E

根据信息，该病人目前主要的护理问题是（ ）

- A. 焦虑
- B. 排尿异常
- C. 疼痛
- D. 潜在并发症肾功竭
- E. 活动无耐力

正确答案：B

壶腹部癌的临床特点是较早出现

- A. 转移症状
- B. 黄疸、寒战、发热
- C. 上腹痛及脊背痛
- D. 消化道症状
- E. 贫血、消瘦

正确答案：B 壶腹部癌由于癌肿生长阻塞胆管，常合并胆管

感染出现黄疸、寒战、发热。

休克病人留置导尿管最主要的目的是()

- A. 保持床单位清洁干燥，使病人舒适
- B. 引流尿液，促进有毒物质的排泄
- C. 收集尿标本，作细菌培养
- D. 避免尿液潴留在膀胱内
- E. 测尿量及比重，了解肾血流灌注情况

正确答案：E 解析：导尿的目的：(1)为使用其他措施无效的尿潴留病人，引出尿液，解除痛苦，导尿是最好的方法。(2)为下腹部或骨盆手术病人术前及术中排空膀胱，以避免误伤膀胱或术后膀胱减压。(3)协助诊断。如：留取未受污染的尿液做尿细菌培养；了解危重及休克病人尿量，观察肾脏功能；测量膀胱容量、压力及检查残余尿容量，鉴别无尿及尿潴留；进行膀胱及尿道造影等。(4)为膀胱肿瘤病人进行膀胱内注入药物进行化疗。

患者，男性，67岁，有冠心病，因门脉高压，上消化道大出血入院，体检：巩膜黄染，有明显腹水

对该患者上消化道出血最应采取的紧急措施是

- A. 三腔二囊管压迫止血
- B. 静滴脑垂体后叶素

- C. 脾肾静脉分流术
- D. 门腔静脉分流术
- E. 胃底周围血管离断术

正确答案：A

初级护师考试真题精选及答案 8 篇 第 4 篇

患者吴某，外伤导致尿道球部断裂术后。为了预防术后尿道狭窄，可采取的护理措施是

- A. 预防感染
- B. 长期留置尿管
- C. 多饮水
- D. 后期应定期做尿道扩张
- E. 增强体育锻炼

正确答案：D 预防尿道狭窄：定期做尿道扩张术。

肾盂肾炎最常见的病原菌是大肠杆菌。（）

此题为判断题（对，错）。

参考答案：对

患者，女性，29 岁，腹部外伤后，全腹疼痛及压痛，疑膀胱破裂，最可靠的检查方法是

- A、膀胱镜
- B、导尿
- C、膀胱造影
- D、膀胱穿刺
- E、尿流动力学测定

参考答案：C

关于宫颈上药的方法，正确的是

- A. 可以直接将药片纳入阴道
- B. 用棉球填塞宫颈局部者，应嘱患者于放药后 12~24 小时取出棉球
- C. 指导患者用棉球涂擦宫颈表面
- D. 患者可借用喷雾器自己将药物喷撒到病变部位
- E. 上药前必须进行会阴准备

正确答案：B 可以将药片直接纳入阴道后穹隆；指导患者用棉签涂擦宫颈表面；喷雾法上药不能让病人自己进行；上药前必须进行阴道准备。

以下关于进行性肌营养不良的说法错误的是

- A、为原发性肌肉变性病

- B、与遗传因素有关，大多有家族史
- C、以缓慢进行性加重的对称性肌无力、肌肉萎缩为临床特征
- D、肌无力常以近端为主，而且往往呈对称分布
- E、肌萎缩往往伴有肌束颤动

参考答案：E

初级护师考试真题精选及答案 8 篇 第 5 篇

心功能 III 级应

正确答案：A

现有 95%乙醇 500ml，要配制成 70%乙醇，需加入灭菌蒸馏水约

- A. 132 ml
- B. 179 ml
- C. 185 ml
- D. 279 ml
- E. 285 ml

正确答案：B 配置前后两种溶液中含有纯乙醇的量不变，(95

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/465320120134011103>