

眼科基础试题与参考答案

一、单选题（共 80 题，每题 1 分，共 80 分）

1、 可以出现近视改变的是哪种类型白内障（）

- A、 皮质性白内障
- B、 后囊下白内障
- C、 核性白内障
- D、 先天性白内障
- E、 后发性白内障

正确答案： C

2、 耳前淋巴结肿大和压痛见于：

- A、 过敏性结膜炎
- B、 病毒性结膜炎
- C、 免疫性结膜炎
- D、 细菌性结膜炎

正确答案： B

3、 患者，女，27岁，戴角膜接触镜11年，左眼红、痒、异物感，有分泌物。检查见双眼上睑结膜有大乳头增生，无瘢痕，角膜透明。最有可能的诊断是（）

- A、 慢性结膜炎
- B、 沙眼慢性期
- C、 巨乳头性角结膜炎
- D、 干眼症
- E、 春季角结膜炎

正确答案： C

4、 视网膜硬性渗出是由于，

- A、 视网膜深层缺血·
- B、 视网膜局部缺血·
- C、 脂质沉着·
- D、 神经胶质细胞增

正确答案： C

5、 患者，男，36岁，被羽毛球击中右眼。眼科检查：

VodFC / 30cm, Vos1.0；右眼结膜混合充血，角膜轻度水肿，前房深，房水闪

辉+,瞳孔欠圆,直径约5mm,对光反射消失,晶状体透明,向下方移动,虹膜震颤,玻璃体混浊,眼底正常。该患者急诊处理不合理的是()

- A、糖皮质激素
- B、预防感染
- C、急诊手术摘除晶状体
- D、非甾体类药物抗炎
- E、双眼包扎、制动,半卧位休息

正确答案: C

6、内睑腺炎是:

Moll腺感染

- B、睫毛毛囊炎症
- C、Zeiss腺感染
- D、睑板腺的化脓性感染

正确答案: D

7、睑内翻的伴随症状不包括()

- A、畏光流泪
- B、眼睑闭合不全
- C、眼刺痛、异物感
- D、角膜溃疡
- E、倒睫

正确答案: B

8、下列属于白内障手术绝对禁忌的是()

- A、虹膜后粘连
- B、内皮细胞1500个/平方毫米
- C、前房极浅
- D、慢性泪囊炎
- E、V级核

正确答案: D

9、下列关于恶性青光眼的叙述错误的是()

- A、治疗应予1%毛果芸香碱点眼
- B、其发病机制为睫状环阻滞,房水引流错向

- C、好发于小眼球的患者，多见于青光眼、白内障术后
- D、临床表现为前房消失，眼压不断升高
- E、可以予局部或全身糖皮质激素治疗

正确答案：A

10、不符合单疱病毒性睑皮炎临床表现的是（）

- A、个别患者可累及角膜
- B、疱疹呈多个或簇状，半透明，周围充血、水肿
- C、病变可侵犯上、下睑，但以下睑多见
- D、初起水泡内含透明黄色液体，后于涸吸收结痂，遗留瘢痕
- E、有刺痒、疼痛与烧灼感

正确答案：D

11、男性，42岁，近来工作压力大，经常熬夜，右眼视物模糊20天，视物颜色较暗。查体：视力：右眼0.3，左眼1.0，黄斑区视网膜隆起，右眼最可能的诊断为•

- A、视网膜分支静脉阻塞•
- B、黄斑劈裂•
- C、中心性浆液性脉络膜视网膜病变•
- D、黄斑前膜
- E、黄斑水肿•

正确答案：C

12、可引起秃睫和睫毛乱生的疾病是：

- A、溃疡性睑缘炎
- B、眦部睑缘炎
- C、鳞屑性睑缘炎
- D、睑腺炎

正确答案：A

13、患者，20岁，发现右上睑可触及皮下无压痛性包块1月，表面光滑，下列诊断中应首先考虑（）

- A、麦粒肿
- B、沙眼
- C、睑板腺癌
- D、结膜炎
- E、霰粒肿

正确答案：E

14、对于老视患者，老视症状突然缓解，视近得到改善，见于以下哪种的白内障

- A、皮质性
- B、以上都不是
- C、囊性
- D、核性
- E、囊膜下性

正确答案：D

15、沙眼角膜血管翳多见于

- A、角膜上缘
- B、角膜鼻侧
- C、角膜缘
- D、角膜颞侧
- E、角膜下缘

正确答案：A

16、下述关于睑腺炎的治疗，错误的有（）

- A、眼睑局部和结膜囊涂抗生素眼膏
- B、外睑腺炎的切口须与睑缘垂直，内睑腺炎切口与睑缘平行
- C、脓肿形成时，应及时切开排脓
- D、反复发作及伴有全身反应时可全身应用磺胺类或抗生素类药物
- E、未化脓前可热敷和其他物理治疗

正确答案：B

17、以下哪种疾病可能发生剧烈眼痛（）

- A、年龄相关性白内障
- B、过敏性结膜炎
- C、电光性眼炎
- D、视网膜中央动脉阻塞
- E、正常眼压性青光眼

正确答案：C

18、角膜上皮细胞来源于

- A、基质层
- B、前弹力层

- C、内皮细胞
- D、后弹力层
- E、角膜缘干细胞

正确答案：E

19、泪点位于睑缘的：

- A、中部偏外侧
- B、外眦部
- C、内眦部
- D、中部

正确答案：C

20、直肌附着处的巩膜厚度为（）

- A、0.3mm
- B、0.5mm
- C>0.8mm
- D、0.4mm
- E、0.1mm

正确答案：A

21、患者男性，20岁，因双眼痒、畏光、流泪就诊。过去有类似发作史，均在每年4月份发作。检查：见双眼上睑结膜处大小不一扁平乳头，呈铺路石样，角膜透明。上述疾病诊断为（）

- A、春季卡他性结膜炎
- B、包涵体性结膜炎
- C、流行性角膜结膜炎
- D、枯草热性结膜炎
- E、泡性角膜结膜炎

正确答案：A

22、眼部过敏性疾病中最常见的是

- A、季节过敏性结膜炎
- B、自身免疫性结膜炎
- C、特应性角结膜炎
- D、春季角结膜炎
- E、巨乳头结膜炎

正确答案：A

23、视网膜脱离一般不出现一下哪种症状·

- A、视力下降
- B、眼压下降·
- C、闪光感·
- D、视物变形·
- E、眼疼·

正确答案：E

24、女性 59 岁，晚间看完电影后回家，突发右眼胀痛，伴同侧剧烈头痛。至急诊科初步排除消化科技神经科疾病，转诊至眼科诊断右眼急性闭角型青光眼大发作，对侧眼无症状，但具有浅前房，窄房角的解剖特征，左眼的诊断是（）

- A、原发性慢性闭角型青光眼
- B、原发性开角型青光眼
- C、原发性急性闭角型青光眼临床前期
- D、恶性青光眼
- E、原发性急性闭角型青光眼缓解期

正确答案：C

25、色觉敏感度最高的是：

- A、周边部视网膜
- B、黄斑
- C、赤道部视网膜
- D、视盘

正确答案：B

26、患者，男，25岁，主诉左眼睑红痛5天，检查：双眼视力：1.0,左眼上睑外侧红肿，近外眦部触及一硬结且压痛明显，皮肤表面见脓点,并有波动感。外侧球结膜轻度水肿，左侧耳前淋巴结肿大压痛。最可能的诊断

- A、外睑腺炎
- B、内睑腺炎
- C、睑板腺囊肿伴发感染
- D、溃疡性睑缘炎
- E、眦部睑缘炎

正确答案：A

27、男性，68岁，高血压病史15年，突然出现左眼视物模糊2小时，眼部

检查：右眼视力：0.6,左眼视力：眼前手动，左眼角膜透明，前房深浅正常，瞳孔散大，对光反应迟钝，晶状体轻度混浊，左眼底检查：视乳头色淡、边缘模糊，动脉、静脉管径均变细，后极部视网膜呈乳白色,黄斑区可见樱桃红斑。该患者左眼首先考虑•

- A、缺血性视神经病变•
- B、视网膜脱离•
- C、玻璃体出血•
- D、视网膜中央动脉阻塞•
- E、视神经炎

正确答案：D

28、正常平视时，上睑遮盖角膜上部：

- A、1.5~2.5mm
- B_N0.5-1.5mm
- C、2-3mm
- D、0.5-1mm
- E、1.5-2mm

正确答案：A

29、男，74岁，年龄相关性白内障患者，视力光感，一直未予手术治疗。近日无诱因自觉视力有所增加，可眼前数指，无其它不适，最可能的诊断为

- A、晶状体膨化
- B、液化的晶状体皮质溶解
- C、过熟期白内障晶状体核下沉
- D、白内障消散，自愈
- E、晶状体不全脱位

正确答案：C

30、下列对棘阿米巴角膜炎的叙述，正确的是：

- A、常有角膜接触镜配戴史
- B、糖皮质激素的应用可以使病情好转
- C、双眼多见
- D、临床表现为角膜溶解

正确答案：A

31、沙眼的临床表现主要为

- A、结膜滤泡
- B、以上均是
- C、乳头增生
- D、角膜血管翳

正确答案： B

32、视神经分为四段，其中最短的一段是：

- A、眶内段
- B、颅内段
- C、眼内段
- D、管内段

正确答案： C

33、慢性泪囊炎最常见原因为

- A、泪囊狭窄
- B、泪总管阻塞
- C、泪小管阻塞
- D、鼻泪管阻塞
- E、泪小点闭合

正确答案： D

34、过敏性结膜炎治疗原则()

- A、去除过敏原
- B、短期应用类固醇眼药水
- C、可静脉推注葡萄糖酸钙
- D、服抗过敏药物
- E、以上全对

正确答案： E

35、对糖尿病性视网膜病变的早期诊断最有帮助的辅助检查是•

- A、视网膜中央动脉血压•
- B、荧光眼底血管造影(FA)•
- C、视网膜电图(ERG)
- D、暗适应•
- E、视野•

正确答案： B

36、葡萄膜炎、视网膜脱离易引起：

- A、并发性白内障
- B、先天性白内障
- C、代谢性白内障
- D、老年性白内障

正确答案：A

37、角膜炎最常见的症状是

- A、眼痛
- B、畏光
- C、流泪
- D、以上均是
- E、眼睑痉挛

正确答案：D

38、患儿，男，6岁，家长发现患儿自出生后其双眼睁不大，随年龄的增长无明显改善。常常皱额抬眉，仰首视物。无外伤史，足月顺产。其父亲和叔叔有类似病史。最可能的诊断是（）

- A、上睑下垂
- B、Coats病
- C、眼睑内翻
- D、视网膜母细胞瘤
- E、内眦赘皮

正确答案：A

39、患者，男性，25岁，右眼被铁丝戳伤3天。查体：VAccODFC / 20cm, 右眼球结膜混合充血，角膜轻度水肿，前房深，前房积脓2mm, 前房细胞++++, 区见絮状渗出，伴瞳孔后粘连，晶状体及眼后段窥不清。正确的诊断是（）

- A、急性前葡萄膜炎
- B、感染性眼内炎
- C、感染性角膜炎
- D、交感性眼炎
- E、Behcet病

正确答案：B

40、患者男，52岁，1月前曾被树枝擦伤左眼。现主诉左眼视力下降，眼红、眼痛，体检发现左眼混合充血，角膜灰白色干燥溃疡，则诊断应高度怀疑

疑 ()

- A、蚕食性角膜溃疡
- B、真菌性角膜炎
- C、棘阿米巴角膜炎
- D、病毒性角膜炎
- E、细菌性角膜炎

正确答案： B

41、预防新生儿淋球菌性结膜炎可选用 ()

- A、硝酸银
- B、四环素
- C、青霉素
- D、利福平
- E、红霉素

正确答案： A

42、痉挛性睑内翻多发生于哪些人：

- A、老年人
- B、少年儿童
- C、婴幼儿
- D、青壮年人

正确答案： A

43、女性，50岁，因左眼眼前黑影飘动2周就诊。检查：左眼前节(-)，后极部视网膜前可见Weiss环，眼底呈豹纹状，视网膜表面未见出血、渗出等。左眼的初步诊断是： ()•

- A、后巩膜炎•
- B、玻璃体变性
- C、玻璃体后脱离•
- D、后葡萄膜炎◆
- E、视网膜脱离•

正确答案： C

44、春季角结膜炎的典型体征为：

- A、下睑结膜粗大乳头
- B、大小一致的粗大乳头
- C、扁平的粗大乳头
- D、粗大乳头伴有黄褐色或污红色胶样增厚

正确答案：C

45、玻璃体的基本病理改变是：

- A、出血
- B、浓缩
- C、液化
- D、混浊

正确答案：C

46、影响药物透过角膜的因素不包括：

- A、表面活性
- B、角膜直径的大小
- C、溶解度
- D、粘滞性与脂溶性
- E、药物的浓度

正确答案：B

47、有关睑板腺囊肿错误的说法有（）

- A、是睑板腺特发性细菌性慢性肉芽肿炎症
- B、既往称霰粒肿
- C、由于睑板腺出口阻塞，腺体的分泌物潴留在睑板内而引起
- D、新陈代谢障碍、皮脂腺和汗腺分泌功能旺盛或维生素A缺乏可引起

正确答案：A

48、新生儿“脓漏眼”指的是以下哪种病原体引起的（）

- A、绿脓杆菌
- B、淋球菌
- C、大肠杆菌
- D、金黄色葡萄球菌
- E、肺炎链球菌

正确答案：B

49、真菌性角膜炎最常见的诱因是

- A、佩戴接触镜
- B、外伤
- C、过敏性结膜炎
- D、长期使用激素

E、以上均不是

正确答案：B

50、接诊一个眼外伤的病人，首先应注意（）

A、眼压情况

B、有无休克及重要脏器损伤

C、眼内有无出血

D、有无眼球破裂

E、视力情况

正确答案：B

51、表现为小的圆点状出血，色暗红的是•

A、视网膜下出血

B、视网膜浅层出血•

C、视网膜深层出血•

D、视网膜前出血

正确答案：C

52、真菌性角膜炎的常见病因不包括（）

A、隐形眼镜护理不当

B、长期大量使用免疫抑制剂所致

C、植物性角膜外伤

D、长期大量使用广谱抗生素所致

E、长期大量使用糖皮质激素所致

正确答案：A

53、眼眶壁较厚的是（）

A、外侧壁

B、下壁

C、中壁

D、内侧壁

E、上壁

正确答案：A

54、霰粒肿多发生于

A、上眼睑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/467005121051006043>