

初级护师基本知识模拟试题附答案解析

A1 / A2 型选择题(1~68 题) 答题阐明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中逸择一种最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 肝硬化病人不适宜大量放腹水，以免导致（ ）
A. 上消化道出血 B. 蛋白质丢失 C. 电解质紊乱 D. 肝性脑病 E. 脱水
2. 系统性红斑狼疮最常用的死亡因素是（ ）
A. 上消化道大出血 B. 颅内高压 C. 尿毒症 D. 心肌炎 E. 胸膜炎
3. 慢性肺心病发生的核心环节是（ ）
A. 肺动脉高压 B. 左心室肥厚 C. 右心室扩大 D. 体循环淤血 E. 心功能不全
4. 最能提示急性胰腺炎病人预后不佳的是（ ）
A. 黄疸 B. 体温 39℃ C. 手足抽搐
D. 合并代谢性中毒 E. 全腹压痛、腹肌紧张
5. 诊断肺心病的重要根据是（ ）
A. 肺动脉高压及右心室肥厚一 B. 长期慢支及肺部疾患史
C. 心电图见“肺型 P 波” D. 肺气肿体征 E. 肺性脑病
6. 有机磷农药中毒原理是（ ）
A. 克制呼吸中枢 B. 使胆碱酯酶活性增长 C. 直接作用于中枢神经
D. 使乙酰胆碱在体内蓄积 E. 直接作用于心肌引起循环衰竭
7. 急性白血病患者忽然浮现高热，重要因素为（ ）
A. 代谢亢进 B. 严重贫血 C. 白血病细胞浸润 D. 化疗过敏反应 E. 感染
8. 异常支气管呼吸音常用于（ ）
A. 肺炎 B. 肺气肿 C. 支气管狭窄 D. 自发性气胸 E. 支气管哮喘
9. 腹部浮现移动性浊音，提示腹水量至少达（ ）
A. 100ml B. 500ml C. 1000ml D. 1500ml E. ml

10. 腹部触诊有揉面感可见于 ()
- A. 饥饿 B. 肝硬化 C. 严重脱水 D. 肝性昏迷 E. 结核性腹膜炎
11. 呼出气体带有刺激性蒜味见于 ()
- A. 支气管扩张 B. 肺脓肿 C. 尿毒症 D. 酮症酸中毒 E. 有机磷农药中毒
12. 吸气时浮现脉搏明显削弱或消失的现象可见于 ()
- A. 主动脉瓣关闭不全 B. 心包积液 C. 右心衰竭 D. 冠心病 E. 房室传导阻滞
13. 白细胞分类计数, 正常中性粒细胞的比例为 ()
- A. 0.5%~1% B. 50%~70% C. 3%~8% D. 80%~85% E. 20%~40%
14. 成年男性血红蛋白正常参照值范畴为 ()
- A. 100~140g/L B. 140~170g/L C. 110~150g/L D. 170~ / L
E. 120~160g/L
15. 基本护理的基本医德规定是 ()
- A. 积极积极, 善于学习 B. 热情周到, 提供服务 C. 遵纪守法, 严于律己
D. 精确及时, 执行医嘱 E. 敢于开拓, 不断进取
16. 尿蛋白定量标本瓶中的防腐剂是 ()
- A. 甲苯 10ml B. 稀盐酸 5ml C. 甲醛 5ml D. 碳酸 5ml E. 浓盐酸 10ml
17. 尿液呈酱油色见于 ()
- A. 阻塞性黄疸 B. 急性溶血 C. 肝细胞性黄疸 D. 肾脏肿瘤 E. 晚期丝虫病
18. 下列 T 波中属于不正常的是
- A. V_s 导联倒置 B. V₅ 导联倒置 C. aVR 导联倒置 D. aVR 导联平坦
E. V₁ 导联双向
19. 引起心前区疼痛最常用的因素是
- A. 冠心病 B. 心包炎 C. 胸膜炎 D. 食管炎 E. 心血管神经官能症
20. 壁细胞重要分泌
- A. 盐酸、内因子 B. 胃蛋白酶原 C. 胃蛋白酶 D. 胃泌素 E. 双糖酶

21. 护理道德监督的方式不涉及
- A. 舆论监督 B. 制度监督 C. 老式习俗 D. 社会监督 E. 自我监督
22. 引起小儿秋季腹泻常用的病原体是
- A. 空肠弯曲菌 B. 大肠埃希菌 C. 埃可病毒 D. 轮状病毒 E. 柯萨奇病毒
23. 病人浮现呕血提示胃内积血至少超过
- A. 100ml B. 200ml C. 250ml D. 300ml E. 350ml
24. 消化性溃疡的最后决定因素是
- A. 胆盐 B. 乙醇 C. HP 感染 D. 非甾体类药物 E. 胃酸与胃蛋白酶
25. 腹泻患者的饮食规定，错误的是
- A. 少渣 B. 高纤维素 C. 易消化 D. 流食 E. 半流食
26. 大便呈白陶土色常用于
- A. 肉类饮食过多 B. 上消化道出血 C. 肝细胞性黄疸 D. 胆汁淤积性黄疸
- E. 溶血性黄疸
27. 引起老年心力衰竭患者症状加重的最常用的诱因是
- A. 过度劳累 B. 心肌缺血 C. 呼吸道感染 D. 摄入液体过多 E. 室性期前收缩
28. 与消化性溃疡有关的病原菌是
- A. 衣原体 B. 肺炎球菌 C. 病毒 D. 支原体 E. 幽门螺杆菌
29. 引起上消化道出血最常用的疾病是
- A. 食管癌 B. 胰腺炎 C. 急性胃炎 D. 胃黏膜脱垂 E. 消化性溃疡
30. 能引起急性胰腺炎的药物是
- A. 青霉素 B. 肾上腺素 C. 葡萄糖酸钙 D. 去甲肾上腺素 E. 糖皮质激素
31. 导致肺癌发生的最重要的危险因素是
- A. 电离辐射 B. 食物中毒 C. 汽车尾气 D. 吸烟 E. 遗传因素
32. 急性腹膜炎发生休克的重要因素是
- A. 剧烈疼痛 B. 腹膜吸取大量毒素，血容量减少

C. 肠内积液刺激 D. 大量呕吐致液体丢失 E. 腹胀引起呼吸困难

33. 腹膜炎引起的肠梗阻属于

A. 机械性绞窄性肠梗阻 B. 机械性单纯性肠梗阻 C. 麻痹性肠梗阻

D. 血运性肠梗阻 E. 痉挛性肠梗阻

34. 低渗性脱水初期尿液的变化是

A. 尿量减少 B. 尿量略增或不变 C. 尿比重增高 D. 尿少而比重低

E. 管型和蛋白尿

35. 不属于胎盘分泌的激素是

A. 雌激素 B. 雄激素 C. 孕激素 D. 绒毛膜促性腺激素 E. 胎盘生乳素

36. 子宫的功能不涉及

A. 产生女性激素 B. 形成月经 C. 精子进入输卵管的通道

D. 可孕育胎儿 E. 将胎儿娩出

37. 女性青春期开始的重要标志是

A. 音调变高 B. 乳房丰满 C. 皮下脂肪增多 D. 阴毛、腋毛生成 E. 月经初潮

38. 黄体发育达高峰在排卵后

A. 7~8天 B. 9~10天 C. 11~12天 D. 13~14天 E. 15~16天

39. 胎盘形成的时间是在妊娠后

A. 12周末 B. 14周末 C. 16周末 D. 18周末 E. 20周末

40. 胎先露指

A. 胎儿长轴与母体长轴的关系 B. 胎儿在子宫内所取的姿势

C. 最先进入骨盆入口平面的胎儿部分 D. 胎儿批示点和骨盆的关系

E. 胎儿枕骨和骨盆的关系

41. 异位妊娠常发生的部位是

A. 卵巢 B. 宫颈 C. 腹腔 D. 输卵管 E. 子宫直肠陷凹

42. 慢性宫颈炎病理变化中，最常用的是

A. 宫颈糜烂 B. 宫颈息肉 C. 宫颈肥大 D. 宫颈腺囊肿 E. 宫颈炎

43. 排卵多发生在下次月经来临前

A. 8 日左右 B. 11 日左右 C. 14 日左右 D. 17 日左右 E. 20 日左右

44. 肝性脑病最常用的因素是

A. 原发性肝癌 B. 严重胆道感染 C. 病毒性肝炎后肝硬化

D. 酒精性肝炎后肝硬化 E. 药物性肝炎后肝硬化

45. 急性白血病出血的重要因素是

A. 弥散性血管内凝血 B. 血小板减少 C. 血小板功能异常

D. 凝血因子减少 E. 血管损伤

46. 门静脉高压症形成后一方面浮现的是

A. 肝肿大 B. 脾肿大 C. 腹水 D. 呕血 E. 交通支扩张

47. 原发性高血压最常用的死亡因素是

A. 心律失常 B. 尿毒症 C. 脑血管意外 D. 心力衰竭 E. 高血压危象

48. 急性心肌梗死患者发生左心衰竭的重要因素是

A. 肺部感染 B. 心脏负荷加重 C. 房室传导阻滞 D. 情绪激动

E. 心肌收缩力削弱和不协调

49. 按病理分类婴幼儿最常用的肺炎是

A. 大叶性肺炎 B. 支气管肺炎 C. 间质性肺炎

D. 干酪性肺炎 E. 毛细支气管肺炎

50. 肺炎时易并发脓胸、脓气胸的常用病原体是

A. 肺炎球菌 B. 溶血性链球菌 C. 金黄色葡萄球菌

D. 铜绿假单胞菌 E. 白色念珠菌

51. 属于临界骨肿瘤的是

A. 骨髓瘤 B. 骨肉瘤 C. 骨软骨瘤 D. 尤文肉瘤 E. 骨巨细胞瘤

52. 破伤风杆菌产生的溶血毒素可引起

- A. 局部组织坏死和心肌损害 B. 随意肌紧张与痉挛
- C. 血压升高 D. 出汗 E. 体温升高
53. 婴幼儿易患呼吸道感染的因素是
- A. 血清中 IgA 缺少 B. 分泌型 IgA 缺少 C. 血清中 IgG 缺少
- D. 血清中 IgM 缺少 E. 细胞免疫功能低下
54. 系统性红斑狼疮突出的病理体现是
- A. 血管炎和血管病变 B. 关节滑膜炎 C. 周边神经病变
- D. 骨质增生 E. 软骨增生
55. 婴儿营养不良最常用的病因是
- A. 先天局限性 B. 饲养不当 C. 缺少锻炼 D. 疾病影响 E. 免疫缺陷
56. 营养不良患儿最常用的维生素缺少是
- A. 维生素 A B. 维生素 B C. 维生素 C D. 维生素 D E. 维生素 B12
57. 小儿出生后身高增长最迅速的时期是
- A. 婴儿期 B. 幼儿期 C. 学龄前期 D. 学龄期 E. 青春期
58. ABO 血型不合引起新生儿溶血中发生率最高的是
- A. 母为 O 型，子为 A 或 B 型 B. 母为 AB 型，子为 A 或 B 型
- C. 母为 A 型，子为 O 或 AB 型 D. 母为 A 型，子为 O 或 B 型
- E. 母为 B 型，子为 O 或 A 型
59. 维生素 D 缺少性佝偻病的重要病因是
- A. 日照局限性 B. 摄入局限性 C. 需要量增长 D. 疾病的影响 E. 药物的影响
60. 某冬日，一妈妈征询：晨起见自己 8 个月女儿尿液呈乳白色，余无异常。其尿液呈乳白色的因素也许是
- A. 脓尿 B. 尿酸结晶 C. 盐类结晶 D. 乳糜尿 E. 蛋白尿
61. 4 岁小儿，未接种腮腺炎疫苗，一种月前所在幼儿园浮现多例腮腺炎患儿，在家隔离观

测，无腮腺炎体现。现检查示腮腺炎特异性抗体呈阳性，按传染病传染过程的体现形式，此小儿属于

- A. 病原体被清除 B. 隐性感染 C. 显性感染 D. 病原携带状态
E. 潜伏性感染

62. 患者，女性，50岁，体检发现心尖区可闻及全收缩期吹风样杂音，最也许的因素是

- A. 肺动脉瓣狭窄 B. 积极脉瓣狭窄 C. 二尖瓣关闭不全
D. 积极脉瓣关闭不全 E. 二尖瓣狭窄

63. 男婴，2岁，人工饲养，4天前咳嗽、发热、腹泻，体检：体温：38.0℃，中度脱水，患儿在补液中突发抽搐，持续约1分钟。抽搐最也许的因素是

- A. 高热惊厥 B. 急性心衰 C. 低钙血症 D. 低钠血症 E. 中毒性脑病

64. 初产妇，30岁，宫口开全超过2小时胎儿尚未娩出，称为

- A. 第二产程延长 B. 潜伏期延长 C. 胎盘滞留 D. 滞产 E. 活跃期延长

65. 患儿，8岁，4天前浮现发热、咳嗽，体温最高达39℃，咳嗽呈阵发性刺激性干咳，体检：肺部呼吸音增粗。胸部X线：大片密度增高影；血清冷凝集实验呈阳性。引起该患儿肺部病变的病原体最也许是

- A. 肺炎链球菌 B. 肺炎支原体 C. 流感嗜血杆菌
D. 呼吸道合胞病毒 E. 金黄色葡萄球菌

66. 不属于法洛四联症畸形的是

- A. 右心室肥厚 B. 室间隔缺损 C. 积极脉骑跨
D. 肺动脉狭窄 E. 积极脉缩窄

67. 急性肾小球。肾炎患儿，10岁，入院体检时测得上肢收缩压为125mmHg，该患儿血压较正常值增高

- A. 5mmHg B. 10mmHg C. 15mmHg D. 20mmHg E. 25mmHg

68. 肾病综合症的病理生理变化中意义最大的是

- A. 氮质血症 B. 高脂血症 C. 水钠潴留 D. 低蛋白血症 E. 大量蛋白尿

B1 型选择题(69~84 题) 答题阐明

如下提供若干组考题，每组考题共用 **A、B、C、D、E** 五个备选答案。请从中选择一种与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案也许被选择一次、多次或不被选择。

(69~70 题共用备选答案)

A. 鳞癌 B. 小细胞癌 C. 大细胞癌 D. 腺癌 E. 支气管肺泡癌

69. 生长缓慢，与吸烟关系密切的肺癌是

70. 以周边型为主，需与结核球鉴别的肺癌是

(71~72 题共用备选答案)

A. 腹股沟斜疝 B. 腹股沟直疝 C. 股疝 D. 脐疝 E. 切口

71. 最容易发生嵌顿的腹外疝是

72. 最常用的腹外疝是

(73~74 题共用备选答案)

A. 急性刺激性干咳 B. 长期晨间咳嗽 C. 带喉音的咳嗽

D. 阵发性干咳、咯血 E. 咳嗽、咳脓臭痰

73. 肺脓肿常浮现

74. 肺癌可浮现

(75~76 题共用备选答案)

A. 子宫肌瘤 B. 子宫颈癌 C. 子宫内膜癌 D. 卵巢恶性肿瘤

E. 子宫内膜异位症

75. 患病年龄分布呈现双峰状的肿瘤是

76. 可发生于任何年龄，死亡率为妇科恶性瘤之首的是

(77~78 题共用备选答案)

A. 挫伤 B. 扭伤 C. 挤压伤 D. 裂伤 E. 刺伤

77. 容易引起急性肾衰竭的损伤的是

78. 伤口污染和周边组织损伤均较重。易发生坏死和感染的损伤是

(79~80 题共用备选答案)

A. 40~45 次/分 B. 20~25 次/分 C. 18~20 次/分

D. 25~30 次/分 E. 30~40 次/分

79. 2~3 岁呼吸频率为

80. 新生儿呼吸频率为

(81~82 题共用备选答案)

A. 自体移植 B. 同质移植 C. 同种异体移植 D. 异种异体移植 E. 输注移植

81. 一卵双生的弟弟为其孪生哥哥提供肾脏进行的移植属于

82. 断肢再植属于

(83~84 题共用备选答案)

A. A 期 B. B 期 C. C 期 D. C₂ 期 E. D 期

83. 大肠癌癌肿已穿透肠壁但无淋巴结转移，在 Dukes 分期中属于

84. 大肠癌癌肿已穿透肠壁，肠系膜根部淋巴结肿大，在 Dukes 分期中属于

A3 / A4 型选择题(85~100 题) 答题阐明

如下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题，请根据所提供的信息，在每一道考试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一种最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(85~86 题共用题干)

男，20 岁，长跑后冲凉水浴，当晚突发寒战、高热，右胸痛。患者面色潮红、呼吸急促、痛苦呻吟，体温 39.5℃，以肺炎收住院。

85. 患者的面容属于

A. 高热病容 B. 急性病容 C. 慢性病容 D. 病危面容 E. 休克面容

86. 触诊检查可以发现右上肺

A. 触觉语颤消失 B. 触觉语颤削弱 C. 触觉语颤增强

D. 浮现摩擦感 E. 发现异常搏动

(87~88 题共用题干)

男, 16 岁, 6 个月前因左股骨下段骨肉瘤行髋关节离断术, 并用环磷酰胺和长春新碱进行化疗, 近 2 周浮现左胸痛伴咳嗽, 实验室检查白细胞 $2.5 \times 10^9 / L$, 胸片示左肺上叶一毛刺状阴影, 局部肺不张。

87. 应考虑发生了

A. 肺炎 B. 矽肺 C. 肺脓肿 D. 肺结核 E. 肺转移

88. 该患者的白细胞减少的因素是

A. 肺部感染 B. 骨髓克制 C. 肺不张 D. 抵御力下降 E. 转移性肺癌

(89~90 题共用题干)

女, 28 岁, 已婚, 近日来发热, 腰痛伴尿急、尿频、尿痛, 尿白细胞 25 个 / HP。

89. 本病病因是

A. 免疫缺陷 B. 细菌感染 C. 遗传因素 D. 过敏 E. 营养过剩

90. 指引患者多饮水的作用是

A. 减少体温 B. 缓和尿频 C. 营养需要 D. 冲洗尿路 E. 治疗腰痛

(91~92 题共用题干)

男, 42 岁, 与朋友会餐, 饮酒后 6 小时浮现持续剧烈中上腹痛, 向腰背部呈带状放射, 伴恶心、呕吐, 吐出食物和胆汁。上腹部有压痛, 拟诊为急性胰腺炎。

91. 该患者的重要病由于

A. 胆道疾病 B. 高脂血症 C. 高钙血症 D. 暴饮暴食

E. 并发于流行性腮腺炎

92. 有效克制胰腺分泌的药物是

A. 阿托品 B. 甲氰咪胍 C. 生长抑素 D. 甲硝唑 E. 山莨菪碱

(93~96 题共用题干)

初孕妇, 妊娠 40 周。临产 6 小时, 宫口开大 3cm; 临产 11 小时, 宫口开全, 先露头, 先

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/475130331040011103>