

助理医师考试临床助理(习题卷124)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]脓胸纤维板剥除术的适应证

- A) 病程短的慢性脓胸，肺内无病变
- B) 急性包裹性脓胸
- C) 肺内有病灶，肺不能复张
- D) 伴支气管胸膜瘘
- E) 病程久，肺有纤维变性

2. [单选题]女，35岁。间断咳嗽、咳脓痰伴咯血10余年，再发2天入院，咯血总量约600ml，经抗感染、静脉滴注垂体后叶素治疗后，咯血停止。行胸部X线检查示局部囊状及柱状影，部分囊腔内可见液平，余肺未见异常。该患者进一步采取的最佳治疗措施是（ ）。

- A) 支气管动脉栓塞
- B) 规律使用流感疫苗
- C) 感染时联合使用抗生素
- D) 手术切除病变肺叶
- E) 抗生素预防感染

3. [单选题]前置胎盘的正确处理是

- A) 有阴道出血，即终止妊娠
- B) 分娩方式，宫口开，剖腹产
- C) 胎儿死亡，均以阴道分娩
- D) 疑有前置胎盘，肛诊时宜轻柔
- E) 大出血时，可不经阴道检查，做剖腹产

4. [单选题]下述不属于生物精神医学范畴的是

- A) 神经生化
- B) 神经内分泌
- C) 精神药理学
- D) 精神疾病的流行病学
- E) 精神疾病遗传学

5. [单选题]男，45岁。近3个月来早醒，食欲下降、疲乏无力，感觉头脑反应迟钝，话少，兴趣下降，认为前途暗淡，有轻生念头。精神状况检查未发现幻觉和妄想，查体无明显异常发现，头颅CT正常。最可能的诊断是（ ）。

- A) 适应性障碍
- B) 焦虑症
- C) 抑郁症
- D) 分离性障碍
- E) 精神分裂症

6. [单选题]下列支持溶血性黄疸的是

- A) 粪胆素减少
- B) 尿胆原减少
- C) 非结合胆红素增加
- D) 尿胆红素阳性
- E) 结合胆红素增加

7. [单选题]有机磷农药所致"中间期肌无力综合征"的临床特点是

- A) 在出现胆碱能危象前出现四肢运动障碍
- B) 一般在96小时内出现感觉障碍
- C) 在出现OPIDN后出现运动障碍
- D) 在胆碱能危象后和OPIDN出现前出现运动障碍
- E) 在胆碱能危象后和OPIDN前出现感觉障碍

8. [单选题]在等容舒张期，心脏各瓣膜的功能状态是

- A) 房室瓣关闭，动脉瓣开放
- B) 房室瓣开放，动脉瓣关闭
- C) 房室瓣关闭，动脉瓣关闭
- D) 房室瓣开放，动脉瓣开放
- E) 二尖瓣关闭，三尖瓣开放

9. [单选题]下列哪一途径不属于氨的去路

- A) 非必需氨基酸的生成
- B) 氨基甲酰磷酸的生成
- C) 由谷氨酸生成谷氨酰胺
- D) HMGCoA的生成
- E) 含氮化合物的生成

10. [单选题]24岁初产妇，妊娠38周，规律宫缩7小时。AP110/70mmHg，骨盆不小，预测胎儿体重为2800g，枕左前位，胎心良。肛查宫口开大4cm，S=0。本例正确处置应是

- A) 肌注哌替啶100mg
- B) 静脉推注地西洋10mg
- C) 不需干涉产程进展
- D) 静脉滴注缩宫素
- E) 人工破膜

11. [单选题]肺出血-肾炎综合征可继发哪型肾炎

- A) 急性肾炎
- B) 以急性肾炎起病的慢性肾炎
- C) 肾病综合征
- D) 急进型肾炎
- E) 以上都不是

12. [单选题]男，71岁，高血压20年，规律服用福辛普利及氢氯噻嗪10年，近2年出现活动耐量下降，伴夜间憋醒，1周来患者感心悸，不能平卧，查体：P100次/分，BP200/130mmHg，双肺底可闻及湿性罗音，心率128次/分，心律不齐，S1强弱不等，心尖部可闻及2/6级收缩期杂音，考虑此患者是急性心力衰竭患者，请问以下最可能的病因是

- A) 高血压危象
- B) 心肌炎
- C) 年龄偏大
- D) 性别
- E) 急性肺栓塞

13. [单选题]患者女性，50岁。近几年来逐渐出现心悸、乏力、活动后气急。体检发现：心脏向左下扩大。主动脉听诊区闻及舒张期泼水样杂音。首先考虑的诊断是

- A) 二尖瓣狭窄
- B) 二尖瓣关闭不全
- C) 主动脉瓣关闭不全
- D) 主动脉瓣狭窄
- E) 肥厚型梗阻性心肌病

14. [单选题]痛风是下列何种物质代谢异常所致

- A) 糖代谢异常
- B) 慢性嘌呤代谢障碍
- C) 钙、磷代谢异常
- D) 脂质代谢紊乱
- E) 维生素代谢异常

15. [单选题]男性，15岁，冬季一天清晨，同学发现其人事不省，室内煤炉取暖，门窗紧闭。送来急诊时体检：面色潮红，口唇呈樱桃红色。该患者最可能是（ ）。

- A) 急性苯巴比妥中毒
- B) 急性一氧化碳中毒
- C) 急性有机磷中毒
- D) 低血糖昏迷
- E) 脑血管意外

16. [单选题]22岁，停经2个月，2天前在外自行堕胎，体温38.8℃，脉搏130次/分，血压正常，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，中性0.90，子宫如孕2个月大小，软，有压痛，经抗炎治疗，感染未能控制，突然大量阴道出血，下列哪项处理为宜

- A) 催产素肌肉注射
- B) 卵圆钳轻取胚胎，术后应用抗生素
- C) 抗生素及催产素
- D) 即刻刮宫除去病灶
- E) 抗生素及止血药物

17. [单选题]不符合慢性纤维空洞型肺结核的描述是

- A) 可见一个或多个后壁空洞
- B) 空洞壁参差不齐
- C) 可演变为硬化型肺结核
- D) 可引起大咯血及脓气胸
- E) 病变上重下轻

18. [单选题]急性硬脑膜外血肿患者出现的中间清醒期的长短主要取决于（ ）。

- A) 出血的来源
- B) 血肿形成的速度
- C) 血肿部位
- D) 原发性颅脑损伤的程度
- E) 血肿的体积

19. [单选题]31岁女性，人工流产术后25天，仍有少量阴道流血，检查子宫饱满，质中，轻压痛，宫口松软，双附件（一）。如体温 $37.5^\circ C$ ，血WBC $9.8 \times 10^9/L$ ，血HCG $25mIU/ml$ ，应做以下哪种处理

- A) 中药清热止血
- B) 抗炎治疗后刮宫
- C) 立即刮宫

- D) 用止血药
- E) 催产素肌注

20. [单选题] 母乳喂养儿粪便中主要的细菌是

- A) 大肠杆菌
- B) 肠链球菌
- C) 副大肠杆菌
- D) 变形杆菌
- E) 乳酸杆菌

21. [单选题] 有关感染性心内膜炎描述错误的是

- A) 感染性心内膜炎为心脏内膜表面的微生物感染，伴赘生物形成
- B) 赘生物大小不一、形状不一的血小板和纤维素团块
- C) 瓣膜为最常累及的部位
- D) 感染不发生在别的部位
- E) 根据病程分为急性和亚急性

22. [单选题] 患儿，男，2岁，发热4天，体温达40℃，伴流涕，鼻塞，咳嗽，眼结膜充血，眼泪较多，今发现耳后、颈枕部出现散在红色丘疹，疹间皮肤正常，最可能的诊断为（ ）。

- A) 幼儿急疹
- B) 风疹
- C) 水痘
- D) 猩红热
- E) 麻疹

23. [单选题] 肺弥散功能障碍最常出现

- A) PAO₂正常，PACO₂上升
- B) PAO₂下降，PACO₂上升
- C) PAO₂正常，PACO₂正常
- D) PAO₂正常，PACO₂下降
- E) PAO₂下降，PACO₂正常或下降

24. [单选题] 下列哪项最符合慢性阻塞性肺疾病的诊断

- A) 胸片X线示双肺野的透亮度增加
- B) 胸部CT示双肺多部位小叶中央型肺气肿
- C) 心电图示肢导低电压
- D) 肺功能示FEV₁

1
/FVC=65%
E) 动脉血气发现PaCO₂

2
=65mmHg

25. [单选题] 关于妊娠合并糖尿病的诊断不正确的是

- A) 肥胖是妊娠合并糖尿病的高危因素之一
- B) 糖尿病孕妇体重可>90kg
- C) 糖尿病孕妇易并发阴道真菌感染
- D) 妊娠28周后首次孕检者，建议初诊查空腹血糖或75gOGTT
- E) 孕早期应常常规进行OGTT检查

26. [单选题]患者30岁，孕2产，月经过少，患滴虫性阴道炎，选用何种方法避孕

- A) 避孕套
- B) 口服避孕药
- C) 宫内节育器
- D) 阴道隔膜
- E) 安全期避孕

27. [单选题]琥珀胆碱不具有下列哪种药理特性

- A) 用药后常见短暂的肌束颤动
- B) 可被血浆中假性胆碱酯酶水解破坏
- C) 肌松作用出现快，持续时间短
- D) 连续用药可产生快速耐受性
- E) 有神经节阻断作用

28. [单选题]细胞坏死的主要形态学特征下列描述正确的是

- A) 细胞核碎裂
- B) 细胞核异型
- C) 线粒体肿胀
- D) 细胞质脂质增多
- E) 核分裂

29. [单选题]枪击音和毛细血管搏动征最常见于

- A) 甲状腺功能亢进症
- B) 二尖瓣关闭不全
- C) 主动脉瓣关闭不全
- D) 主动脉瓣狭窄
- E) 贫血

30. [单选题]癔症性痉挛发作与癫痫发作的鉴别要点是

- A) 意识障碍
- B) 痉挛的严重程度
- C) 发作的突然性
- D) 角弓反张
- E) 发作时间长短

31. [单选题]思维破裂

- A) 联想过程缺乏一定方向，概念间缺乏内在联系
- B) 大脑中反复出现的观念，明知不必要，却摆脱不了，感到非常痛苦
- C) 以往经验在记忆中大量脱失
- D) 持续地重复某一单调的语句
- E) 缺乏事实依据，患者却坚信不疑的病理信念

32. [单选题]评估营养不良的指标不包括

- A) 体重下降
- B) 血清转铁蛋白量升高
- C) 贫血
- D) 血浆蛋白降低
- E) 周围血淋巴细胞计数减少

33. [单选题]患者，男性，59岁，因反复无痛性肉眼血尿2月入院；膀胱镜检见右输尿管口喷血，尿细胞学可见癌细胞。

[问题2][题]明确诊断后首选的治疗措施是

- A) 右肾切除术
- B) 右肾输尿管全切除
- C) 免疫治疗
- D) 放疗
- E) 化疗

34. [单选题] 肺内压在下列哪一时相中与大气压相等

- A) 呼气初与呼气末
- B) 吸气初与吸气末
- C) 吸气末与呼气末
- D) 吸气初与呼气末
- E) 吸气初与呼气初

35. [单选题] 患者，男性，68岁。8年来餐后1小时左右上腹部疼痛。多于秋季复发，每次持续3到5天不等。服雷尼替丁后症状可缓解。近2月疼痛持续性，服药后不缓解。间断黑便。查体：重度贫血貌，左锁骨上淋巴结可触及，约2个花生米大小，质地较硬。上腹部轻压痛。十二指肠球部溃疡少发部位不会是

- A) 前壁
- B) 后壁
- C) 上壁
- D) 下壁
- E) 球后

36. [单选题] 下列不是静脉曲张常见表现的是

- A) 小腿有静息痛、夜间痛现象
- B) 长期站立后小腿沉重隐痛
- C) 小腿常感酸胀
- D) 出现小腿慢性溃疡
- E) 久站后踝部肿胀

37. [单选题] 风湿性心包炎的X检查，以下哪项是错误的

- A) 心脏搏动减弱或消失
- B) 卧位时心腰增宽
- C) 心影向两侧扩大，呈烧瓶状
- D) 立位时阴影又复变窄
- E) 心音遥远

38. [单选题] 从人格特质的角度对人格进行划分的心理学家为

- A) 巴甫洛夫
- B) 马斯洛
- C) 卡特尔
- D) 弗洛伊德
- E) 罗杰斯

39. [单选题] 男性，60岁，主诉尿频、尿急5年，近2年排尿费力，尿线细；体检：直肠指诊前列腺4cmX3cm，未及硬结，肛门括约肌张力正常，球海绵体肌反射存在；排尿后下腹部叩诊浊音区于脐下2横指；血清PSA 1.8ng/ml；其最合理的初步诊断是

- A) 前列腺癌
- B) 前列腺增生伴慢性尿潴留
- C) 尿道狭窄
- D) 急性尿潴留
- E) 前列腺癌伴急性尿潴留

40. [单选题]根治良性疟最好选用

- A) 伯氨喹+奎宁
- B) 氯喹+乙胺嘧啶
- C) 伯氨喹+氯喹
- D) 伯氨喹+乙胺嘧啶
- E) 青蒿素+乙胺嘧啶

41. [单选题]男性，30岁，转移性右下腹痛10小时，并恶心，呕吐，吐物为胃内容物，量少并发热，体温约38.2° C，脉搏98次/分，右下腹压痛、反跳痛、肌紧张，血WBC为 $1.2 \times 10^{10}/L$ ，中性90%，尿常规WBC 8~10/HP，红细胞2~3/HP。该患者最可能的诊断是

- A) 急性胆囊炎
- B) 消化性溃疡穿孔
- C) 急性化脓性阑尾炎
- D) 急性胰腺炎
- E) 急性肠梗阻

42. [单选题]造成肺心病肺动脉高压最重要的原因是

- A) 缺氧
- B) 血容量增加
- C) 二氧化碳潴留
- D) 毛细血管床减少
- E) 血液黏稠度增加

43. [单选题]维持躯体姿势最基本的反射活动是

- A) 屈肌反射
- B) 对侧伸肌反射
- C) 腱反射
- D) 肌紧张
- E) 节间反射

44. [单选题]医疗事故构成要件中所说的危害结果不包括

- A) 死亡
- B) 加重患者医疗费用负担
- C) 严重毁容
- D) 残疾
- E) 组织器官损伤导致功能障碍

45. [单选题]宫颈癌时，可出现下列哪种病理性白带

- A) 持续淘米水样白带伴有奇臭
- B) 透明黏性白带
- C) 凝乳块状或豆渣样白带
- D) 脓性白带
- E) 灰白色均质鱼腥味白带

46. [单选题]男婴，足月，母乳喂养，生后第2天，血清总胆红素 $289 \mu\text{mol}/L$ ，小儿血型Rh阳性，母血型O，Rh阳性，小儿血直接抗人球蛋白的试验弱阳性，已查血常规及网织细胞计数。进一步作何种检查

- A) 血培养
- B) 血涂片找红细胞
- C) 肝功能检查
- D) 抗体释放试验

E) 测TORCH抗体

47. [单选题]全脓胸是指脓液积聚在下述哪个部位

- A) 肺叶之间
- B) 肺与纵隔之间
- C) 肺与横膈之间
- D) 肺与局部胸壁之间
- E) 占据一侧胸膜腔

48. [单选题]水俣病由于长期摄入

- A) 受镉污染中毒
- B) 受甲基汞污染的鱼贝类
- C) 砷较高淡水
- D) 硒较低粮食
- E) 真菌污染严重的食物

49. [单选题]第一产程活跃期停滞是指宫口不再扩张达

- A) 0.5小时以上
- B) 1小时以上
- C) 1.5小时以上
- D) 4小时以上
- E) 2.5小时以上

50. [单选题]男性，23岁，干咳、乏力两周。近几天来有发热、胸痛伴气促。胸部X线检查，右侧中等量胸腔积液。胸水化验：比重1.023，白蛋白30g/L，白细胞 $3.8 \times 10^9/L$ ，红细胞 $2.1 \times 10^{12}/L$ ，腺苷脱氨酶89U/L，该患者最可能的诊断是

- A) 化脓性胸膜炎
- B) 结核性胸膜炎
- C) 风湿性胸膜炎
- D) 病毒性胸膜炎
- E) 癌性胸腔积液

51. [单选题]原发性腹膜炎多发生于

- A) 老年人
- B) 孕妇
- C) 4岁以下体弱儿童
- D) 从事重体力
- E) 慢性咳嗽病人

52. [单选题]患者女性，28岁产妇，产后12日，发热、腹痛3日入院。T39.2°C，BP90/60mmHg，急性痛苦病容，下腹压痛。妇科检查：子宫如妊娠3个半月大，触痛明显。子宫右侧触及有压痛实性肿块。本例应诊断为

- A) 急性子宫肌炎
- B) 急性盆腔结缔组织炎
- C) 弥漫性腹膜炎
- D) 急性子宫内膜炎
- E) 急性盆腔腹膜炎

53. [单选题]下列哪项是缺氧引起呼吸加深加快的原因

- A) 刺激中枢感受器
- B) 刺激吸气神经元
- C) 直接刺激呼吸肌
- D) 刺激外周化学感受器

E) 刺激膈肌

54. [单选题]最有助于确诊室性心动过速的心电图表现 ()。

- A) P波与QRS波群无固定关系
- B) QRS波群形态畸形
- C) R-R间期绝对不等
- D) T波倒置
- E) 心室夺获

55. [单选题]男, 32岁。打球后突发头痛、呕吐, 伴右上肢Jack-son癫痫半分钟, 先后两次。神经系统检查, 颈有阻力, 右上肢肌力III度, 右上肢二头、三头肌腱反射亢进, 余无异常。脑脊液均匀血性。镜检红细胞满视野, 糖和氯化物正常。为明确病因最佳的检查是

- A) CT
- B) MRI
- C) 脑电图
- D) 经颅超声多普勒
- E) 脑动脉血管造影

56. [单选题]婴儿维生素D缺乏性佝偻病初期的主要表现为

- A) 嗜睡、疲乏无力
- B) 方颅、鸡胸
- C) 生长发育迟缓
- D) “O”形腿
- E) 多汗、睡眠不安、易激惹

57. [单选题]无症状菌尿下列, 需要长程低剂量抑菌疗法治疗的

- A) 老年女性
- B) 糖尿病
- C) 绝经期前非妊娠妇女
- D) 妊娠妇女治疗后复发
- E) 学龄儿童

58. [单选题]以不正当手段取得医师执业证书者

- A) 对负有直接责任的主管人员依法给予行政处罚
- B) 由发证的卫生行政部门予以吊销并依法给予行政警告
- C) 由发证的卫生行政部门吊销所在医疗机构的执业许可证
- D) 对负有直接责任的主管人员依法给予行政处分
- E) 由发证的卫生行政部门责令停止执业并依法给予罚款

59. [单选题]胆汁质气质的人, 其高级神经活动类型属于

- A) 强、均衡而灵活的活泼型
- B) 强、均衡而不灵活的安静型
- C) 强、不均衡而灵活的兴奋型
- D) 弱、不均衡、不灵活的抑制型
- E) 弱、均衡、灵活的灵活型

60. [单选题]下列哪项不是受精卵着床的必备条件

- A) 合体滋养细胞形成
- B) 子宫内膜蜕膜变
- C) 囊胚和子宫内膜的发育必须同步
- D) 有足量的孕酮支持

E)透明带消失

61. [单选题]下列检查中属于浅反射的是

- A)颈强直
- B)膝腱反射
- C)调节反射
- D)角膜反射
- E)跟腱反射

62. [单选题]手术室在破伤风或气性坏疽术后，其消毒方法是

- A)40%甲醛溶液消毒
- B)用1:1000新洁尔灭溶液擦洗室内物品，通风1小时
- C)紫外线照射
- D)高锰酸钾溶液消毒
- E)乳酸消毒法

63. [单选题]在肺癌的各种诊断手段中，CT由于其分辨率高可清楚显示肺野中()cm以上的肿块阴影

- A)2
- B)1.5
- C)2.5
- D)0.5
- E)1

64. [单选题]女，35岁，G5P0。停经5个月，患风湿性心脏病20年，心功能III级，曾因风湿性心脏病行人工流产3次。B超示中期妊娠，拟行剖宫取胎术。该患者最佳的避孕方法是()。

- A)紧急避孕药
- B)长效避孕针
- C)宫内节育器
- D)短效口服复方避孕药
- E)输卵管绝育术

65. [单选题]男，73岁，高血压病史10年，清晨排便时突发剧烈头痛，烦躁不安，并波及项背部；查体示颈抵抗(±)，四肢肌力、肌张力正常，则最可能的诊断为

- A)高血压脑病
- B)恶性高血压
- C)自发性蛛网膜下腔出血
- D)左基底节高血压性脑出血
- E)右基底节高血压性脑出血

66. [单选题]关于体内酶促反应特点的叙述，错误的是()。

- A)只能催化热力学上允许进行的反应
- B)可大幅降低反应活化能
- C)温度对酶促反应速度没有影响
- D)具有可调节性
- E)具有高催化效率

67. [单选题]尿中粘多糖增高的是

- A)先天愚型
- B)软骨发育不全
- C)承雷病
- D)垂体性侏儒症

E) 先天性甲状腺功能减低症

68. [单选题] 下列哪项不是肝硬化腹水形成的原因

- A) 门脉高压
- B) 低白蛋白血症
- C) 肝静脉回流受阻
- D) 有效循环血容量增加
- E) 继发性醛固酮增多

69. [单选题] 阈刺激是指

- A) 阈强度
- B) 阈值
- C) 强度阈
- D) 刺激阈
- E) 阈强度的刺激

70. [单选题] 有关单纯性下肢静脉曲张的临床表现描述错误的是

- A) 单纯性下肢静脉曲张以大隐静脉曲张为多见，单独的小隐静脉曲张较为少见
- B) 以右下肢多见，但双侧下肢可先后发病
- C) 主要表现为下肢浅静脉扩张、伸长、迂曲
- D) 病程进展、交通静脉瓣膜破坏后可出现踝部轻度肿胀和足靴区皮肤营养性变化
- E) 可以出现皮肤萎缩、脱屑

71. [单选题] 在中脑上下丘之间切断脑干的动物，将出现

- A) 上运动神经元麻痹
- B) 脊髓休克
- C) 去大脑僵直
- D) 肢体痉挛性麻痹
- E) 去皮质僵直

72. [单选题] 胎儿甲状腺发育最早在

- A) 妊娠2周
- B) 妊娠4周
- C) 妊娠6周
- D) 妊娠8周
- E) 妊娠12周

73. [单选题] 非特异性投射系统的主要功能是

- A) 调节内脏功能
- B) 调节随意运动
- C) 协调肌紧张
- D) 维持和改变大脑皮质的兴奋状态
- E) 引起特定感觉并激发大脑皮质发出神经冲动

74. [单选题] 男，30岁。从高处跌下，左腰部着地，伤后腰痛并有肉眼全程血尿，有小血块，查：BP 110/70mmHg，P 100次/分；左腰部青紫压痛，腹部无压痛反跳痛，可初步诊断为

- A) 膀胱损伤
- B) 输尿管损伤
- C) 脾损伤并肾损伤
- D) 肾裂伤
- E) 肾挫伤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/478140115113006072>