

## 骨科专科习题库及答案

一、单选题（共 105 题，每题 1 分，共 105 分）

1. 骨折固定中期功能锻炼的重点是（ ）

- A、全身各部位肌肉及关节活动
- B、骨折部位上、下关节活动
- C、伤肢肌肉进行舒缩活动
- D、完全依靠外力做被动运动

正确答案：B

2. 吸痰时（ ）

- A、动作宜轻柔，由外向内，边插入边抽吸
- B、动作宜慢，并上下提拉，左右旋转
- C、动作宜快，并上下提拉，左右旋转
- D、动作宜轻柔并向上提拉，左右旋转

正确答案：D

3. 一患者从三楼跌下臀部着地，两下肢完全不能活动，双侧腹股沟平面以下感觉消失，小便不能自解，最可能的诊断是（ ）

- A、胸 12 椎体骨折
- B、腰 5 椎体骨折
- C、骨盆骨折
- D、颈椎骨折

正确答案：A

4. 骨折治疗的首要步骤是（ ）

- A、复位
- B、固定
- C、搬运
- D、止血

正确答案：A

5. 单纯性胸腰压缩性骨折病人多长时间下床活动（ ）

- A、一周以上
- B、两周以上
- C、三周以上
- D、两到三周

正确答案：C

6. 最易造成骨折不愈合的因素是( )

- A、骨折间软组织嵌入
- B、畸形位置固定
- C、糖尿病
- D、高龄

正确答案：A

7. 良性和恶性骨肿瘤最重要的鉴别点是( )

- A、病理组织检查
- B、生长发育快慢
- C、X线片上肿块边缘是否清楚
- D、局部有无疼痛

正确答案：A

8. 中年男性，猛抬重物后腰剧烈痛并向右下肢放射，咳嗽时加重，其诊断最大可能是( )

- A、腰椎间盘突出症
- B、腰椎骨折
- C、腰椎滑脱症
- D、腰部肌筋膜炎

正确答案：A

9. 治疗颈椎单侧小关节脱位，错误的是( )

- A、可用持续颅骨牵引复位
- B、应及时摄X线片检查
- C、牵引过程中应立刻同时手法复位
- D、牵引重量不能超过10kg

正确答案：C

10. 预防压疮的关键在于( )

- A、合理使用气垫床
- B、消除诱因
- C、合理安排治疗
- D、高热量饮食

正确答案：B

11. 椎动脉型颈椎病最突出的临床表现为( )

- A、持物不稳

- B、猝倒
- C、闪电样锐痛
- D、眩晕

正确答案：D

12. 30 岁女性患者，环指离断伤，行再植术后 10 小时，发现患指苍白，皮温低于健侧  $3^{\circ}\text{C}$ ，予解除包扎，解痉药物等处理，不见好转，此时应采取（ ）

- A、抬高患肢，保温
- B、继续观察
- C、立即手术探查吻合的血管情况
- D、臂丛神经阻滞麻醉

正确答案：C

13. 以下评价骨龄方法中，错误的是（ ）

- A、髫棘骨骺移动
- B、手腕部骨龄
- C、男神声音改变
- D、月经初潮

正确答案：C

14. 下列哪项属于结构性脊柱侧弯（ ）

- A、下肢不等长性脊柱侧凸
- B、功能性脊柱侧凸
- C、特发性脊柱侧凸
- D、骨盆倾斜继发脊柱侧凸

正确答案：C

15. 颈椎管狭窄的典型表现是（ ）

- A、四肢无力
- B、双上肢疼痛
- C、恶心、呕吐
- D、头晕，头痛

正确答案：A

16. 椎管狭窄症的主要临床表现不包括的是（ ）

- A、髋关节疼痛
- B、下腰痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/485012100223012011>