

腹腔内感染的概述

腹腔内感染是指细菌、真菌等病原体在腹腔内引起的感染性疾病。它可能由于手术、创伤、肠破裂等原因导致病原体进入腹腔,引起严重的全身感染。及时诊断和有效治疗是关键。

sa

by s s



腹腔内感染的病因

手术操作

外科手术可能由于缝线松动、手术操作不当等原因造成腹腔内漏液或组织坏死,从而引发感染。

创伤及损伤

腹部外伤、消化道穿孔等可使病原体侵入腹腔,导致感染。

原发感染转移

肝脓肿、胆囊炎等原发感染可通过血行和淋巴途径扩散至腹腔。

免疫功能低下

糖尿病、肿瘤等基础疾病可降低机体免疫功能,增加感染风险。

腹腔内感染的症状表现



腹部疼痛

患者常出现持续性、剧烈的腹部疼痛,疼痛程度可随病情的进展而加重。



高热寒战

感染常伴有持续性高热,同时可出现寒战、畏寒等症状。



恶心呕吐

腹腔内感染可导致胃肠道功能障碍,表现为恶心、呕吐等症状。



肠道功能障碍

感染可引起肠麻痹,出现腹胀、便秘等症状。重症患者可出现肠梗阻。

腹腔内感染的诊断方法

身体检查

仔细询问病史并进行体格检查,如触诊可感到腹部压痛、肿块等异常。

实验室检查

常规血常规、生化检查可显示白细胞升高、C反应蛋白增高等炎症指标。

影像学检查

CT、MRI、超声等成像技术可清晰显示腹腔内液体积聚、脓肿形成等情况。

病原学诊断

腹腔穿刺吸引或手术探查可获得感染物质进行细菌或真菌培养鉴定。

腹腔内感染的并发症

1

败血症

严重的腹腔内感染可导致细菌或毒素进入血液, 引发全身性炎症反应和器官功能衰竭。

2

肠梗阻

感染导致肠道肿胀、粘连, 可出现肠梗阻, 严重时需要外科手术。

3

多器官功能障碍

重症感染可引发呼吸衰竭、肾功能衰竭等多器官受累, 危及生命。

4

腹腔脓肿

感染灶不能及时清除可导致局部腹腔内脓肿形成, 需要手术引流。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/497102106156006131>