

中医科三基三严理论知识考试

一、选择题

1.铜绿假单胞菌感染病人应选择的漱口液是() [单选题] *

A.1%~4%碳酸氢钠溶液

B.1%~3%过氧化氢溶液

C.0.1%醋酸溶液✓

D.2%~3%硼酸溶液

E.0.02%呋喃西林溶液

2.测量血压被测者坐位或仰卧位时,肱动脉应分别平() [单选题] *

A.第3肋软骨腋中线

B.第4肋软骨腋中线✓

C.第5肋软骨,腋前线

D.第6肋软骨腋后线

E.第6肋软骨腋前线

3.赵某,输血15分钟后感觉头胀、四肢麻木、腰背部剧痛,脉细弱,血压下降,下列护理措施错误() [单选题] *

A.减慢输血速度✓

B.立即通知医师

C.热水袋敷腰部

D.观察血压、尿量

E.取血标本和余血送检血型鉴定和交叉试验

4.对体温过低的老年病人,下列护理措施哪项不妥() [单选题] *

A.提高室温

B.保暖

C.饮热饮料

D.持续监测体温变化

E.增加病人活动量 ✓

5.临床上须过同速时测心率和脉率的是() [单选题] *

A.心动过速的病人

B.心房颤动病人 ✓

C.心动过缓病人

D.心律失常病人

E.阵发性心动过速病人

6.呼吸和呼吸暂停现象交替出现,称为() [单选题] *

A.陈施呼吸

B.比奥呼吸 ✓

C.库斯莫呼吸

D.浮浅性呼吸

E.鼾声呼吸

7.体温骤降时,病人最易出现() [单选题] *

A.虚脱 ✓

B.头痛

C. 谵妄

D. 昏迷

E. 寒战

8.肺炎链球菌性肺炎病人发热的热型为() [单选题] *

A.间歇热

B. 弛张热

C .不规则热

D.稽留热✓

E.波状热

9.乙醇拭浴降温的主要机制是() [单选题] *

A.传导

B. 蒸发✓

C. 辐射

D.对流

E .折射

10.某病人今晨距小腿关节扭伤,局部青紫,为防止皮下出血与肿胀,早期应选用() [单选题] *

A.局部按摩

B.红外线照射

C.冷湿敷✓

D.热湿敷

E.热水袋热敷

11. 在无菌技术操作中,启封的无菌溶液在未被污染的情况下限用() [单选题] *

- A.2 小时
- B.4 小时
- C.12 小时
- D.24 小时✓
- E.36 小时

12.一 70 岁老年人,测得血压为 150/90mmHg,应考虑为 () [单选题] *

- A.正常血压✓
- B.临界高血压
- C.高血压
- D.低血压
- E.脉压减小

13.床上擦浴适宜的水温是 () [单选题] *

- A.32°C~34°C
- B.36°C~40°C
- C.41°C~45°C
- D.47°C~50°C✓
- E.55°C~60°C

14.口臭病人应选择的漱口液是 () [单选题] *

- A.1%~4%碳酸氢钠溶液
- B.1%~3%过氧化氢溶液✓
- C.0.1%醋酸溶液
- D.2%~3%硼酸溶液

E.0.02%呋喃西林溶液

15.取用无菌溶液时,先倒出少量溶液的目的在于() [单选题] *

A.检查瓶口有无裂缝

B.冲洗瓶 V 口✓

C.查看溶液的颜色

D.检查溶液有无沉 淀

E.嗅察溶液有无异味

16 .男,42 岁,发热 2 周,伴进行性贫血,全身乏力 , 急诊入院。体温 39.2°C,脉搏 98 次/min,超检查提示

脾大,初诊为亚急性心内膜炎,需做血培养进一步明确诊断。该病人应取血() [单选题] *

A. 2-3 mL

B. 4~5 ml

C.6~8ml

D. 10~15ml✓

E. 18~20ml

17. 王某,静脉补液 1000ml,50 滴/分 , 从上午 8 时 20 分开始 , 估计何时可滴完() [单选题] *

A.上午 11 时

B.中午 12 时 20 分

C.下午 1 时 20 分✓

D.下午 2 时

E.下午 2 时 20 分

18.进行青霉素皮肤试验前应重点评估的内容是() [单选题] *

A.用药史和过敏史✓

- B. 意识状态与合作能力
- C. 目前诊断与病情
- D. 注射局部有无红肿硬结
- E. 目前心里状况和家庭经济状况

19. 尿蛋白定量测定, 尿标本中应加入何种防腐剂 () [单选题] *

- A. 甲苯✓
- B. 浓盐酸
- C. 甲醛
- D. 碳酸
- E. 高锰酸钾

20. 有关生命体征的概念, 下列哪项正确 () [单选题] *

- A. 体温、脉搏、呼吸、血压的总称✓
- B. 体温、脉搏、呼吸、血压、瞳孔的总称
- C. 体内生命活动的总称
- D. 体温、脉搏、呼吸、血压、意识的总称
- E. 体温、脉搏、呼吸、血压和神志的总称

21. 插胃管时, 病人出现呛咳、发绀时, 护士应 () [单选题] *

- A. 嘱病人深呼吸
- B. 立即拔出胃管重插✓
- C. 嘱病人做吞咽动作
- D. 让病人休息一会再插
- E. 请病人坚持一下

22.膀胱高度膨胀又极度虚弱的病人,首次导尿量不得超过() [单选题] *

- A.100ml
- B.500ml
- C.1000ml✓
- D.2000ml
- E.3000ml

23.乙醇拭浴时头部置冰袋的目的是 () [单选题] *

- A. 防止感冒
- B. 防止腹泻
- C. 防止血管扩张引起出血
- D. 防止表皮血管收缩头部充血✓
- E.预防血压下降

24.使用超声雾化器时,水槽中的水温不应超过() [单选题] *

- A.40°C
- B.50°C
- C.60°C✓
- D.70°C
- E.80°C

25.李某,进行青霉素皮肤试验 5 分钟后突然晕倒在地,面色苍白,呼吸微弱,脉搏细弱,意识丧失,护士首先应() [单选题] *

- A.立即通知医师
- B.立即给予氧气吸入

C.立即肌肉注射洛贝林

D.立即皮下注射异丙肾上腺素

E.立即皮下注射盐酸肾上腺素✓

26.对破伤风抗毒素皮肤试验阳性病人采用脱敏注射的原理是() [单选题] *

A.促进吞噬细胞对 IgE 的灭活作用

B.抑制肥大细胞吸附 IgE

C.逐步结合体内的 IgE✓

D.与体内 IgE 竞争受体

E.封闭 IgE,阻断与抗原结合

27.张某,在输液过程中突然感到胸部异常不适,随后出现呼吸困难,严重发绀,其最大可能及首要处理是()

[单选题] *

A.肺水肿,停止输液

B. 空气栓塞,立即左侧卧位✓

C.过敏,皮下注射地塞米松

D.心脏病发作,立即遵医嘱用强心药

E.低血容量性休克,立即补充血容量

28.徒手心肺复苏时胸外心脏按压的部位为() [单选题] *

A.胸骨中 1/3 与下 1/3 交界处✓

B.心尖部

C.剑突下 2 横指处

D.胸骨中段

E. 胸骨

29.白假丝酵母菌口炎病人应选择的漱口液是 () [单选题] *

A.1%~4%碳酸氢钠溶液✓

B.1%~3%过氧化氢溶液

C.0.1%醋酸溶液

D.2%~3%硼酸溶液

E.2%~3%呋喃西林溶液

30.口腔护理的目的不包括 () [单选题] *

A.保持口腔清洁

B.防止口臭、口垢

C.观察口腔黏膜及舌苔

D.清除口腔内一切细菌✓

E.预防口腔感染

31. 心室舒张时射血停止,但血液仍在流动,其动力来自 () [单选题] *

A.心脏收缩力的余波

B.外周阻力相对减小

C.主动脉的弹性回缩✓

D.动脉管口径增大

E.惯性作用

32.为昏迷病人实施口腔护理错误的是 () [单选题] *

A.应用开口器时应从磨牙处放入

B.擦洗时棉球不宜过湿

C.应夹紧棉球

D.操作前后应清点棉球数量

E.注意选择合适的漱口液漱口✓

33.急性左心衰病人采取端坐位的主要目的是() [单选题] *

A.减少静脉回心血量,减轻肺淤血和心脏负担✓

B.使膈肌下降,减轻对心脏的压迫

C.扩大胸腔容量,增加肺活量

D.扩张冠状动脉,改善心肌血液循环

E.病人舒适,有利于休息

34.使用约束带时,错误的是() [单选题] *

A.使用约束带前应向家属解释目的和意义,取得配合

B.严格掌握约束带的适应证

C.带下应垫衬垫,固定时松紧适宜

D.为便于松解,宽绷带应打活结✓

E.注意观察约束部位的血液循环

35.开放式输液过程中添加药液错误的操作是() [单选题] *

A.认真查对药液名称与质量

B.添加溶液时溶液瓶勿触及输液瓶口

C.用注射器加药时应拧紧针栓✓

D.加药时应距离输液瓶口约 1cm

E.加药后应轻轻摇匀药液

36.可以上人工呼吸机的病人是() [单选题] *

A.心肌梗死病人

- B.大量的活动性咯血病人
- C.大量胸腔积液病人
- D.严重的气胸病人
- E.呼吸骤停经各种治疗无效者✓

37.人体在安静状态下处于低温环境中的主要散热形式是 () [单选题] *

- A. 辐射✓
- B. 传导
- C.蒸发
- D.对流
- E. 运动

38.病人长期仰卧时,最容易发生压疮的部位是 () [单选题] *

- A.枕部
- B .足跟
- C. 骶尾部✓
- D.髂前上棘
- E.肩胛部

39.下列各病类病人不需鼻饲术法进食的人是 () [单选题] *

- A.昏迷病人
- B.口腔手术后
- C.早产儿
- D.破伤风病人
- E. 休克病人✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/505103321144011104>