

# 2021 卫生资格初级护师内科护理模拟 试题及答案

姓名

分数

---

## 一、 选择题(每题 0.25 分,共 25 分)

1、急性胰腺炎病人禁食时每天应补液多少毫升

- A. 500
- B. 1000
- C. 1500
- D. 1800
- E. 2500

答案: E

2、急性白血病与急性再障不同点是

- A. 胸骨压痛
- B. 发热
- C. 贫血
- D. 出血
- E. 食欲不振

答案: A

3、男, 10 岁, 突发寒战、高热、抽搐、昏迷。体温: T: 40. 5℃, P140 次 / min, Bp8. 2 / 4. 3kPa(61 / 32mmHg), 口唇紫绀, 实验室检查: 血白细胞  $15 \times 10^9$  / L, 中性粒细胞 82%, 肛试子取便, 镜检: 脓细胞(+), 拟诊断为细菌性痢疾。正确的类型是

- A. 中毒性细菌性痢疾(脑型)
- B. 慢性细胞性痢疾急性发作
- C. 急性细菌性痢疾(普通型)
- D. 中毒性细菌性痢疾(休克型)

E. 中毒性细菌性痢疾(混合型)

答案: D

4、对肥厚型心肌病最有诊断价值的辅助检查是

A. 心电图

B. Holter

C. 胸片

D. 超声心动图

E. 运动试验

答案: D

5、肾功能不全失代偿期的临床表现

A. 心包摩擦音

B. 口有氨味

C. 全身瘙痒

D. 乏力, 食欲减退, 贫血

E. 消瘦, 水肿

答案: D

6、慢性支气管炎诊断标准是在排除其他心肺疾病后

A. 咳嗽、咳痰持续半年以上

B. 咳嗽、咳痰伴喘息持续半年以上

C. 咳嗽、咳痰伴喘息反复发作每年 2 个月, 连续 2 年或 2 年以上

D. 咳嗽、咳痰伴喘息反复发作每年至少 3 个月, 连续 2 年或 2 年以上

E. 咳嗽、咳痰伴喘息反复发作连续 2 年或 2 年以上

答案: D

7、某肺结核病患者, 胸片示右上肺浸润性病灶, 并出现薄壁空洞, 痰菌涂片阳性, 应诊断为:

A. 浸润型肺结核, 痰菌涂片 (+), 进展期

B. 浸润型肺结核, 痰菌涂片 (+), 稳定期

C. 原发型肺结核, 痰菌涂片 (+), 进展期

D. 原发型肺结核, 痰菌涂片 (+), 稳定期

E. 慢性纤维空洞型肺结核, 痰菌涂片 (+) 进展期

答案: A

8、全血细胞减少、骨髓三系增生低下，你认为符合下列何种疾病护理评估的实验室检查

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 急性白血病
- D. 慢性白血病
- E. 特发性血小板减少性紫癜

答案：B

9、流行性脑脊髓膜炎最常见的皮疹为

- A. 玫瑰色斑丘疹
- B. 瘀点和瘀斑
- C. 单纯疱疹
- D. 脓疱疹
- E. 鸡皮疹

答案：B

10、女性，22岁，突起高热，上腹不适，恶心，食欲减退，体温38.5℃，出现黄疸，皮肤瘙痒，肝肋下1.5cm，腹水阴性，血ALT1200U，初步诊断为甲型病毒性肝炎，此型肝炎的传播途径是

- A. 呼吸道传播
- B. 消化道传播
- C. 性传播
- D. 母乳传播
- E. 血液传播

答案：B

11、癫痫大发作时最主要的护理是

- A. 避免外伤
- B. 不可强力按压肢体
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 严密观察意识和瞳孔的变化
- E. 禁用口表测试体温

答案：C

12、蛛网膜下腔出血病人查体可发现最具特征性的是

- A. 精神症状
- B. 颈项强直等脑膜刺激征
- C. 去大脑强直
- D. 偏瘫
- E. 失语

答案：B

13、关于特发性血小板减少性紫癜的诊断下列何项最有价值：

- A. 血小板计数
- B. 骨髓象
- C. 毛细血管脆性试验
- D. 血小板相关 IgG
- E. 出、凝血时间

答案：B

14、心律失常病人尽量避免哪种卧位以防不适感

- A 右侧卧位
- B 左侧卧位
- C 高枕卧位
- D 半卧位
- E 坐位

答案：B

15、国务院规定报告传染病疫情的时限是

- A. 甲类传染病在城市 6h 内，农村 12h 内
- B. 甲类传染病在城市、农村均应在 12h 以内
- C. 甲类传染病在城市 12h 内，农村 24h 内
- D. 乙类传染病在城市 6h 内，农村 12h 内
- E. 乙类传染病在城市 8h 内，农村 16h 内

答案：A

16、患者，女性，急性腹痛发作 10h 入院，下列哪项检查对诊断急性胰腺炎最有价值：

- A. 血清淀粉酶测定
- B. 血清脂肪酶测定

- C. 血糖测定
- D. 血清钙测定
- E. 血清谷丙转氨酶测定

答案：A

17、按组织学分型，支气管肺癌最常见的类型为：

- A. 鳞状上皮细胞癌
- B. 小细胞未分化癌
- C. 大细胞未分化癌
- D. 腺癌
- E. 细支气管-肺泡细胞癌

答案：A

18、给患者换用洋地黄类药物前，护士应先测量

- A. 体温
- B. 脉搏
- C. 呼吸
- D. 血压
- E. 体重

答案：B

19、艾滋病的病原体是：

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 立克次体
- D. 螺旋体
- E. 真菌

答案：A

20、下列哪项不是低血糖反应的表现：

- A. 饥饿感
- B. 高热
- C. 心悸
- D. 软弱, 出汗

E. 面色苍白

答案：B

21、护士给病人服用地高辛前应先测量

A. 体温

B. 脉搏

C. 血压

D. 呼吸

E. 尿量

答案：A

22、下列哪项不是脑膜炎球菌的特征

A. 属于奈瑟菌属

B. 革兰染色阴性，卵圆形，多成对排列

C. 产生毒力较强的内毒素与外毒素

D. 可从病人鼻咽部、血、脑脊液、皮肤瘀斑中检出

E. 涂片中细菌多见于中性粒细胞内

答案：C

23、原发性肝癌肝区疼痛常呈

A. 持续性胀痛

B. 间歇性隐痛

C. 阵发性绞痛

D. 连续性灼痛

E. 偶发性剧痛

答案：A

24、正常男性每天排泄铁量

A. 超过 1mg

B. 不超过 1mg

C. 不超过 1g

D. 超过 1g

E. 不超过 1.5mg

答案：B

25、端坐位为何可减轻左心衰的呼吸困难

- A. 减轻肺瘀血
- B. 减轻上腔静脉瘀血
- C. 减轻下腔静脉瘀血
- D. 减轻肠系膜静脉瘀血
- E. 减轻门静脉瘀血

答案：A

26、三腔管放置 24h 后，食管气囊应放气：

- A. 5-10min
- B. 10-15min
- C. 15-30min
- D. 30-45min
- E. 45-60min

答案：C

27、确诊菌痢最可靠的依据是：

- A. 脓血便
- B. 清水样便
- C. 大便培养阳性
- D. 免疫检查阳性
- E. 明显里急后重

答案：C

28、血清淀粉酶在发病后开始升高的时间是：

- A. 3-4h
- B. 6-8h
- C. 10-12h
- D. 16-20h
- E. 24h 左右

答案：B

29、何种胃炎常易癌变

- A. 表浅性胃炎

- B. 肥厚性胃炎
- C. 胃体胃炎
- D. 萎缩性胃炎
- E. 胃窦胃炎

答案：D

30、治疗肝昏迷正确的治疗措施有：

- A. 高蛋白饮食
- B. 肥皂水清洁灌肠
- C. 静注多巴胺
- D. 口服制酸剂
- E. 谷氨酸钾静滴

答案：E

31、肝硬化晚期最突出的临床表现是

- A. 贫血
- B. 夜盲
- C. 腹水
- D. 痔疮
- E. 水肿

答案：C

32、原发性肝癌终末期最常见的致死并发症是

- A. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- B. 肝性脑病
- C. 腹水继发感染
- D. 肝癌结节破裂出血
- E. 应激性溃疡出血

答案：B

33、肺炎球菌肺炎患者的热型常呈

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热

- D. 波状热
- E. 不规则热

答案：A

34、二尖瓣狭窄患者突然出现偏瘫，应考虑

- A. 脑血栓形成
- B. 脑栓塞
- C. 脑血管痉挛
- D. 脑出血
- E. 蛛网膜下腔出血

答案：B

35、肝硬化内分泌失调引起的表现为：

- A. 营养障碍
- B. 出血
- C. 皮肤色素沉着
- D. 贫血
- E. 腹泻、舌炎

答案：C

36、冠心病为何引起心力衰竭

- A. 长期高脂饮食
- B. 心肌收缩无力
- C. 长期高血糖
- D. 长期吸烟
- E. 高血压

答案：B

37、某慢性粒细胞白血病病人，在化疗期间，采用的对症护理措施，错误的是

- A. 多饮水并碱化尿液
- B. 对脱发者应说明化疗结束时可再生
- C. 消化道反应呕吐者应暂禁食
- D. 皮疹者忌用肥皂水擦洗
- E. 口腔发炎者避免食用刺激性食物

答案：C

38、肝性脑病发生代谢性碱中毒时可用：

- A. 谷氨酸钠
- B. 谷氨酸钾
- C. 乙酸谷氨酸胺
- D. 精氨酸
- E. 不作处理

答案：D

39、结核病化疗联用的主要目的

- A. 减少并发症
- B. 避免发生耐药性，增加疗效
- C. 避免不良反应
- D. 可完全杀灭结核菌
- E. 缩短疗程

答案：B

40、诊断早期慢性肺心病的主要依据是

- A. 长期支气管、肺癌病史
- B. 紫绀
- C. 高碳酸血症
- D. 肺动脉高压及右心室增大征象
- E. 两肺干、湿罗音及肺气肿体征

答案：D

41、SLE 皮肤损害最常见的是：

- A. 环形红斑
- B. 瘀点、瘀斑
- C. 蝶形红斑
- D. 荨麻疹
- E. 玫瑰疹

答案：C

42、刺激性呛咳或带金属音的咳嗽应首先考虑

- A. 上呼吸道感染
- B. 肺部病变早期
- C. 支气管肺癌
- D. 支气管扩张
- E. 左心功能不全

答案：C

43、流脑确诊的依据是

- A. 冬春季发病
- B. 高热、头痛、呕吐
- C. 脑脊液呈化脓性改变
- D. 血或脑脊液培养(+)
- E. 典型的脑膜刺激征

答案：D

44、慢性肾炎引起的肾功不全代偿期症状特点

- A. 肾功不全尚无表现
- B. 高血压
- C. 水肿
- D. 蛋白尿
- E. 管型尿

答案：A

45、护理脑出血时错误的一项是

- A. 大便失禁时臀下垫小布垫
- B. 尿失禁者可留置尿管
- C. 保持床铺清洁、干燥、及时更换
- D. 便秘时行大量不保留灌肠
- E. 保持会阴部干燥，可涂保护性润滑油

答案：D

46、抽取胰岛素时，通常用的注射器规格是：

- A. 1ml
- B. 2ml

- C. 5ml
- D. 10ml
- E. 20ml

答案：A

47、系统性红斑狼疮(SLE)是一种

- A. 感染性疾病
- B. 自身免疫性疾病
- C. 传染性疾病
- D. 遗传性疾病
- E. 以上都不是

答案：B

48、低血糖反应，急救措施是

- A. 减少胰岛素用量
- B. 就地休息
- C. 立即输入氯化钠
- D. 立即食糖果或含糖饮料
- E. 加大饭量

答案：D

49、适合急性肾盂肾炎病人的饮食需要是

- A. 高脂肪、高蛋白饮食
- B. 高脂肪、多维生素、多饮水
- C. 高脂肪、高糖、高维生素饮食
- D. 高脂肪、高热量、高钙饮食
- E. 清淡富有营养、多种维生素饮食、多饮水

答案：E

50、红细胞平均体积英文简称

- A. MCV
- B. MCHC
- C. MCH
- D. MVC

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/506240042053010045>