

皮肤性病学模拟试题与参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、患者，女，34 岁，四肢反复水疱伴痒 2 年，尤以摩擦部位易发生水疱。查体：四肢末端、肘膝关节伸侧可见绿豆大水疱，基底不红，疱壁厚，尼氏症(-)，皮损愈合处见疤痕。皮损组织病理示：表皮下水疱，疱内可见中性粒细胞浸润。确诊该病，以下实验室检查中最具诊断价值的方法是

- A、皮肤电镜检查
- B、疱液涂片检查
- C、盐裂试验
- D、间接免疫病理
- E、皮肤直接免疫病理

正确答案：C

2、DLE 患者正常皮肤处，狼疮带试验阳性率为

- A、0
- B、10%~30%
- C、30%~50%
- D、50%~70%
- E、70%~90%

正确答案：A

3、正常情况下表皮通过时间为

- A、35 天
- B、14 天
- C、21 天
- D、7 天
- E、28 天

正确答案：E

4、反复发作的单纯疱疹患者可能存在

- A、体液免疫缺陷
- B、自身免疫疾病
- C、联合免疫缺陷
- D、细胞免疫缺陷
- E、恶性肿瘤

正确答案：D

5、患者，女，30岁，眼睑周围丘疹5年，逐渐增多，皮损呈肤色，直径1~3mm，密集而不融合，无自觉症状。可诊断为

- A、脂溢性角化病
- B、粟丘疹
- C、皮肤纤维瘤
- D、痣细胞痣
- E、汗管瘤

正确答案：E

6、以下关于单纯疱疹诊断方法的描述，正确的是

- A、细胞学检查见到多核巨细胞有助于诊断
- B、PCR检测HSV-DNA是诊断的金标准
- C、病毒培养鉴定有辅助诊断价值
- D、HSV-IgG型抗体检测有辅助诊断价值
- E、以上都不对

正确答案：A

7、抗凝药引起紫癜的可能发病机制是

- A、过量反应
- B、蓄积作用
- C、药理作用
- D、变态反应
- E、代谢酶缺陷

正确答案：C

8、II型变态反应引起的药疹，最常 的皮损是

- A、水疱
- B、紫癜
- C、团
- D、血管炎
- E、水肿性红斑

正确答案：B

9、患者，男，20岁，脐部反复红斑、丘疹伴痒3年，冬季减轻或消失，夏季复发。查体：腹部见以肚脐为中心的红斑、丘疹，边界相对清楚。该患者过敏最可能的病因为

- A、衣物摩擦
- B、衣物材质

- C、汗液刺激
- D、衣物染料
- E、衣物金属扣

正确答案：E

10、不具有光敏作用的药物是

- A、四环素
- B、避孕药
- C、氧氟沙星
- D、红霉素
- E、青霉素

正确答案：D

11、维生素 B2 缺乏可引发

- A、皮肤粗糙、发干、脱屑
- B、口角炎、阴囊炎
- C、皮肤淤斑
- D、毛细血管扩张
- E、皮肤溃疡

正确答案：B

12、可出现 Kobner 现象的是

- A、红斑狼疮
- B、疣状皮肤结核
- C、颜面播散性粟粒性狼疮
- D、银屑病
- E、寻常狼疮

正确答案：D

13、患者，男，25 岁，因“阴茎溃疡 2 周”就诊，无疼痛等不适。外院 RPR 结果为阳性，滴度 1:4，该患者需要做的进一步检查是

- A、梅毒螺旋体明胶凝集试验
- B、抗心磷脂抗体检查
- C、甲苯胺红不加热血清反应素试验
- D、性病研究实验室试验
- E、快速血浆反应素环状卡片试验

正确答案：A

14、痤疮的治疗原则不包括

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/507052045100006116>