



关于手术室院内感 染及控制措施



1

引起手术感染的因素

2

手术室控制感染应采取的措施

3

特殊感染手术后的处理




一、引起手术感染的因素

- 1、手术室布局不合理，洁污未分开
- 2、空气中致病菌污染：生活环境中的空气存在着大量的飞沫、尘埃，这些都携带者大量的病原菌，如果手术室空气消毒不合格，这些带菌的微粒进入以后，就有可能引起感染。
- 3、手术人员洗手不彻底：手术者的手是直接接触手术切口的，因此术者刷手时一定要按照要求进行规范刷手，若刷手不彻底，一旦手套破损，手就成了污染源，造成切口感染。



- 美国科研人员最新研究发现，与男性相比，女性手上细菌种类更多，而且每个人手上的细菌种类超过预期。不仅个体之间手上细菌种类差异大，同一个人左右手上的细菌种类也只有 17% 相同。
- 一个人手上的细菌数量可达40万。





- 4、病人本身：病人术前进行清洁卫生未做好，对于择期手术者在保证病人安全的情况下要进行术前洗澡，更换清洁衣裤、备皮等防止切口感染。但有些病人如急诊、病情危重、有感染伤口者身上会带大量的致病菌，再说手术对病人来说也是一种创伤，能引起机体抵抗力下降，容易造成切口感染。
- 5、手术过程中器械、敷料被污染。
- 6、手术后器械清洗不彻底就进行高压灭菌，因为器械商残留的血迹、体液、蛋白质等有机物质，会在其表面形成一层生物膜，该膜会削弱消毒和灭菌效果。
- 7、推车：在进出只有一个平车的情况下，会把病房内的病毒、细菌带入手术室。













以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/508123037016006062>