

# 医院药师处方审核能力培训考试

## 一、单选题

1 下列关于处方审核意义的选项中，哪项是错误的（） [单选题] \*

- A 提升医院用药安全
- B 降低整体医疗成本
- C 完善医疗质量管控
- D 对医师进行处罚 ✓

2、下列关于处方审核的内容选项中，哪项是错误的（） [单选题] \*

- A 合法性
- B 规范性
- C 适宜性
- D 经济性 ✓

3、超说明书用药是指（） [单选题] \*

- A 指药品使用的适应证、给药方法或剂量在药品监督管理部门批准的说明书之内的用法。
- B 指药品使用的适应证、给药方法或剂量不在药品监督管理部门批准的说明书之内的用法。
- C 指药品使用的适应证、剂量、疗程、途径或人群等未在药品监督管理部门批准的药品说明书记载范围内的用法。 ✓
- D 指药品使用的适应证、剂量、疗程、途径或人群等在药品监督管理部门批准的药品说明书记载范围内的用法。

4、下列关于老年人药物治疗原则的选项中，哪项错误（） [单选题] \*

A 避免多重用药

B 选择适当的剂量及疗程

C 合理选择药物

D 尽量选择口服药物 ✓

5、下列关于老年人避免二甲双胍与造影剂合用的原因选项中，哪项为正确答案（） [单选题] \*

A 造影剂可导致肾损伤，特别是老年人，易致二甲双胍蓄积而引起乳酸酸中毒 ✓

B 二甲双胍加速造影剂代谢

C 造影剂抑制二甲双胍吸收

D 造影剂加速二甲双胍排泄

6、青霉素过敏性休克属于（） [单选题] \*

A I 型超敏反应 ✓

B II 型超敏反应

C III 型超敏反应

D IV 型超敏反应

7、如成人患者发生过敏性休克，应立即肌注或皮下注射（） [单选题] \*

A 去甲肾上腺素

B 肾上腺素 ✓

C 阿托品

D 地西洋

8、下列关于药物 FDA 字母分级中，哪个选项错误（） [单选题] \*

AB 级表示动物实验研究未见对胎儿有危害，无临床对照实验，未得到有害证据

BC 级表示动物实验表明对胎儿有不良影响，或尚未对妊娠妇女及动物进行研究，只能在充分权衡药物对孕

妇的益处、胎儿潜在利益和胎儿危害情况下，谨慎使用

CD 级表示有足够证据证明对胎儿的危害性，只有在孕妇有生命威胁或患有严重疾病，而其他药物又无效的情况下考虑使用

DX 级表示临床对照研究，无法证实药物对胎儿有危害作用，对胎儿伤害可能性最小 ✓

9、酚麻美敏片（泰诺）成分中含有氢氯酸右美沙芬 15mg,因此禁用于妊娠期几个月内的妇女（） [单选题] \*

A 3 个月内 ✓

B 6 个月内

C 8 个月内

D 整个妊娠期

10、下列第三代头孢菌素药物中，对铜绿假单胞菌有效的药物为（） [单选题] \*

A 头孢唑肟

B 头孢曲松

C 头孢他啶 ✓

D 头孢地嗪

11、咪诺酮类药物禁用于下列哪些人群，除了（） [单选题] \*

A 禁用于 18 岁以下人群

B 禁用于妊娠期、哺乳妇女

C 禁用于重症肌无力患者

D 禁用于糖尿病患者 ✓

12、伏立康唑注射剂中的赋形剂主要经肾排泄，肌酐清除率小于（）的患者不易使用伏立康唑注射剂 [单选题] \*

A 肌酐清除率  $< 50 \text{ml/min}$

B 肌酐清除率  $< 60 \text{ml/min}$

C 肌酐清除率  $< 80 \text{ml/min}$

D 肌酐清除率  $< 90 \text{ml/min}$

13、抗胆碱能药物的作用机制为（） [单选题] \*

A 抑制气道平滑肌 M 受体，阻止胆碱能神经兴奋导致的气道平滑肌收缩抑制节后胆碱能神经兴奋引起的黏液过量分泌 ✓

B 选择性兴奋支气管平滑肌  $\beta_2$  受体，激活腺苷酸环化酶，使三磷酸腺苷转换为环磷酸腺苷（cAMP）发挥舒张支气管作用

C 抑制磷酸二酯酶

D 减少炎症细胞如巨噬细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、肥大细胞、淋巴细胞的数量，进而减少 IL-8、TNF- $\alpha$ （等细胞因子的分泌

14、患有 COPD 的心绞痛患者应选用（） [单选题] \*

A 普萘洛尔

B 尼莫地平

C 硝苯地平 ✓

D 美托洛尔

15、注射用奥美拉唑应选用下列哪种溶媒进行稀释（） [单选题] \*

A 100ml 0.9%的氯化钠注射液 ✓

B 250ml 0.9%的氯化钠注射液

C 500ml 0.9%的氯化钠注射液

D 500ml 15%的葡萄糖注射液

16、注射用紫杉醇（白蛋白结合型）应选用下列哪种溶媒最适宜（） [单选题] \*

A 灭菌注射用水

B 0.9%氯化钠注射液 ✓

C 5%葡萄糖注射液

D 乳酸林格注射液

17、下列有关证据分级选项中，证据等级最高的为（） [单选题] \*

A 动物实验研究

B 专家意见、观点、评论

C 病例分析

D 指南、系统评价和荟萃分析或 META 分析 ✓

18、肝功能不全患者避免使用下列中药，除了（） [单选题] \*

A 雷公藤

B 朱砂

C 何首乌

D 甘草 ✓

19、复方丹参注射液与下列那种药物配伍使用时会产生乳白色沉淀（） [单选题] \*

A 注射用苯星青霉素

B 左氧氟沙星注射液 ✓

C 头孢哌酮钠舒巴坦钠

D 万古霉素

20、胃粘膜保护剂的服药时间 TS 为 ( ) [单选题] \*

A 餐前 0.5 · 1 小时或睡前服用 ✓

B 餐后 1 小时

C 餐后 2 小时

D 餐中服用

21、服用氯吡格雷的患者，避免与下列药物联用 ( ) [单选题] \*

A 奥美拉唑 ✓

B 兰索拉唑

C 泮托拉唑

D 雷贝拉唑

22、下列药物哪一个是抗高血压首选药物 ( ) [单选题] \*

A 可乐定

B 肝屈嗪

C 乙酰理胺

D 厄贝沙坦 ✓

23、下列药物哪一个是利尿剂 ( ) [单选题] \*

A 利血平

B 地尔硫卓

C 阿利吉仑

D 呋塞米 ✓

24、下列药物哪一个会引起干咳的不良反应的药物： ( ) [单选题] \*

- A 螺内酯
- B 福辛普利 ✓
- C 阿利吉仑
- D 替米沙坦

25、妊娠合并糖尿病首选的药物为 ( ) [单选题] \*

- A 甲苯磺丁眼
- B 胰岛素 ✓
- C 格列毗嗪
- D 二甲双弧

26、男，24 岁「多饮多食多尿消瘦」症状 6 月。2 日前感冒发热，食欲减退。随机血糖 18.6mmol/L,尿

酮 (3+)，则选择 ( ) 治疗 [单选题] \*

- A 加强饮食控制
- B 口服阿卡波糖
- C 口服二甲双服
- D 皮下注射胰岛素 ✓

27、布洛芬混悬液 (美林) 适用年龄为 ( ) [单选题] \*

- A 1 月龄以上
- B 3 月龄以上
- C 6 月龄以上 ✓
- D 12 月龄以上

28、下列不属于水溶性维生素的是 ( ) [单选题] \*

A 维生素 B1

B 维生素 B2

C 维生素 EV

D 维生素 C

29、与头孢曲松钠注射液混合可产生肉眼难以观测到的白色细微沉淀的注射液是 ( ) [单选题] \*

A 乳酸钠林格注射液 ✓

B 氯化钠注射液

C 葡萄糖注射液

D 氯化钠葡萄糖注射液

30、下列关于钠的作用特点描述, 错误的是 ( ) [单选题] \*

A 调节体液渗透压、电解质及酸碱平衡

B 维持血压

C 调节体内水量的恒定

D 不能调节体内水量的恒定 ✓

31、以下药物溶媒选择不合理的是 ( ) [单选题] \*

A 5%葡萄糖注射液 500ml+10%氯化钾注射液 15ml

B 0.9%氯化钠注射液 250ml+注射用万古霉素 1.0g

C 5%葡萄糖注射液 250ml+脱氧核甘酸钠注射液 150mg

D 0.9%氯化钠注射液 250ml+利巴韦林注射液 0.5g ✓

32、哪一项不是冠心病的危险因素 ( ) [单选题] \*

A 糖尿病

B 低盐低脂饮食 ✓

C 肥胖和超重

D 高血压

33、不属于改善缺血的用药的是 ( ) [单选题] \*

A 曲美他嗪

B 美托洛尔

C 单硝酸异山梨酯缓释片

D 培珠普利 ✓

34、不是  $\beta$  受体阻滞剂常见不良反应的是 ( ) [单选题] \*

A 牙龈增生 ✓

B 支气管痉挛

C 肢端循环障碍

D 严重心动过缓及房室传导阻滞

35、关于硝酸酯类药物说法错误的是 ( ) [单选题] \*

A 硝酸甘油口服生物利用度高，适合口服 ✓

B 单硝酸异山梨酯的最佳给药途径为口服

C 硝酸异山梨酯和 5 单硝酸异山梨酯主要用于预防缺血发生；

D 硝酸酯类药物连续应用 24h 后可发生耐药，长期使用必须使用偏心给药

36、长期使用糖皮质激素可引起"三高 T 氏"，下列选项中不属于"三高"的为 ( ) [单选题] \*

A 高血脂

B 高血糖

C 高血压

D 高尿酸 ✓

37、糖皮质激素的冲击治疗疗程为 ( ) [单选题] \*

A 疗程一般小于 5 天 ✓

B 疗程小于 1 个月

C 疗程 3 个月以内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/515141023041011102>