

2023 年主治医师之消化内科主治 306 自测提分题库 加精品答案

单选题（共 60 题）

1、女性，48 岁。1 年来反复于进食后上腹部不适，无明显腹痛，无厌油。查体：消瘦，贫血貌，舌炎。化验：HP（+）。

- A. 慢性胃炎
- B. 慢性浅表性胃炎
- C. 慢性萎缩性胃窦炎
- D. 慢性萎缩性胃体炎
- E. 急性胃炎

【答案】 D

2、女性，24 岁，低热、腹胀 2 个月余，伴体重减轻 6kg。查体：一般情况差，腹膨隆，移动性浊音(+)。

- A. 布-加综合征
- B. 肝硬化合并感染
- C. 慢性肾炎
- D. 结核性腹膜炎
- E. 卵巢肿瘤

【答案】 D

3、幽门螺杆菌侵入性检查的首选方法是

- A. 快速尿素酶试验
- B. 组织学检查

- C. 幽门螺杆菌培养
- D. ¹⁴C_尿素呼气试验
- E. 血清学检查

【答案】 A

4、男性，30岁，患十二指肠溃疡4年，突发上腹剧痛5小时，继而全腹痛、大汗。查体：全腹压痛、反跳痛。考虑有溃疡病穿孔的可能。

- A. 前壁
- B. 上壁
- C. 后壁
- D. 下壁
- E. 球后

【答案】 A

5、患者女，6岁。体检时发现胸骨左缘第二肋间3/6级连续机械样杂音，平时一般体力活动无不适。

- A. 右向左分流
- B. 合并感染
- C. 合并心律失常
- D. 心力衰竭
- E. 左向右分流

【答案】 B

6、患者女性，35岁患类风湿关节炎，长期服用泼尼松（强的松）。10小时前突发腹痛，呕吐3次。中上腹部压痛，血淀粉酶1000单位（苏氏法）

- A. 酒精性
- B. 胆源性
- C. 先天性
- D. 药物性
- E. 特发性

【答案】 D

7、诊断痛风，主要根据的生化指标是()

- A. 类风湿因子阳性
- B. 肾功能不良
- C. 血尿酸高
- D. 血脂高
- E. 血沉快

【答案】 C

8、女性，着凉后出现尿频、尿急、尿痛、发热，该患者查体可能出现的体征有

- A. 右上腹压痛
- B. 下腹压痛
- C. 上腹正中压痛
- D. 左上腹压痛
- E. 脐周压痛

【答案】 B

9、左心衰竭患者咳痰最可能是

- A. 铁锈色痰
- B. 粉红色泡沫样痰
- C. 脓痰
- D. 黄绿色痰
- E. 干咳无痰

【答案】 B

10、血气 PaCO

- A. 弥散功能障碍
- B. 肺泡通气/血流比例失衡
- C. 动静脉分流
- D. 肺泡通气量下降
- E. 氧耗量增加

【答案】 D

11、男性，51岁。乙肝病史19年，大量饮酒史30年，1年来出现乏力，腹胀，尿量减少，偶有牙出血和鼻出血。1天前，劳累后突然出现恶心，呕新鲜血含有血块，共约1000ml。查体：BP85/40mmHg，P130次/分，神志淡漠。

- A. 特利加压素+输注白蛋白
- B. 奥曲肽与米多君合用+输注白蛋白
- C. TIPS
- D. 自身腹水浓缩回输
- E. 肝移植

【答案】 D

12、女性，45岁。确诊为继发型肺结核，最重要的治疗是

- A. 加强营养
- B. 卧床休息
- C. 合理化疗
- D. 肝脏保护
- E. 预防咯血

【答案】 C

13、风湿病是()

- A. 乙型溶血性链球菌感染有关
- B. 对青霉素过敏所致
- C. 乙型溶血性链球菌直接感染
- D. 流感病毒直接感染
- E. 流感病毒感染有关

【答案】 A

14、女性，61岁。心尖区听到舒张期隆隆样杂音，应考虑为

- A. 功能性杂音
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肺动脉瓣狭窄

【答案】 B

15、男，40岁，上腹不适伴反酸、烧心、腹胀，行上消化道造影检查未见异常，诊断可除外

- A. 反流性食管炎
- B. 食管癌
- C. 胃食管反流病
- D. 慢性胃炎
- E. 萎缩性胃炎

【答案】 B

16、下列最支持温抗体型自身免疫性溶血性贫血的是

- A. 血清胆红素升高
- B. 网织红细胞升高
- C. 尿胆原升高
- D. 抗人球蛋白试验阳性
- E. 尿含铁血黄素试验阳性

【答案】 D

17、胃酸分泌增多较明显的疾病是

- A. 慢性浅表性胃炎
- B. 慢性萎缩性胃炎
- C. 十二指肠溃疡
- D. 反流性食管炎
- E. 胃溃疡

【答案】 C

18、餐后十二指肠液中胰蛋白酶浓度低于正常的是

- A. 十二指肠球溃疡
- B. 肠易激综合征
- C. 慢性胰腺炎
- D. 慢性胆囊炎
- E. 胃溃疡

【答案】 C

19、结核杆菌侵入肠道的主要途径是()

- A. 与开放性肺结核病人密切接触
- B. 饮用污染了牛型结核杆菌的牛奶
- C. 腹腔内结核病灶直接蔓延
- D. 开放性肺结核患者，经常吞下含结核杆菌的痰液
- E. 慢性血行感染

【答案】 D

20、慢性肝炎的纤维化程度 1 期

- A. 无纤维化
- B. 汇管区扩大，纤维化
- C. 汇管区周围纤维化或纤维隔形成，小叶结构保留
- D. 纤维隔伴小叶结构紊乱，无肝硬化
- E. 肝硬化

【答案】 B

21、细菌性肺炎的病原诊断

- A. 痰抗酸染色
- B. 痰菌培养
- C. 痰革兰染色
- D. 痰真菌培养
- E. 痰找阿米巴滋养体下列情况应进行何种检查

【答案】 B

22、下列关于尿糖的说明中，哪一项是正确的

- A. 尿糖阳性肯定有血糖升高
- B. 尿糖阳性是肾小管吸收功能不良的结果
- C. 尿糖阳性肯定有糖代谢异常
- D. 尿糖阳性可诊断糖尿病
- E. Benedict (班氏) 试剂只查尿中是否有葡萄糖

【答案】 B

23、急性心肌梗死时出现高危性室性期前收缩，治疗首选

- A. 利多卡因
- B. 美西律(慢心律)
- C. 胺碘酮(乙胺碘呋酮)
- D. 丙吡胺(双异丙吡胺)
- E. 普鲁卡因胺(普鲁卡因酰胺)

【答案】 A

24、青年男性，28岁，高热5天，后出现咳嗽，伴左侧胸痛，并咳铁锈色痰

- A. 口唇发绀
- B. 心脏杂音
- C. 左胸叩浊音
- D. 颈部淋巴结肿大
- E. 两侧肺底湿啰音

【答案】 C

25、男性，45岁，乙型肝炎后肝硬化病史5年，患者间断出现双下肢水肿。近两年来反复出现腹水，治疗效果差。近日因黄疸加重、合并自发性腹膜炎入院。入院后查患者有高血钠。

- A. 夜尿增多
- B. 尿钠
- C. 尿常规检查发现大量红细胞
- D. 尿钠 $>10\text{mmol/L}$
- E. 患者腹水量增大，双下肢水肿加重

【答案】 B

26、乳头血性分泌物最常见于

- A. 乳腺导管内良性乳突状瘤
- B. 乳腺小叶增生
- C. 急性乳腺炎
- D. 乳腺癌
- E. 乳腺纤维瘤

【答案】 A

27、下列肝脏的病理改变中，最能反映肝硬化特征的是

- A. 肝脏缩小，质地变硬
- B. 肝脏弥漫纤维化
- C. 假小叶和再生结节形成
- D. 肝细胞坏死
- E. 汇管区炎细胞浸润

【答案】 C

28、男，28岁，间断咳血3年，本次因抬重物后突然出现咯血200ml。查体双下肺湿啰音，胸片检查双下肺纹理增多、粗乱，提示最可能的病因是

- A. 肺结核
- B. 支气管扩张
- C. 肺脓肿
- D. 慢性支气管炎
- E. 肺癌

【答案】 B

29、男性，60岁。有萎缩性胃炎。组织学检查有不典型增生，最好采取的措施是()

- A. 用药物治疗
- B. 对症治疗及定期随访观察
- C. 消除病因
- D. 应用抑酸药

E. 手术治疗

【答案】 B

30、下列哪种感染性疾病不能引起急性胰腺炎

- A. 幽门螺杆菌感染
- B. 传染性单核细胞增多症
- C. 急性流行性腮腺炎
- D. 柯萨奇病毒感染
- E. Echo 病毒

【答案】 A

31、结节性多动脉炎()

- A. 高血压、低血钾、腹部可闻及血管杂音
- B. 高血压、高肾素、高醛固酮，低血钾
- C. 高血压、低肾素、低醛固酮、低血钾
- D. 醛固酮增高，肾素、血管紧张素 II 降低
- E. 醛固酮、肾素、血管紧张素 II 均升高

【答案】 B

32、细菌性肺炎的病原诊断

- A. 痰抗酸染色
- B. 痰菌培养
- C. 痰革兰染色
- D. 痰真菌培养

E. 痰找阿米巴滋养体下列情况应进行何种检查

【答案】 B

33、全身性水肿伴重度蛋白尿见于

- A. 特发性水肿
- B. 心源性水肿
- C. 肾源性水肿
- D. 药物性水肿
- E. 丝虫病

【答案】 C

34、男性，42岁，近五月来常感脐周围或右下腹痛，伴间歇性腹泻，粪便呈糊状无脓血便，查体右下腹有压痛，且隐约可扪及边缘欠清的肿块，结核菌素试验阴性。

- A. 下腹或脐周
- B. 右下腹或脐周
- C. 右上腹或脐周
- D. 左下腹
- E. 左上腹

【答案】 B

35、女，20岁，发热20天，体温最高39.3℃，上腹痛，间断腹泻，大便黄稀，四肢关节疼痛、红肿，局部皮下有硬结，尿常规发现红细胞(+)，白细胞(+)，尿蛋白(++)

- A. 肥达-外斐试验

- B. 尿培养
- C. 痰培养
- D. 自身抗体
- E. 肠镜

【答案】 D

36、嗜铬细胞瘤可产生多种肽类激素，其中引起面部潮红的为

- A. P 物质
- B. 阿片肽
- C. 生长抑素
- D. 血清素
- E. 神经肽 Y

【答案】 A

37、患者，男，54岁。餐后2小时突发呕血1000ml，暗红色，排黑便500ml。既往有饮酒史12年。查体：腹部无压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音可疑。化验：幽门螺杆菌抗体阳性，血白蛋白23g/L。最可能的出血原因是

- A. 急性胃粘膜病变
- B. 胃癌
- C. 消化性溃疡
- D. 食管胃底静脉曲张破裂
- E. Mallory-Weiss 综合征

【答案】 D

38、男性，45岁，搬重物后呕吐鲜血300ml，3h后大便暗红色入急诊。体检：血压12/8kPa(90/60mmHg)，心率：108次/min，腹软，无压痛及包块，肝肋下未扪及，脾肋下3cm。最可能的诊断是

- A. 消化性溃疡合并出血
- B. 食管或胃底静脉曲张破裂出血
- C. 急性胃粘膜病变
- D. 食管贲门粘膜撕裂症
- E. 胃癌合并出血

【答案】 B

39、下列与胃癌最密切的疾病是

- A. 肥厚性高分泌性胃炎
- B. 胃憩室
- C. 萎缩性胃炎
- D. 复合性溃疡
- E. 慢性浅表性胃炎

【答案】 C

40、对于结核菌感染腹腔的主要途径下列说法正确的是

- A. 腹腔内的结核病灶直接蔓延
- B. 肺结核血行播散
- C. 肠结核蔓延至腹膜
- D. 腹腔内干酪坏死病灶破溃
- E. 肝结核蔓延至腹膜

【答案】 A

41、肺心病右心功能失代偿的表现不包括

- A. 上腹胀痛
- B. 颈静脉怒张
- C. 下肢水肿
- D. 双下肺湿性啰音
- E. 肝大

【答案】 D

42、判断成人发育正常的指标，不正确的是

- A. 前臂曲侧或上臂背侧下 1 / 3 处脂肪分布差异最小
- B. 头长为身高的 1 / 5~1 / 6
- C. 两上肢展开的长度约等于身高
- D. 坐高等于下肢的长度
- E. 胸围等于身高的一半

【答案】 B

43、患者，男，25岁。因急性胰腺炎住院1周，出院3周后仍有持续性上腹痛和背痛，无发热。查体：中上腹可触及一界限不清的包块，无压痛。血 WBC 8.2×10^9

- A. 胰腺脓肿
- B. 胰腺癌
- C. 慢性胰腺炎
- D. 胰腺假性囊肿
- E. 急性胰腺炎复发

【答案】 D

44、胸痛位于胸骨后，呈烧灼样，进餐后加重，可能为

- A. 十二指肠溃疡
- B. 肺炎
- C. 反流性食管炎
- D. 心绞痛
- E. 胃炎

【答案】 C

45、对于肥厚梗阻型心肌病患者，下列哪项措施会使心脏杂音减弱

- A. 下蹲后站立
- B. 含服硝酸甘油
- C. 深吸气
- D. Valsalva 动作
- E. 运动

【答案】 C

46、治疗轻中度溃疡性结肠炎的主要口服药物有

- A. SASP
- B. 环磷酰胺
- C. 泼尼松
- D. 甲硝唑
- E. 抗生素

【答案】 A

47、食管癌的最常见的好发部位是

- A. 颈段
- B. 上段
- C. 中段
- D. 下段
- E. 贲门

【答案】 C

48、男性，50岁。诊断肝硬化2年，1年前行食管钡餐检查，发现食管下段虫蚀样充盈缺损。2d前曾有黑便，继之出现嗜睡，晚间烦躁不安即来急诊。体检：双手有扑翼样震颤。

- A. 预后很难判断
- B. 预后较好
- C. 预后极差
- D. 预后良好
- E. 预后较差

【答案】 B

49、下列选项中治疗中重度支气管哮喘最主要的药物是

- A. 茶碱类
- B. 色甘酸二钠
- C. 抗胆碱能类
- D. 糖皮质激素

E. 钙离子拮抗药

【答案】 D

50、男性，44岁。因高处坠落多发性骨折并发急性呼吸窘迫综合征(ARDS)，骨折已处理，正接受人工呼吸道和呼气末正压机械通气治疗

A. 严格无菌操作、器械的消毒灭菌

B. 隔离

C. 空气消毒

D. 地板、墙壁消毒

E. 吸痰

【答案】 A

51、女，24岁，幼年有支气管哮喘病。反复出现发作性气喘、咳嗽2年，每月发作2~4次，吸入煤烟或香烟烟雾后出现喘息，咳少量白色黏痰，口服抗生素及氨茶碱后缓解，无发作时如常人，曾胸片检查无异常，本次就诊查体双肺呼吸音清晰，无干湿鸣

A. 慢性支气管炎

B. 支气管肺癌

C. 支气管内膜结核

D. 支气管哮喘

E. 支气管扩张

【答案】 D

52、患者，男，28岁。间断腹痛、腹泻、脓血便3年，加重2周，4~6次/日，不伴发热。结肠镜检查示：直肠、乙状结肠粘膜弥漫充血、水肿，有多发、表浅溃疡，附有脓血性分泌物。最可能的诊断是

- A. 克罗恩病
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 伪膜性肠炎
- D. 出血坏死性肠炎
- E. 缺血性结肠炎

【答案】 B

53、男性，35岁。有吸毒史8年，近2月余发现颈部、腹股沟多个肿物，无发热。近年渐出现消瘦，体重下降明显。查体：T37.2℃，R30次/分，BP100/65mmHg，无皮疹，皮肤无黄染，颈部、腋下、腹股沟可扪及多个1cm×1cm至1cm×1.5cm淋巴结肿大，血常规：WBC $5 \times 10^9/L$ ，N70%，L30%，CD4值低，CD4/CD8比例倒置，首先需考虑哪种疾病的可能

- A. 艾滋病
- B. 淋巴结炎
- C. 传染性单核细胞增多症
- D. 淋巴结结核
- E. 以上疾病均有可能

【答案】 A

54、男性，50岁。诊断肝硬化2年，1年前行食管钡餐检查，发现食管下段虫蚀样充盈缺损。2d前曾有黑便，继之出现嗜睡，晚间烦躁不安即来急诊。体检：双手有扑翼样震颤。

- A. 磺胺嘧啶
- B. 青霉素
- C. 甲硝唑
- D. 黄连素

E. 氯霉素

【答案】 C

55、肝性昏迷时有肾损害者，口服抗生素可选择

A. 新霉素

B. 卡那霉素

C. 氨苄西林

D. 甲硝唑

E. 庆大霉素

【答案】 D

56、MFX 化疗后解救的药物是()

A. 生物素

B. 维生素 B

C. 叶酸

D. 甲酰四氢叶酸钙

E. 铁剂

【答案】 D

57、下列哪项检查对诊断小肝癌最有意义()

A. 放射性核素

B. B 超

C. 腹腔镜

D. 肝动脉造影(CTA)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/516001243054010103>