

2023 年湖南省普通高校专科升本科大学医学综合预测试卷

一、单选题

1、胆囊窝位于肝下面“H”形沟的部位是（）

(A)右纵沟后部

(B)右纵沟前部

(C)左纵沟前部

(D)左纵沟后部

(E)横沟

2、动作电位到达神经末梢，引起的与末梢膜释放递质有关的离子流是【】

(A) K^+ 内流

(B) Cl^- 内流

(C) Na^+ 内流

(D) Ca^{2+} 内流

(E) Mg^{2+} 外流

3、防止子宫脱垂的主要结构是()

(A)子宫圆韧带

(B)子宫主韧带

(C)子宫阔韧带

(D)子宫骶韧带

4、自主神经节前纤维释放的递质是（）

(A)多巴胺

(B)腺苷

(C)谷氨酸

(D)甘氨酸

(E)乙酰胆碱

5、破伤风的治疗原则是（）

(A)预防和抢救休克

(B)早期行气管切开

(C)应用破伤风类毒素

(D)消除毒素来源、中和毒素、控制和解除痉挛

(E)高压氧治疗

6、女，32岁。查体：心界叩诊不大，心率72次/分，律齐，S1增强，可闻及开瓣音，心尖部闻及舒张期隆隆样杂音。最可能的诊断是()

(A)主动脉瓣狭窄

(B)房间隔缺损

(C)室间隔缺损

(D)二尖瓣狭窄

7、正确应用抗菌药物的选项是【】

(A) 抗菌药物的剂量一般按年龄计算

(B) 应用抗菌药物后可以减免外科处理

(C) 所有的外科感染均需应用抗菌药物

(D) 手术预防性用药应在术前1小时静脉滴入

(E) 外科感染时首选广谱抗菌药物并联合用药

8、毁损视上核，尿液监测指标的变化是【】

(A) 低渗、量增加

(B) 高渗、量不变

- (C) 等渗、量减少
- (D) 尿颜色加深、pH 值升高
- (E) 尿蛋白和糖均阳性

9、下列与心指数直接相关的参数是【】

- (A) 体重
- (B) 年龄
- (C) 体表面积
- (D) 身高
- (E) 能量

10、不属于中耳的结构是（）

- (A) 前庭
- (B) 乳突小房
- (C) 鼓室
- (D) 乳突窦
- (E) 咽鼓管

11、男性患者有尿道外括约肌环绕尿道的部位是（）

- (A) 尿道内口
- (B) 尿道外口
- (C) 尿道前列腺部
- (D) 尿道球部
- (E) 尿道膜部

12、横断脑干网状结构使易化区活动占优势，其结果是（）

- (A) 嗜睡

(B)昏迷

(C)去大脑僵直

(D)柔软性麻痹

(E)意向性震颤

13、引起肝颈静脉回流征阳性的常见病症是（）

(A)右心衰竭

(B)下腔静脉阻塞

(C)门脉高压症

(D)左侧胸腔积液

(E)肝功能衰竭

14、横断脑干网状结构使易化区活动占优势，其结果是（）

(A)嗜睡

(B)昏迷

(C)去大脑僵直

(D)柔软性麻痹

(E)意向性震颤

15、某心悸患者查体所见：脉率 89 次/分，心率 113 次/分，心律绝对不齐。最可能的诊断是（）

(A)房性期前收缩

(B)室上性心动过速

(C)心房颤动

(D)心室颤动

(E)室性期前收缩

16、胆汁淤积性黄疸典型的临床表现是()

(A)尿呈酱油色

(B)腰背疼痛

(C)贫血、脾大

(D)陶土样粪便

17、甲状腺癌患者检查最常见的是 ()

(A)甲状腺肿大可触及震颤

(B)甲状腺多发结节伴触痛

(C)甲状腺包块伴波动感

(D)甲状腺包块不规则、质硬

(E)甲状腺肿大并可触及颈动脉搏动

18、下列监测值中不正确的是 ()

(A)CVP 的正常值为 5~12cmH₂O

(B)心排血量的正常值为 4~6L/min

(C)PCWP 的正常值为 6~15cmH₂O

(D)动脉血乳酸盐的正常值为 1~15mmol/L

(E)血 pH 的正常范围为 7.35~7.45

19、胸膜下界的体表投影在腋中线相交于()

(A)第 8 肋

(B)第 9 肋

(C)第 10 肋

(D)第 11 肋

20、男，31岁。既往无心脏病史，上班途中突发心悸、胸闷。心电图示QRS波形态与时限均正常，P波为逆行性，频率220次/分。该患者的诊断为（）

- (A)室上性心动过速
- (B)窦性心动过速
- (C)快速心房颤动
- (D)室性心动过速
- (E)快速心房扑动

21、运动时产热量最大的器官是（）

- (A)皮肤
- (B)骨骼肌
- (C)心脏
- (D)肝脏
- (E)大脑

22、下列属于腺垂体激素的是【】

- (A)生长激素
- (B)甲状腺素
- (C)缩宫素
- (D)血管升压素
- (E)生长抑素

23、大量胸腔积液患者不易出现的体征是（）

- (A)患侧闻及胸膜摩擦音
- (B)气管向健侧移位
- (C)患侧语音震颤减弱

(D)患侧胸廓扩张度减弱

(E)患侧肋间隙增宽

24、一侧视交叉外侧部的不交叉纤维损伤时，引起的视野缺损是（）

(A)双眼视野鼻侧半偏盲

(B)患侧视野鼻侧半偏盲

(C)双眼视野对侧半同向性偏盲

(D)双眼视野颞侧半偏盲

(E)患侧眼全盲

25、能够听到支气管肺泡呼吸音的部位有（）

(A)肩胛下区

(B)胸骨左侧第2肋间

(C)背部第2胸椎附近

(D)肩胛间区第3胸椎水平

(E)肺尖前后部

26、下列属于胸主动脉分支的是【】

(A)头臂干

(B)肺动脉

(C)冠状动脉

(D)肋间后动脉

(E)椎动脉

27、下列不属于急性上消化道出血临床表现的是（）

(A)上腹部压痛阳性

(B)柏油便

- (C) 呕吐咖啡样物质
- (D) 听诊肠鸣音活跃
- (E) 可出现头晕、心悸

28、两侧同时收缩，使脊柱后伸的肌是（）

- (A) 背阔肌
- (B) 竖脊肌
- (C) 胸大肌
- (D) 斜方肌
- (E) 腹直肌

29、男，2岁。玩耍中突发呼气性呼吸困难半小时急诊就诊。最可能出现的肺部体征是

【】

- (A) 肺部局限性干啰音
- (B) 双肺布满哨笛音
- (C) 双肺粗大湿啰音
- (D) 胸膜摩擦音
- (E) 双肺底捻发音

30、男，31岁。既往无心脏病史，上班途中突发心悸、胸闷。心电图示 QRS 波形态与时限均正常，P 波为逆行性，频率 220 次/分。该患者的诊断为（）

- (A) 室上性心动过速
- (B) 窦性心动过速
- (C) 快速心房颤动
- (D) 室性心动过速
- (E) 快速心房扑动

31、有关测量血压的叙述，正确的选项是【】

- (A) 听诊器胸件置于袖袋下
- (B) 血压计置于肘关节水平
- (C) 袖袋充气至日常血压水平放气
- (D) 取两次测得血压的高值
- (E) 检查前需休息 5 分钟以上

32、与阴道后穹后方相邻的腹膜间隙是（）

- (A) 卵巢窝
- (B) 膀胱上窝
- (C) 膀胱子宫陷凹
- (D) 直肠膀胱陷凹
- (E) 直肠子宫陷凹

33、运动时产热量最大的器官是（）

- (A) 皮肤
- (B) 骨骼肌
- (C) 心脏
- (D) 肝脏
- (E) 大脑

34、支配小腿后群肌的神经是【】

- (A) 胫神经
- (B) 股神经
- (C) 腓浅神经

(D) 闭孔神经

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/517006065150006055>