

## 口腔医学专业知识试题及答案

一、A1/A2 型题(以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

1. 拔牙后出血是指拔牙后多长时间仍明显出血

- A. 30 分钟
- B. 45 分钟
- C. 60 分钟
- D. 90 分钟
- E. 120 分钟

2. 不符合干槽症表现的是

- A. 以疼痛为主要症状
- B. 疼痛为阵发性
- C. 拔牙窝常有腐败坏死物
- D. 拔牙窝内有明显腐臭味
- E. 骨壁常有明显触痛

3. 牙及牙槽外科手术时,将局麻药液注射到牙根尖部位骨膜外面的是

- A. 骨膜下浸润
- B. 黏膜下浸润
- C. 骨膜上浸润
- D. 表面麻醉
- E. 阻滞麻醉

4. 男,50 岁。行 26 断根拔除术,术中断根突然消失,此时首先应做的是

- A. 冲水吸根
- B. 开窗取根
- C. 拍 X 线片
- D. 服抗生素
- E. 扩大牙槽窝掏根

5. 病人要求拔除 36 残冠,术者采用钳拔法致其牙根折断,改用牙挺拔除,牙根再断。分析致其牙根折断最有可能的原因为

- A. 钳喙安放不正确
  - B. 牙冠破坏较大
  - C. 牙根脆性增加或牙根周围骨质致密或与牙根固连
  - D. 牙挺使用不正确
  - E. 牙周病
6. 病人被诊断为Ⅱ类、低位、近中倾斜颊向位阻生下颌第三磨牙。术中予以切开、翻瓣、颊侧去骨、劈开、挺出等方法将其成功拔除。术后病人出现患侧舌体麻木感，最有可能的原因是
- A. 局麻时损伤了下牙槽神经
  - B. 切开翻瓣时损伤了舌神经
  - C. 劈开时损伤了舌神经
  - D. 劈开时损伤了下牙槽神经
  - E. 挺出时损伤了舌下神经
7. 男，20 岁。右下颌中位水平阻生第三磨牙拔除术后 4 小时，伤口仍出血，否认全身疾病史，分析出血原因，不包括
- A. 未完全缝合软组织切口
  - B. 损伤下牙槽动脉
  - C. 牙槽骨内小血管破裂
  - D. 拔牙创感染后出血
  - E. 病人未遵医嘱
8. 男，25 岁。下颌全景片示 48 低位阻生，检查见牙冠大部分被骨及组织覆盖，做口内切口时，附加
- A. 颊侧切口
  - B. 远中切口
  - C. 舌侧切口
  - D. 近中颊侧切口
  - E. 颊侧及远中切口
9. 女，23 岁。左下颌智齿拔除后 3 小时，仍出血不止，否认既往全身疾病史。可能的出血原因不包括

- A. 牙龈撕裂
- B. 牙槽骨骨折
- C. 拔牙创感染后出血
- D. 损伤下牙槽血管
- E. 病人自行漱口，血块脱落

10. 女，30 岁。右下智齿舌向远中倾斜，牙冠完全萌出，此牙的拔除方法宜采用

- A. 冲击法拔除
- B. 劈开，分根拔除
- C. 用涡轮钻拔除
- D. 用牙挺向远中挺出
- E. 翻瓣、去骨拔除

11. 女，25 岁，初孕，妊娠第 8 周牙痛。检查：46 牙体破坏大。需拔除，消炎后拔除的时间应为

- A. 1 周内
- B. 1 周后
- C. 2 周后
- D. 3 周后
- E. 4 周后

12. 女，28 岁。拔除颊侧倾斜 8 后搔刮拔牙窝时发现拔牙窝底部空虚，捏鼻鼓气时有气体自拔牙窝溢处，此时最佳处理方法是

- A. 填塞明胶海绵
- B. 行上颌窦根治
- C. 冲洗拔牙创
- D. 行局部瘘口修复术
- E. 使拔牙创充满血块

13. 下列对全冠龈边缘位置设计无影响的是

- A. 固位力大小
- B. 美观因素
- C. 牙龈的保护

- D. 边缘密合
  - E. 牙体预备操作的难易
14. 牙体缺损修复时，牙体预备的要求不正确的是
- A. 去除病变组织
  - B. 开辟修复体所占空间
  - C. 提供良好的固位形和抗力形
  - D. 无需做预防性扩展
  - E. 磨改过长牙或错位患牙
15. 嵌体洞壁必须有牙本质支持，其目的是
- A. 增加固位力
  - B. 防龋
  - C. 增加摩擦力
  - D. 增加抗力
  - E. 增加覆盖面积
16. 桩冠修复时，桩的直径应为
- A. 根径的  $1/4$
  - B. 根径的  $1/3$
  - C. 根径的  $1/2$
  - D. 根径的  $2/3$
  - E. 根径的  $3/4$
17. 前身 时上后牙尖的工作斜面是
- A. 上牙颊尖的远中斜面
  - B. 上牙颊尖的舌斜面
  - C. 上牙舌尖的颊斜面
  - D. 上牙颊舌尖的颊斜面
  - E. 上牙颊尖的近中斜面
18. 全冠黏固后出现牙龈炎，其可能原因，除了
- A. 轴壁突度不良
  - B. 冠边缘过长

- C. 冠边缘不密合
  - D. 龈沟内黏固剂残留
  - E. 咬合早接触
19. 修复体未能恢复倾斜牙的正常外形会引发
- A. 修复体脱落
  - B. 基牙松动
  - C. 龈缘炎
  - D. 咬合痛
  - E. 修复体松动
20. 全冠戴用几天后出现咬合痛，处理的方式是
- A. 保守观察
  - B. 进行根管治疗
  - C. 药物治疗
  - D. 拔除患牙
  - E. 调磨早接触和干扰点
21. 修复体黏固后出现牙本质过敏最不可能的原因是
- A. 取印模时刺激
  - B. 粘固剂刺激
  - C. 腐质未去净
  - D. 消毒剂刺激
  - E. 牙体预备时水喷雾不够
22. 在牙体缺损的修复治疗中，关于对牙龈组织的保健，错误的说法是
- A. 修复体要高度磨光
  - B. 人造冠龈边缘与患牙十分密合
  - C. 正确恢复牙冠外形高点
  - D. 修复体龈边缘必须位于牙龈以下
  - E. 修复体轴面形态有助于对龈组织功能性刺激
23. 做嵌体牙体预备时，错误的做法是
- A. 去尽病变腐质

- B. 轴面最大周径线降至龈缘
- C. 提供良好的固位形和抗力形
- D. 适当磨改异常的对颌牙
- E. 预防性扩展

24. 属于双面嵌体的是

- A. 面嵌体
- B. 邻嵌体
- C. 颈部嵌体
- D. 邻舌嵌体
- E. 高嵌体

25. 铸造金属全冠颈部肩台的宽度通常为

- A. 0.3-0.4mm
- B. 0.5-0.8mm
- C. 0.9-1.0mm
- D. 1.1-1.2mm
- E. 1.3-1.5mm

26. 为后牙铸造金属全冠做牙体预备时，错误的做法是

- A. 邻面聚合角以  $2^{\circ}$  - $5^{\circ}$  为宜
- B. 各轴面角的线角磨圆钝
- C. 面磨除量一般为 0.5-1mm
- D. 上颌牙舌尖斜面不必多磨
- E. 颈部预备凹形肩台

27. 金属烤瓷冠的制作，错误的说法是

- A. 全冠舌侧颈缘全用金属
- B. 金瓷结合处应避免咬合功能区
- C. 金瓷结合处呈斜面搭接
- D. 瓷覆盖区底层冠厚度至少 0.5mm
- E. 瓷覆盖区瓷层空间不超过 2mm

28. 金属烤瓷冠的适应症是

- A. 青少年恒牙
- B. 冠部短小的磨牙
- C. 轻度腭向错位的前牙
- D. 重度深覆(牙合)
- E. 乳牙

29. 对烤瓷合金的性能要求, 不正确的是

- A. 弹性模最低
- B. 机械强度高
- C. 铸造性能好
- D. 收缩变形小
- E. 湿润性好

30. 符合桩冠的适应症是

- A. 根管壁侧穿
- B. 已做根管治疗, 瘘管口未闭
- C. 做固定义齿基牙的残冠残根
- D. 前牙斜折达根中 1/3 者
- E. 根管弯曲细小

31. 关于桩核冠桩冠的直径, 正确的是

- A. 根径的 1/2
- B. 根径的 1/3
- C. 上前牙为 2.5-2.8mm
- D. 下前牙为 0.8-1mm
- E. 后牙为 1.1-1.5mm

32. 造成铸造全冠就为困难的原因不包括

- A. 石膏代型磨损
- B. 蜡型蠕变变形
- C. 间隙涂料涂得过厚
- D. 牙颈部肩台不整齐
- E. 铸造冠缘过长

33. 沟纹舌的治疗应采用

- A. 清除牙菌斑
- B. 无症状者一般不需治疗
- C. 去除残根残冠
- D. 切除沟纹
- E. 服用抗生素

34. 游走性舌炎病人可能有的症状是

- A. 自发痛
- B. 口干
- C. 冷热痛
- D. 烧灼刺激痛
- E. 阵发性疼痛

35. 口角炎的治疗原则为

- A. 局部激素治疗，全身抗生素治疗
- B. 全身激素治疗，局部抗生素治疗
- C. 局部激素治疗，口服维生素
- D. 全身激素治疗，局部维生素外用
- E. 根据不同的病因选择抗菌、抗真菌或补充营养的治疗

36. 湿疹糜烂型唇炎的表现与单独发生在唇部黏膜斑纹病，难以鉴别的是

- A. 慢性盘状红斑狼疮
- D. 多形性红斑
- C. 念珠菌性唇炎
- D. 糜烂型扁平苔藓
- E. 药物过敏性口炎

37. 慢性唇炎的临床表现为如下，除外

- A. 唇肿胀
- B. 皲裂
- C. 脱屑
- D. 结痂



E. 放射状斑纹

38. 慢性唇炎的病因是

A. 舔唇不良习惯

B. 病灶感染

C. 感冒

D. 消化不良

E. 寄生虫感染

39. 女，43 岁。下唇唇红反复糜烂、出血、结痂 2 年余，日晒后加重。检查下唇唇红有血痂，周围有白色放射状细小条纹，唇红与肤色交界侧有弧线色素沉着围绕。首选诊断为

A. 慢性唇炎

B. 盘状红斑狼疮

C. 固定性药疹

D. 日光性唇炎

E. 腺性唇炎

40. 女，61 岁。舌背后 1/3 处存在散在肿大突起，轮廓清晰，发红。疼痛不明显，病人无意间发现恐慌来诊。应诊断为

A. 叶状乳头炎

B. 菌状乳头炎

C. 轮廓乳头炎

D. 舌癌

E. 丝状乳头炎

41. 女，78 岁。口角糜烂两个月。查：双侧口角区湿白糜烂有皲裂线，全口义齿重度磨耗。此病人应属于

A. 营养不良性口角炎

B. 念珠菌口角炎

C. 接触性口角炎

D. 创伤性口角炎

E. 球菌性口炎

42. 女，30岁。口腔内黏膜破溃、疼痛两天。检查：下唇黏膜糜烂面周围充血，同时口角下部皮肤有一圆形红斑，中心有水疱，边缘充血。病人自述：口角处曾经出现过同样的红斑，两天前因感冒服用退热药后，再次出现。该病应诊断为

A. 药物过敏性口炎

B. 接触性口炎

C. 球菌性口炎

D. 疱疹性口炎

E. 扁平苔藓

43. 女，6岁。舌背部出现不定的圆形线斑。检查：舌背中部偏左有一圆形丝状乳头剥脱区，色红、微凹陷，无疼痛，直径约10mm，边缘发白，微凸出，舌活动正常。全身未见异常。应诊断为

A. 药物过敏性口炎

B. 球菌性口炎

C. 接触性口炎

D. 扁平苔藓

E. 游走性舌炎

44. 引起艾滋病的病毒是

A. 带状疱疹病毒

B. I型单纯疱疹病毒

C. II型单纯疱疹病毒

D. 免疫缺陷病毒

E. 柯萨奇病毒

二. A3型题(以下每一道病例考题不同小题共用同一题干，每个小题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

(45-47 共用题干)

男，35岁。16 牙髓治疗后劈裂，拔牙过程中牙冠碎裂至龈下，牙根与周围骨质粘连。

45. 此时拔除此根应先

- A. 牙挺取根
- B. 牙钳拔除
- C. 分根后拔除
- D. 翻瓣去骨拔除
- E. 涡轮钻拔除

46. 拔牙过程中发现其腭侧根消失，牙槽窝空虚，此时应当

- A. 立即停止操作，拍 X 线片
- B. 立即扩大牙槽窝取根
- C. 立即行上颌窦开窗取根
- D. 翻瓣去骨取根
- E. 延期拔除患牙

47. 如果确定腭根已进入上颌窦，经去除牙槽间隔后扩大牙槽窝将其冲出。此时上颌窦底黏膜破裂口约 7mm，此时应

- A. 立即行上颌窦瘘修补术
- B. 牙槽窝填塞碘仿纱条
- C. 可不予处理
- D. 给予抗生素，延期行上颌窦瘘修补术
- E. 术后牙槽窝内放置碘仿海绵

(48-51 共用题干)

女，50岁，以颊黏膜粗糙感、反复刺激性疼痛就诊。检查：双颊黏膜及下唇红有网状白纹，右颊及唇红损害区有少量充血区。

48. 可作为本病的诊断依据为

- A. 眼结膜充血
- B. 鼻出血史
- C. 皮损有 Wickham 纹

- D. 皮肤靶形红斑
- E. 头皮大疱及大疱形成

49. 如需明确诊断，以下选项最可靠的是

- A. 活检组织做病理检查
- B. 病损组织细胞培养
- C. 脱落细胞涂片检查
- D. 药物诊断性治疗
- E. 病损区甲苯胺蓝染色

50. 该病例最可能的诊断为

- A. 盘状红斑狼疮
- B. 多形红斑
- C. 口腔黏膜扁平苔藓
- D. 白色角化病
- E. 白色水肿

51. 鉴别诊断时最需与该疾病鉴别的是

- A. 盘状红斑狼疮
- B. 多形性红斑
- C. 口腔溃疡
- D. 白色海绵状痣
- E. 白色水肿

(52-54 共用题干)

女，48 岁。有口腔黏膜粗涩感，进刺激食物感疼痛半年。检查发现其舌背左右各一黄豆大小白色病损，浅淡，表面乳头消失，质软。双颊自口角至颊脂垫尖处广泛白色角化网纹，基底充血发红。双舌缘舌腹也可见类似病损。

52. 询问病史及临床检查时应注意以下几点，除了

- A. 皮肤有无损害
- B. 指（趾）甲有无病损
- C. 外生殖器有无病损

- D. 有无肺结核史
- E. 发病前有无精神因素

53. 对该病人的诊断最可能是

- A. 增殖性念珠菌病
- B. 假膜型念珠菌病
- C. 皮脂腺异位
- D. 扁平苔藓
- E. 白斑

54. 最恰当的治疗方案为

- A. 手术切除
- B. 长期抗真菌治疗，定期复查
- C. 不需治疗及随访
- D. 全身长期大剂量激素治疗
- E. 消除可能的诱因，局部激素治疗，定期复查

(55-56 共用题干)

女，42岁。发现舌背红色斑块1年，病损时常改变位置，无自觉症状，偶有刺激痛。

55. 病人的诊断可能是

- A. 口腔白斑
- B. 扁平苔藓
- C. 地图舌
- D. 舌乳头炎
- E. 肉芽肿性舌炎

56. 此病的发生与以下选项相关度最小的是

- A. 胃肠功能紊乱
- B. 贫血
- C. 病灶感染
- D. 情绪

E. 舌黏膜发育不良

(57-59 共用题干)

男，50 岁。口腔内起白斑。检查：口腔内左侧黏膜及上腭灰白色光滑而微隆起的斑块，双侧前臂散在性玫瑰样红色斑疹。低热，头痛。病人自述阴茎部曾有过溃疡，已痊愈。

57. 该病初步印象是

- A. 盘状红斑狼疮
- B. 多形性红斑
- C. 扁平苔藓
- D. 口腔白斑
- E. 梅毒

58. 进一步确诊需检测的项目是

- A. 快速血凝反应 (RPR)
- B. Tzanck 细胞检查
- C. 类风湿因子
- D. 结核菌素试验
- E. HIV 抗体检测

59. 首选的治疗药物是

- A. 制霉菌素
- B. 卡那霉素
- C. 链霉素
- D. 青霉素
- E. 红霉素

(60-62 共用题干)

女，50 岁。牙龈增生影响咀嚼一年。检查见全口牙龈肥大增生，覆盖牙面约 1/2，结节状。探诊时有出血，个别牙龈增生严重处牙齿有移位。

60. 为了有助于诊断，最应注意询问的病史为

- A. 月经状况
- B. 子女情况
- C. 饮食状况
- D. 服药史
- E. 流行病学史

61. 如果该病人进行过肾移植手术，并在一年中一直接受治疗，则最可能的诊断是

- A. 药物性牙龈增生
- B. 牙龈纤维瘤病
- C. 坏死性龈炎
- D. 快速进展性牙周炎
- E. 白血病的牙龈病损

62. 导致该病的主要原因是

- A. 免疫抑制剂环孢素
- B. 遗传因素
- C. 螺旋体
- D. 白细胞大量浸润
- E. 血压过高

(63-64 共用题干)

女，28岁，近4个月来全口牙龈逐渐肿大，刷牙时牙龈易出血，偶有牙龈自动出血史。

63. 若病人妊娠6个月，诊断为妊娠期龈炎，临床上最可能表现为

- A. 牙龈疼痛、恶臭
- B. 牙齿松动
- C. 牙龈为纤维性增大
- D. 牙龈色鲜红、光亮
- E. 牙龈坏死

64. 若病人未妊娠，怀疑为白血病在口腔的表现，确诊的方法为

- A. 活检
- B. 脱落细胞涂片
- C. 白细胞吞噬功能
- D. 白细胞趋化功能
- E. 查血象

**【共用题干】**

患者，男性，28岁，右下第三磨牙反复肿痛1年余。3周前出现右面下部肿胀伴开口困难，经抗感染治疗后肿胀减轻，但局部组织坚硬，张口持续困难。X线片示右下8近中阻生，下颌支弥漫性密度增高，其中可见局限性骨质破坏灶，密质骨外侧有骨质增生。

65. 可能的诊断为

- A. 牙源性中央性颌骨骨髓炎
- B. 牙源性边缘性颌骨骨髓炎
- C. 骨纤维结构不良
- D. 颌骨结核
- E. 成骨肉瘤

66. 患者抗感染治疗如未能取得较好的治疗效果，需行外科手术治疗，手术时机通常选在

- A. 1-2 周后
- B. 2-4 周后
- C. 4-6 周后
- D. 6-8 周后
- E. 8-10 周后

67. 最佳手术治疗方案为

- A. 待死骨形成后，行死骨摘除术
- B. 下颌骨表面感染灶刮除术
- C. 阻生牙拔除术
- D. 死骨摘除术+阻生牙拔除术



E. 颌骨表面感染灶刮除术 + 阻生牙拔除术

(68-70 共用题干)

男，10 岁，患麻疹后 3 天，低热乏力，颌下淋巴结肿大，牙龈疼痛、出血、口腔奇臭，不敢刷牙，检查可见下前牙唇侧牙龈出血，龈缘溃疡。

68. 拟诊

A. 牙周炎

B. 疱疹性龈口炎

C. 雪口病口腔医学模拟卷试题

D. 急性坏死性龈炎

E. 带状疱疹

69. 通常该病的病因是

A. 真菌感染

B. 病毒感染

C. 抵抗力低下 + 细菌感染

D. HSV 感染

E. 确切病因不清，多种因素

70. 最佳治疗方案应选择

A. 全口洁治，口服或肌注青霉素

B. 局部用 1%-2% 过氧化氢溶液含漱，口服维生素 C 和甲硝唑

C. 2%-4%  $\text{NaHCO}_3$  溶液含漱，补充铁剂、维生素 A 并输血

D. 口服激素 + 阿司匹林镇痛

E. 该病有自限性，无须特殊处理，7-10 天可自愈

(43-45 共用题干)

女，14 岁。前牙唇侧龈乳头肿胀呈球状突起，颜色暗红，松软光亮，探诊出血明显，局部刺激物不明显，探诊未及附着丧失。

71. 此病人最可能的诊断为

A. 急性龈乳头炎

- B. 青春期龈炎
- C. 妊娠期龈炎
- D. 药物性牙龈肥大
- E. 侵袭性牙周炎

72. 以下为造成该病人牙龈肿胀的原因，除外

- A. 口呼吸
- B. 激素水平的改变
- C. 吐舌习惯
- D. 前牙排列不齐
- E. 刷牙不认真

73. 此病人下列治疗措施中，不正确的是

- A. 牙周基础治疗
- B. 教会病人正确控制菌斑的方法
- C. 调节激素水平
- D. 改正不良习惯
- E. 炎症消退后牙龈形态仍未恢复正常的病人可行牙龈切除术

(74-75 共用题干)

女，34岁。因嗓子痛自行口服磺胺类药物后，口腔黏膜烧灼疼痛水肿，唇部不仅疼痛起疱、结痂而且出血。检查可见口腔黏膜大面积充血糜烂，可见残余疱壁，唇部有厚血痂，手、足、背及腕部附近皮肤可见数个大小不等的红斑，上有水疱或丘疹。

74. 拟诊断为

- A. 原发性疱疹性口炎
- B. 药物过敏性口炎
- C. 三叉神经带状疱疹
- D. 天疱疮
- E. 血管神经性水肿

75. 下面药物使用错误的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/518020013060006035>