

静脉输液专项考试

单选题

您的姓名： [填空题] *

1.下列穿刺部位，甘露醇宜选择（） [单选题] *

- A.手背
- B.脚背上 1/2
- C.贵要静脉(正确答案)
- D.由于患者血管穿刺困难可选择手背下 1/3 处

2.留置针穿刺时皮肤消毒范围为（） cm [单选题] *

- A.6×7
- B.7×7
- C.8×7
- D.8×8(正确答案)

3.血管外膜由（）组成。 [单选题] *

- A.弹性纤维和肌纤维
- B.弹性纤维和疏松的结缔组织(正确答案)
- C.疏松的结缔组织和肌纤维
- D.疏松的结缔组织和弹性蛋白

4.婴幼儿患者滴速应控制在每分钟（）滴。 [单选题] *

- A.4-6

B.10-15

C.20-30(正确答案)

D.30-40

5.药物渗漏 24 小时后可用 50%硫酸镁湿敷，每次 40 分钟，每天 5-6 次，温度应为
() [单选题] *

A.35-40℃

B.40-45℃

C.40-50℃(正确答案)

D.45-55℃

6.心衰患者滴速应控制在每分钟 () 滴。 [单选题] *

A.10-20

B.15-30(正确答案)

C.20-30

D.20-40

7.早产儿滴速应控制在每分钟 () 滴。 [单选题] *

A.4-6(正确答案)

B.10-15

C.20-30

D.30-40

E.颈外静脉

8.静脉穿刺针穿过中膜层时能看到回血，因此见回血后应压低穿刺角度再进针 ()
后方可送管。 [单选题] *

A.0.1cm

B.0.2cm(正确答案)

C.0.3cm

D.0.4cm

9.在血管生理与静脉输液治疗的关系，说法错误的是：（） [单选题] *

A.药物可通过微循环中物质的转运方式进入组织并进行代谢

B.输液速度与心血管系统的神经、体液调节相关

C.在某些情况下，采用 CVC 或 PICC 是为减少药物对外周静脉的刺激

D.血管中膜的内皮细胞损伤是静脉炎及血栓形成的开始(正确答案)

10.在静脉穿刺时，止血带结扎时间应小于（） [单选题] *

A.1 分钟

B.2 分钟(正确答案)

C.3 分钟

11.关于补钾原则，下列说法正确的是？（） [单选题] *

A.不宜过早: 尿量大于 20ml/h 以上才可以补钾

B.不宜过浓: 500ml 加入 10%氯化钾不能超过 30ml

C.不宜过快: 成人静滴速度<60 滴/分(正确答案)

D.不宜过多:一般禁食者每日需补钾 6g

12.血流量较大，可稀释高渗和刺激性药液，是周围静脉穿刺输液的最佳选择的是

（） [单选题] *

A.指端静脉

B.手背静脉

C.前臂头静脉(正确答案)

D.贵要静脉

13.成人行静脉留置针穿刺输液时应尽量避免使用的静脉是（） [单选题] *

A.手背静脉

B.足背静脉(正确答案)

C.贵要静脉

D.头静脉

14.输液部位疼痛，伴有发红和(或)水肿，有条索状物形成，可触及条索状静脉，此时的静脉炎属于（）级 [单选题] *

A.1级

B.2级

C.3级(正确答案)

D.4级

15.以下对坏死型静脉炎描述正确的是（） [单选题] *

A.沿静脉走行皮肤红肿、疼痛、触痛

B.沿给药静脉局部疼痛、触痛、静脉变硬，触之有条索状痛感

C.沿血管周围有较大范围肿胀，形成瘀斑至皮肤层(正确答案)

D.静脉不通，逐步形成机化

16.下列化疗药物外渗后禁止冰敷的是（） [单选题] *

A.紫杉醇

B.奥沙利铂(正确答案)

C.吉西他滨

D.伊立替康

17.药物外渗后冷热敷的时间是（） [单选题] *

A.8-12小时

B.12-24 小时

C.24-48 小时(正确答案)

D.48-72 小时

18.给与不相溶的药物和液体前后, 使用 s 或肝素盐水进行冲管、封管, 24 小时容量不超过 () [单选题] *

A.10ml

B.20ml

C.30ml(正确答案)

D.40ml

19.发生急性肺水肿处理错误的是 () [单选题] *

A.立即停止或减慢输液, 端坐双腿下垂

B.高流量氧气吸入

C.应用利尿、扩血管等药减轻心脏负荷

D.均可以静脉放血 200 -300ml,这是一种有效减少回心血量最直接的方法(正确答案)

E.可轮流结扎四肢

20.抽出的药物、开启的静脉输入的无菌液体超过多长时间不得使用 () [单选题] *

A.1 小时

B.2 小时(正确答案)

C.4 小时

D.24 小时

21.静脉输液时发生空气栓塞, 患者应采取的正确体位是: () [单选题] *

A.端坐位

B.抬高床头左侧卧位

C.头低脚高左侧卧位(正确答案)

D.头低脚高右侧卧位

22.预防空气栓塞的措施不包括 () [单选题] *

A.拔除颈部 CVC、锁骨下深静脉置管后按压至不出即可，不用封闭穿刺点(正确答案)

B.输液前检查输液器密封情况，排尽输液管道内空气

C.输液过程中加强巡视，及时更换液体，输液完毕及时拔针

D.加压输液输血时专人守护

23.静脉输液治疗质量标准内涵的内容不包括 () [单选题] *

A.要素质量

B.过程质量

C.管理质量(正确答案)

D.结果质量

24.接受抗肿瘤药物治疗的患者在治疗后 () 小时内其血液和体液中含有较高浓度的抗肿瘤药物 [单选题] *

A.48 小时(正确答案)

B.76 小时

C.96 小时

C.7 天

25.输液微粒污染对机体的危害不包括: () [单选题] *

A.直接阻塞血管

B.红细胞凝聚在微粒上，形成血栓

C.微粒进入肺毛细血管，可引起巨噬细胞增殖，保卫微粒形成肺内肉芽肿

D.微粒刺激组织产生免疫力(正确答案)

26.发生青霉素过敏性休克时，最早出现的症状是（） [单选题] *

- A.烦躁不安、血压下降
- B.四肢麻木、头晕眼花
- C.腹痛、腹泻
- D.意识丧失、尿便失禁
- E.喉头水肿、呼吸道症状(正确答案)

27.静脉输液过程中，如发现患者局部疼痛、肿胀明显，试抽无回血，可能的原因是（） [单选题] *

- A.静脉痉挛
- B.针刺入过深，穿破对侧血管壁
- C.针头斜面一半在血管外
- D.针头斜面紧贴血管壁
- E.针头刺入皮下(正确答案)

28.静脉注射推药时，不正确的做法是（） [单选题] *

- A.固定针栓
- B.快速推注药液(正确答案)
- C.使患者保持舒适位置
- D.随时观察患者有无不适
- E.再次核对所有药物

29.静脉注射后，下列做法不当的是（） [单选题] *

- A.注射后迅速拔针
- B.注射后再次核对药物
- C.再次询问患者有无不适

D.嘱患者横向按压皮肤进针点(正确答案)

E.嘱患者纵向按压皮肤及血管进针点

30.下列哪项不是输液的目的 () [单选题] *

A.纠正水电解质失调

B.增加血容量

C.输入药物

D.供给各种凝血因子(正确答案)

E.利尿消肿

31.哪项不是静脉输血的目的 () [单选题] *

A.降低颅内压,减轻脑水肿(正确答案)

B.补充白蛋白

C.补充凝血因子

D.增加血红蛋白

E.补充血容量

32.下列可经输血传染的疾病是 () [单选题] *

A.病毒性肝炎(正确答案)

B.肺炎

C.肠炎

D.胃炎

E.阑尾炎

33.静脉输液时茂菲滴管内液面的高度一般为 () [单选题] *

A.1/4~1/5

B.1/2~2/3

C.1/4~1/3、

D.1/3~1/2(正确答案)

E.1/3~2/3

34.需连续输液数天者，其输液瓶和管应（） [单选题] *

A.8h 更换 1 次

B.12h 更换 1 次

C.16h 更换 1 次

D.20h 更换 1 次

F.24h 更换 1 次(正确答案)

35.颈外静脉穿刺的正确操作方法是（） [单选题] *

A.持穿刺针呈 45 度角进针，入皮后呈 25 度角穿刺(正确答案)

B.持穿刺针呈 25 度角进针，入皮后呈 45 度角穿刺

C.持穿刺针呈 60 度角进针，入皮后呈 15 度角穿刺

D.持穿刺针呈 15 度角进针，入皮后呈 60 度角穿刺

E.持穿刺针呈 30 度角进针，入皮后呈 30 度角穿刺

36.小儿头皮静脉输液法，错误的一项是（） [单选题] *

A.需 2 人参与

B.扎止血带，乙醇消毒(正确答案)

C.操作者站患儿头侧

D.右手持针沿静脉向心方向平行刺入

E.滴速每分钟不超过 20 滴

37.输入红霉素等刺激性强的药物时宜(E) [单选题] *

A.一般应慎用此类药物(正确答案)

- B.在输液过程中最先滴入
- C.在输液过程中最后滴入
- D.控制输液速度在每分钟 20 滴以下

38.预防发生空气栓塞的措施不包括 () [单选题] *

- A.输液管空气要排尽
- B.加压输液时护士应在旁守护
- C.溶液滴尽前要及时拔针
- D.控制输液总量(正确答案)
- E.液体输完要及时更换输液瓶

39.下列胶体溶液的性质描述错误的是 () [单选题] *

- A.分子量大
- B.能维持血浆胶体渗透压
- C.在血管内存留时间比较短(正确答案)
- D.增加血容量, 提高血压、
- E.改善微循环

40.输血过程中下列哪项不妥 () [单选题] *

- A.每次携带一张化验单连同贴联号标签的试管前往床边为一位病人采取血标本
- B.输血时须两人核对无误方能输入
- C.发现血浆变红, 血细胞呈暗紫色不能使用
- D.两瓶血之间须输入少量等渗盐水
- E.血中加入异丙嗪 25mg, 可防止过敏反应的发生(正确答案)

41.白血病病人最适宜输 () [单选题] *

- A.白细胞

B.新鲜血(正确答案)

C.库血

D.血浆

E.水解蛋白

42.不需要作交叉鉴定与配血试验的输血方法 () [单选题] *

A.输新鲜血

B.输库存血

C.输成分血

D.自体输血(正确答案)

E.直接输血

43.输血前后和两瓶血之间应输入少量 () [单选题] *

A.0.9%氯化钠溶液(正确答案)

B.4%碳酸氢钠溶液

C.5%葡萄糖氯化钠

D.10%葡萄糖液

F.林格液

G.

44.由于输液速度过快,量过多,患者突然呼吸困难,气促,咳嗽,咳出泡沫血性痰,下列急救措施中何项不妥 () [单选题] *

A.立即停止输液

B.20%~30%乙醇湿化吸氧

C.置左侧卧位和头低足高位(正确答案)

D.D.四肢轮扎

E.遵医嘱给予强心剂和利尿剂

45.输入下列哪种溶液时速度宜快 () [单选题] *

- A.高渗盐水
- B.含钾的药物
- C.升压药
- D.甘露醇(正确答案)
- E.抗生素

46.患者,男,23岁,外伤后 BP80/5mmHg, P120次/min,尿量 15ml/h,诊断为失血性休克,为增加胶体渗透压和微循环血量,输液时可选用的溶液是 () [单选题]

*

- A.林格液
- B.低分子右旋糖酐
- C.5%葡萄糖氯化钠溶液(正确答案)
- D.复方氯化钠溶液一
- E.羟乙基淀粉

47.患者,女,46岁,在输液过程中,突然感到胸部不适,随即发生呼吸困难,严重紫绀。心前区听诊闻及响亮的、持续的“水泡声”。患者可能出现了 () [单选题]

*

- A.发热反应、
- B.左心衰竭
- C.过敏反应
- D.急性肺水肿
- E.空气栓塞(正确答案)

48.患者,男,45岁,需输入 2000ml 液体,须在 10h 内输完,应调节输液速度应为 () A.每分钟 50 滴 B.每分钟 40 滴—C.每分钟 30 滴 D.每分钟 20 滴 E.每分钟 10 滴 30.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/526215214213010044>