

2023 年湖南省专升本考试大学医学综合模拟试卷

一、单选题

1、提高心肌传导性的因素是（）

(A)静息电位减小

(B)钠电流被阻断

(C)钠通道数量减少

(D)动作电位除极化速度增大

(E)阈电位水平抬高

2、运动时产热量最大的器官是（）

(A)皮肤

(B)骨骼肌

(C)心脏

(D)肝脏

(E)大脑

3、两侧同时收缩，使脊柱后伸的肌是（）

(A)背阔肌

(B)竖脊肌

(C)胸大肌

(D)斜方肌

(E)腹直肌

4、自主神经节前纤维释放的递质是（）

(A)多巴胺

(B)腺苷

(C)谷氨酸

(D)甘氨酸

(E)乙酰胆碱

5、休克早期，中心静脉压和血压低的原因是【】

(A) 动静脉短路大量开放

(B) 心力衰竭

(C) 血容量不足

(D) 血容量相对过多

(E) 容量血管过度收缩

6、属于肾锥体的结构是()

(A)肾窦

(B)肾乳头

(C)肾小盏

(D)肾柱

7、卵巢动脉的起始部位是（）

(A)髂内动脉

(B)腹主动脉

(C)髂外动脉

(D)子宫动脉

(E)肾动脉

8、纯净胃液的 pH 为（）

(A)3.9~4.5

(B)4.9~5.5

(C)0.9~1.5

(D)2.9~3.5

(E)1.9~2.5

9、需长期肠外营养支持者，首选的穿刺血管是()

(A)颈外静脉

(B)大隐静脉

(C)颈内静脉

(D)腓静脉

10、关于术后早期活动，不正确的选项为（）

(A)延缓切口愈合

(B)减少下肢静脉血栓形成

(C)减少肺部并发症

(D)改善血液循环

(E)减少腹胀及尿潴留

11、关于外科感染，叙述不正确的是（）

(A)疔是指一个毛囊及其皮脂腺的化脓性感染

(B)急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下蜂窝组织的化脓性感染

(C)脓性指头炎是指手指末节掌面皮下组织的化脓性感染

(D)疔是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓性感染

(E)甲沟炎是指甲沟及其周围组织的急性感染

12、某心悸患者查体所见：脉率 89 次/分，心率 113 次/分，心律绝对不齐。最可能的诊断是（）

(A)房性期前收缩

(B)室上性心动过速

(C)心房颤动

(D)心室颤动

(E)室性期前收缩

13、右锁骨中线与右肋弓交点稍下方的是【】

(A) 胆囊管的体表投影

(B) 胆囊颈的体表投影

(C) 胆囊底的体表投影

(D) 胆囊体的体表投影

(E) 幽门的体表投影

14、小儿头颈部烧伤所占体表面积百分比是【】

(A) 9%

(B) $[9+(12-年龄)]\%$

(C) 12%

(D) $9\% \times 2$

(E) $(9+年龄)\%$

15、汇合形成上腔静脉的是()

(A)颈内静脉与锁骨下静脉

(B)左、右头臂静脉

(C)颈内静脉与奇静脉

(D)颈外静脉与锁骨下静脉

16、能作屈、伸、收、展和旋转运动的关节是【】

(A) 距小腿关节

- (B) 肘关节
- (C) 桡腕关节
- (D) 膝关节
- (E) 肩关节

17、二尖瓣关闭不全典型的体征是 ()

- (A)心尖部闻及收缩期吹风样高调杂音
- (B)胸骨左缘第 2 肋间闻及 GrahamStell 杂音
- (C)心尖部闻及舒张中期杂音
- (D)胸骨左缘第 3 肋间闻及收缩期粗糙杂音
- (E)胸骨左缘第 2 肋间闻及连续性杂音

18、阻塞性通气功能障碍患者肺功能改变的特点是 ()

- (A)一秒率降低
- (B)通气/血流比例失调
- (C)气速指数 >1.0
- (D)残气量减少
- (E)肺活量增加

19、对糖、脂肪和蛋白质均有消化作用的消化液是 ()

- (A)小肠液
- (B)胆汁
- (C)胃液
- (D)唾液
- (E)胰液

20、大脑优势半球的额下回后部代表的中枢是 ()

- (A)书写中枢
- (B)听中枢
- (C)感觉性语言中枢
- (D)视觉性语言中枢
- (E)运动性语言中枢

21、判断心脏按压是否有效的方法是()

- (A)触摸面动脉搏动
- (B)触摸颈动脉搏动
- (C)触摸桡动脉搏动
- (D)触摸足背动脉搏动

22、初期心肺复苏的任务和步骤归纳为“CAB”，其“B”的含义是【】

- (A)保持呼吸道通畅
- (B)有效的人工通气
- (C)建立紧急医疗服务系统
- (D)早期识别
- (E)建立有效的人工循环

23、男，48岁。近期健康体检报告示：血 BUN6.0mmol/L，总胆红素 12.7 μ mol/L，AST71U/L，空腹血糖 6.0mmol/L，总胆固醇 7.5mmol/L。临床的诊断是（）

- (A)肾功能不全伴黄疸
- (B)肝功能异常伴血脂异常
- (C)肝功能衰竭伴黄疸
- (D)糖尿病伴肾功能不全
- (E)糖尿病伴血脂异常

24、形成腹股沟韧带的结构是【】

- (A) 腹内斜肌和腹横肌下缘合成
- (B) 腹内斜肌腱膜
- (C) 腹横肌腱膜
- (D) 腹内斜肌和腹横肌腱膜合成
- (E) 腹外斜肌腱膜

25、胆汁淤积性黄疸典型的临床表现是()

- (A)尿呈酱油色
- (B)腰背疼痛
- (C)贫血、脾大
- (D)陶土样粪便

26、下列监测值中不正确的是（）

- (A)CVP 的正常值为 5~12cmH₂O
- (B)心排血量的正常值为 4~6L/min
- (C)PCWP 的正常值为 6~15cmH₂O
- (D)动脉血乳酸盐的正常值为 1~15mmol/L
- (E)血 pH 的正常范围为 7.35~7.45

27、休克代偿期的临床表现有（）

- (A)皮肤、黏膜明显发绀
- (B)兴奋或烦躁不安
- (C)精神紧张
- (D)心率加快、脉压减小
- (E)尿少甚至无尿

28、成人心肺复苏时，胸外按压与人工呼吸的比例是【】

(A) 30 : 2

(B) 30 : 1

(C) 30 : 3

(D) 30 : 4

(E) 30 : 5

29、交感缩血管神经节后纤维释放的神经递质是（）

(A)5-羟色胺

(B)肾上腺素

(C)P 物质

(D)乙酰胆碱

(E)去甲肾上腺素

30、有关输尿管的正确描述是（）

(A)属于腹膜间位器官

(B)属于腹膜内位器官

(C)开口于膀胱尖

(D)第二狭窄位于跨过髂血管处

(E)可分为腹段和盆段两部分

31、自身调节情况下对刺激产生反应的类型是【】

(A) 应激反应

(B) 旁分泌反应

(C) 自分泌反应

(D) 应急反应

(E) 适应性反应

32、急性肾衰竭少尿期或无尿期，需紧急处理的电解质紊乱是()

(A)高钾血症

(B)高钠血症

(C)低氯血症

(D)低镁血症

33、甲状腺癌患者检查最常见的是（）

(A)甲状腺肿大可触及震颤

(B)甲状腺多发结节伴触痛

(C)甲状腺包块伴波动感

(D)甲状腺包块不规则、质硬

(E)甲状腺肿大并可触及颈动脉搏动

34、肠内营养的制剂成分包括（）

(A)维生素

(B)脂肪

(C)蛋白质

(D)电解质

(E)碳水化合物

35、注入乳糜池的淋巴干是（）

(A)左颈干

(B)右锁骨下干

(C)左锁骨下干

(D)右颈干

(E)肠干

36、引起左锁骨上窝淋巴结肿大的常见病症是（）

(A)牙髓炎

(B)气管炎

(C)结肠癌

(D)食管炎

(E)食管癌

37、前列腺的位置是在【】

(A) 包绕尿道球部

(B) 膀胱底与直肠之间

(C) 尿生殖膈下方

(D) 包绕尿道膜部

(E) 耻骨联合与直肠之间

38、肾窦内含有的结构有（）

(A)肾静脉的属支

(B)肾大盏

(C)肾小盏

(D)肾动脉的分支

(E)肾盂

39、最常见于老年人额头部的灰黑色斑块是（）

(A)乳头状疣

(B)黑色素瘤

(C)老年斑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/536010130220010104>