

疼痛营养自理能力评估试题及答案

一、单选题

1、留置胃管患者其自理能力评分为

- A、0分
- B、5分
- C、10分
- D、15分

【答案】 A

2、留置尿管患者其自理能力评分为

- A、0分
- B、5分
- C、10分
- D、15分

【答案】 A

3、患者能自己穿脱衣物，但需要他人帮助整理衣物、系扣子、拉拉链、系鞋带，其自理能力评分为

- A、0分
- B、5分
- C、10分
- D、15分

【答案】 B

4、患者 NRS 疼痛评分为 3 分，其疼痛程度为

- A、无痛
- B、轻度疼痛
- C、中度疼痛
- D、重度疼痛

【答案】 B

5、患者口服镇痛药物后，护士应在给药后多久进行评估？

- A、5min
- B、15min
- C、30min
- D、1 小时

【答案】 D

6、患者皮下注射镇痛药物后，护士应在给药后多久进行评估？

- A、5min
- B、15min
- C、30min
- D、1 小时

【答案】 C

7、为患者静脉注射镇痛药物后，护士应在给药后多久进行评估？

- A、5min
- B、15min
- C、30min
- D、1 小时

【答案】 B

8、患者 NRS 疼痛评分为 6 分，其疼痛程度为

- A、无痛
- B、轻度疼痛
- C、中度疼痛
- D、重度疼痛

【答案】 C

9、患者 NRS 疼痛评分为 10 分，其疼痛程度为

- A、无痛
- B、轻度疼痛
- C、中度疼痛
- D、重度疼痛

【答案】 D

10、以下叙述正确的是

- A、自理能力中度依赖，其评分为 41-60 分
- B、自理能力中度依赖，其评分为 40-60 分
- C、自理能力中度依赖，其评分为 40-59 分
- D、自理能力中度依赖，其评分为 40-55 分

【答案】 A

11、以下叙述正确的是

- A、自理能力轻度依赖，其评分为 61-99 分
- B、自理能力轻度依赖，其评分为 60-90 分

C、自理能力轻度依赖，其评分为 60-99 分

D、自理能力轻度依赖，其评分为 61-95 分

【答案】 A

12、以下叙述错误的是

A、一个月内体重丢失大于 3 斤或前一周食物摄入约为正常情况的 2/3，其营养状态受损评分为 1 分

B、一个月内体重丢失大于 5 斤或前一周食物摄入约为正常情况的一半，其营养状态受损评分为 2 分

C、一个月内体重丢失大于 10 斤或前一周食物摄入约为正常情况的 1/3，其营养状态受损评分为 3 分

D、一个月内体重丢失大于 3 斤或前一周食物摄入约为正常情况的 2/3，其营养状态受损评分为 3 分

【答案】 D

13、营养风险筛查中，疾病严重程度评分为 1 分的有

A、腹部大手术

B、恶性肿瘤

C、脑卒中

D、重度肺炎

E、血液恶性肿瘤

【答案】 B

14、营养风险筛查中，疾病严重程度评分为 2 分的有

A、口腔疾病伴咀嚼困难

- B、恶性肿瘤
- C、慢性疾病伴急性并发症
- D、骨髓移植
- E、颅脑损伤

【答案】 A

15、营养风险筛查中，疾病严重程度评分为 3 分的有

- A、口腔疾病伴咀嚼困难
- B、重度肺炎
- C、炎症性肠病
- D、血液恶性肿瘤
- E、髌骨骨折

【答案】 C

16、基础疼痛是指：在前（ ）中疼痛时间每天 ≥ 12 小时，或不应用镇痛药物就会出现的疼痛

- A、一周
- B、二周
- C、三周
- D、四周

【答案】 A

17、疼痛控制稳定，应每日至少进行 1 次常规评估，每（ ）周进行一次全面评估

- A、1

B、 2

C、 3

D、 4

【答案】 B

18、 直肠给药栓剂尾端距离肛门口（ ） CM

A、 2-5

B、 3-4

C、 5-6

D、 1-2

【答案】 A

19、 直肠给药宜睡前给药， 用药前指导患者排便， 栓剂缓慢推进， 嘱咐患者保持侧卧位

A、 15 分钟

B、 30 分钟

C、 10 分钟

D、 5 分钟

【答案】 A

20、 芬太尼透皮贴应每（ ） 小时更换一次

A、 24

B、 48

C、 36

D、 72

【答案】D

21、阿片类药物中毒使用（ ）解救

- A、西地兰
- B、速尿
- C、地塞米松
- D、纳洛酮

【答案】D

22、NRS2002 对于营养状况降低评分 1 分轻度描述为

- A、3 个月内体重丢失 5%或食物摄入为正常需要量的 50%-70%
- B、2 个月内体重丢失 5%或前 1 周食物摄入为正常需要量的 25%-50%
- C、1 个月内体重丢失 5%（3 个月内体重下降 15%）或小于 18.5
- D、前一周食物摄入为正常需要量的 0%-25%

【答案】A

23、NRS2002 对于营养状况降低评分 2 分为描述

- A、3 个月内体重丢失 5%或食物摄入为正常需要量的 50%-70%
- B、2 个月内体重丢失 5%或前 1 周食物摄入为正常需要量的 25%-50%
- C、1 个月内体重丢失 5%（3 个月内体重下降 15%）或小于 18.5
- D、前一周食物摄入为正常需要量的 0%-25%

【答案】B

24、NRS2002 对于营养状况降低评分 3 分描述为

- A、3 个月内体重丢失 5%或食物摄入为正常需要量的 50%-70%
- B、2 个月内体重丢失 5%或前 1 周食物摄入为正常需要量的 25%-50%

C、1 个月内体重丢失 5%（3 个月内体重下降 15%）或小于 18.5 或前一周食物摄入为正常需要量的 0%-25%

【答案】 C

25、轻度疼痛评分

A、1-3

B、4-6

C、7-10

D、1-2

【答案】 A

26、中度疼痛评分

A、1-3

B、4-6

C、7-10

D、1-2

【答案】 B

27、重度疼痛评分

A、1-3

B、4-6

C、7-10

D、1-2

【答案】 C

28、护理分级的标准是

- A、病情和年龄
- B、自理能力和年龄
- C、病情和自理能力
- D、自理能力

【答案】 C

29、自理能力等级分级标准正确的是

- A、无需依赖 91-100 分
- B、轻度依赖 61-90 分
- C、中度依赖 41-60 分
- D、重度依赖 总分<40 分

【答案】 C

30、Barthel 自理能力评定量表中 5 分的项目有哪些

- A、进食和洗澡
- B、洗澡和穿衣
- C、进食和修饰
- D、洗澡和修饰

【答案】 D

31、通过 Barthel 评定量表显示康复治疗效益最大的是

- A、60 分以上的患者
- B、50 分以上的患者
- C、40 分以上的患者
- D、30 分以上的患者

【答案】 C

32、Barthel 评定量对日常生活能力进行评定包括 个项目

A、6

B、8

C、9

D、10

【答案】 D

33、我们医院医惠系统中使用的营养评定量表是

A、SGA

B、PG-SGA

C、NRS-2002

D、MNA

【答案】 C

34、医惠系统营养风险筛查中疾病程度评分错误的是

A、恶性肿瘤 2 分

B、髌骨骨折 1 分

C、骨髓移植 3 分

D、食道肿瘤伴吞咽困难 3 分

【答案】 A

35、医惠系统营养风险筛查中总分为 分，提示营养风险阳性，需进行营养干预

A、 ≥ 2 分

B、 ≥ 3 分

C、 ≥ 4 分

D、 ≥ 5 分

【答案】 B

36、医惠系统营养风险筛查中疾病程度评分错误的是

A、慢性阻碍性肺疾病 1分

B、血液透析 1分

C、肝硬化 1分

D、脑卒中 1分

【答案】 D

37、以下关于疼痛的描述错误的是

A、心绞痛可牵涉至左肩和左前臂内侧

B、胆囊疼痛可牵涉至右肩

C、胰腺痛可牵涉至左腰背部

D、胆囊疼痛可牵涉至右肩和右腰背部

【答案】 D

38、以下哪项不是慢性疼痛的特点

A、疼痛持续2个月以上

B、具有持续性

C、顽固性

D、反复发作

【答案】 A

39、按疼痛程度分类，患者疼痛较重，伴有心跳加快，血压升高属于

- A、微痛
- B、轻度疼痛
- C、中度疼痛
- D、剧烈疼痛

【答案】 C

40、中华护理学会颁布的成人癌性疼痛护理标准中，要求入院 内
对患者疼痛情况进行常规评估

- A、2 h
- B、4 h
- C、8 h
- D、10 h

【答案】 C

41、使用阿片类药物后评估时间错误的是

- A、口服给药 60 分钟
- B、皮下给药 30 分钟
- C、静脉给药 15 分钟
- D、皮下给药 20 分钟

【答案】 D

42、影响病人对疼痛的响应的因素有

- A、年龄
- B、意志力

- C、疼痛经历
- D、社会文化背景
- E、以上都对

【答案】 E

43、以下对于疼痛出现的时间错误的是

- A、餐后痛多见于胆胰疾病、胃部肿瘤
- B、餐后痛多见于十二指肠溃疡
- C、卵泡破裂者疼痛于月经间期发作
- D、餐后痛多见于胃溃疡

【答案】 B

44、关于头痛的描述错误的是

- A、头痛的程度可分为轻度、中度和重度
- B、三叉神经痛、偏头痛及脑膜刺激的疼痛最为剧烈
- C、女性偏头痛与月经周期无关
- D、脑肿瘤所致头痛多呈慢性进行性加重

【答案】 C

45、癌痛患者疼痛评估应以 为依据

- A、家属的描述
- B、医生的判断
- C、患者的主诉
- D、患者的表情

【答案】 C

46、患者自理能力分级依据项是

- A、应根据医生医嘱确定
- B、根据分级护理的等级来确定自理能力等级
- C、采用 Barthe 指数评定量表对日常生活活动进行评定，根据 Barthe 指数总分，确定自理能力等级
- D、根据患者病情来分级

【答案】 C

47、根据 Barthe 指数评定细则，在进食项目中，哪种情况可得 10 分

- A、需部分帮助
- B、需极大帮组或完全依赖他人
- C、可独立进食
- D、完全依赖他人

【答案】 C

48、患者如厕时，支撑躯干、穿脱、便后处理均需辅助，患者此项可得（ ）分

- A、0 分
- B、5 分
- C、10 分
- D、15 分

【答案】 A

49、患者穿衣时需部分帮助，其 Barthe 指数评定细则中穿衣项目为多少分

A、 15

B、 10

C、 5

D、 0

【答案】 C

50、患者如厕时需要极大帮助或完全依赖他人，其 Barthe 指数评定细则中如厕项目为多少分

A、 15

B、 10

C、 5

D、 0

【答案】 D

51、患者控制大便偶尔失控，或需他人提示，其 Barthe 指数评定细则中控制大便项目为多少分

A、 15

B、 10

C、 5

D、 0

【答案】 C

52、自理能力的评定不包括

A、 穿衣

B、 控制大小便

C、洗脸

D、交流

【答案】 D

53、下列哪项属于住院患者自理能力评估内容

A、生命体征

B、入院方式

C、依从性

D、如厕

【答案】 D

54、患者进食时需要极大帮助或完全依赖他人，或留置胃管，其 Barthe 指数评定中进食项目为多少分？

A、15 分

B、10 分

C、5 分

D、0 分

【答案】 D

55、需要用药物才能缓解的持续性重度疼痛，属于疼痛几级（ ）

A、0 级

B、1 级

C、2 级

D、3 级

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538002131046006037>