

《外科护理学》(各论)作业题

姓名

学号

成绩

一、单项选择：

() 1. 甲亢术后最危急的并发症是

A.呼吸困难和窒息 B.喉返神经损伤 C.甲状腺危象 D.手足抽搐

() 2.某交通事故现场，应首先处理伤员是

A.开放性气胸 B.头皮撕裂渗血 C.肩关节脱位 D.尺桡骨开放性骨折 E.踝关节扭伤

() 3.现场急救开放性骨折动脉破裂出血合并休克的伤员时，应首先

A.固定骨折 B.止痛 C.止血 D.输液 E.输血

() 4.甲亢患者，清晨起床前测量脉率 100 次 / 分，Bp130 / 80mmHg(17.4 / 10.7KPa)，其基础代谢率应是

A. + 15% B. + 25% C. + 39% D. + 49%

() 5.下列不属于甲亢手术适应症的是

- A 继发性甲亢 B 中度以上甲亢 C 儿童甲亢 D 有压迫症状的甲亢
E 内科治疗效果不佳或复发的甲亢

() 6.甲状腺次全切除术后 9 小时，病人出现颈部迅速肿胀，呼吸困难、烦躁不安，应首先考虑

- A 切口内出血 B 喉部水肿 C 气管软件塌陷 D 喉返神经损伤 E 甲状腺危象

() 7.术后甲状腺危象，多发生在手术后

- A 6~12h B 12~24h C 12~36h D 24~26h E 24~48h

() 8.许先生因肠梗阻 4 日入院，血压 62/45mmHg，血钠 122mmol/L，血钾 3mmol/L， CO_2CP 18mmol/L（正常 23 - 31mmol/L）。处理时首先考虑

- A.纠正酸中毒 B.补充钾盐 C.急诊手术 D.补充血容量 E.给予升压药

() 9. 关于盆腔脓肿的护理，以下错误的是

- A 观察有无直肠刺激症状 B 早期定时温盐水灌肠 C 安置病人于半卧位

D 术后 24~48 小时拔除引流管 E 嘱病人高营养饮食

() 10. 男, 28 岁, 因车祸撞伤腹部, 腹痛难忍, 伴恶心、呕吐, 腹膜刺激征 (+)。以下处理哪项不妥

A 禁食、输液 B 给予胃肠减压 C 给予大剂量抗生素 D 给予吗啡止痛
E 行腹部 X 线透视检查

() 11. 哪些不是骨折的局部 (专有) 体征

A. 局部畸形 B. 反常活动 (假关节活动) C. 骨擦音 D. 疼痛

() 12. 骨折护理诊断包括

A. 焦虑 B. 躯体移动障碍 C. 有失用综合症的危险 D. 以上都是

() 13. 胃大部切除术后 4 日, 出现不含胆汁的频繁呕吐, 可能是

A 胃肠吻合口炎症水肿 B 近侧空肠段梗阻 C 远侧空肠段梗阻 D 倾倒综合症
E 低钾血症

() 14.骨折的治疗原则为

- A.整复 B.固定 C.功能练习 D.以上都是

() 15.某人坠落伤致截瘫，脐以下平面感觉消失，腹壁反射消失，双下肢运动消失，膀胱充盈，肛门括约肌反射消失，其截瘫指数为

- A.2分 B.4分 C.5分 D.6分

() 16. 甲亢手术后最危急的并发症是

- A 喉返神经损伤 B 呼吸困难和窒息 C 喉上神经损伤 D 手足抽搐 E 甲状腺危象

() 17. 关于腹腔穿刺的叙述，以下错误的是

- A 脐前上棘与脐连线的中外 1/3 交界处为穿刺点 B 抽出不凝固血液，提示腹腔内出血
C 抽出血液迅速凝固，提示误穿入血管 D 抽出胃内容物，提示胃肠道损伤
E 穿刺阴性，说明无腹腔内脏器损伤

() 18. 乳腺癌早期的临床表现是

A 乳房疼痛 B 皮肤“橘皮样”变 C 无痛性肿块 D 乳头位置异常 E 出现“酒窝症”

()19. 乳癌根治术后，患侧上肢功能锻炼的目标是

A 能触及对侧耳廓 B 能上举和下垂 C 能触及同侧耳廓 D 能触及头顶

E 能经头顶触及对侧耳廓

()20. 关于预防急性乳腺炎，以下错误的是

A 每次哺乳要将乳汁排空 B 妊娠期即开始矫正乳头内陷 C 妊娠期经常清洗乳头

D 预防性使用抗生素 E 及时治疗婴儿口腔炎症和乳头皲裂

()21. 关于腹外疝的护理，以下错误的是

A 术前消除咳嗽、便秘、排尿困难等引起腹内压增高的因素

B 对巨大疝病人，术前劝其卧床休息 C 术后用“丁”字带托起或用小枕抬高阴囊

D 术后鼓励病人早期下床活动，以防止肠粘连

E 告知病人出院后3个月内避免重体力劳动

() 22.喷射性呕吐见于

A.尿毒症 B.颅内压增高 C.幽门梗阻 D.霍乱 E.胃溃疡

() 23.上消化道出血最常见的原因是

A.食管曲张静脉破裂 B.胃癌 C.十二指肠炎症 D.消化性溃疡 E.胆道出血

() 24.腹泻的病因不包括

A.有机磷中毒 B.急性腹膜炎 C.肠结核 D.甲状腺功能亢进 E.肠道细菌感染

() 25.便秘最重要的护理措施是

A.情绪稳定,精神放松 B.进富含纤维的食物 C.协助寻找病因 D.口服导演剂 E.灌肠

() 26.在我国肝硬化最常见的原因是

A.乙醇中毒 B.肠道感染 C.药物毒性作用 D.乙型肝炎 E.丙型肝炎

() 27.继发性腹膜炎病因应除外

A.腹腔内脏器官穿孔 B.腹腔内脏器官炎症 C.腹腔内脏器官绞窄 D.腹腔内手术污染

E.病原菌经淋巴管或血行到达腹腔

() 28.诊断腔内实质性器官损伤最可靠的依据是

A.腹肌紧张 B.板状腹 C.膈下游离气体 D.移动性浊音 E.腹腔穿刺抽出不凝固血液

() 29.绞窄性肠梗阻的临床特点不包括

A.持续性腹痛阵发性加重 B.早期出现休克 C.出现腹膜刺激征

D.腹穿抽出血性液体 E.肠鸣音活跃

() 30.胆固醇结石形成的最主要原因是

A.胆汁成分改变 B.胆道感染 C.葡萄糖醛酸酶增加 D.胆道内蛔虫残体存留

E.胆道性肠梗阻

() 31. Charcot 三联征的典型表现出现的顺序是

A.寒战高热、黄疸、腹痛 B.腹痛、寒战高热、黄疸 C.黄疸、寒战高热、腹痛

D.寒战高热、腹痛、黄疸 E.腹痛、黄疸、寒战高热

() 32.胆道疾病首选的检查方法是

A.PTC B.ERCP C.CT **D.B超** E.胆道镜

() 33.最容易出现休克的急腹症是

A.急性梗阻性化脓性胆管炎 B.溃疡病合并穿孔 C.急性水肿型胰腺炎

D.急性坏疽性阑尾炎 E.小肠破裂

() 34.暴饮暴食或酗酒最易引起的急腹症是

A.肠扭转 B.粘连性肠梗阻 C.急性坏疽性阑尾炎 **D.急性胰腺炎** E.胆石症

() 35.嵌顿性疝与绞窄性疝的根本区别在于

A.疝块的大小 B.触痛的严重程度 C.有无肠梗阻症状 D.脱出时间的长短

E.疝内容物有无血液循环障碍

36~38 题基于以下病例：秦女士，27 岁，4 日前被汽车撞伤左上腹，当时有腹痛和局部压痛。1 小时前病人用力大便时突然晕倒，面色苍白，脉搏细弱。

() 36.首先考虑

A.脾破裂 B.肝破裂 C.胰腺破裂 D.肠系膜血管破裂 E.肾破裂

() 37.最简单易行的诊断方法是

A.血常规检查 B.X线检查 C.腹腔穿刺 D.B型超声检查 E.CT检查

() 38.正确处理原则是

A.等休克纠正后手术 B.输血、输液检查非手术疗法 C.边抗休克边手术

D.先抗感染再手术 E.观察病情变化、必要时手术

39~40 题基于以下病例：鲁先生，27 岁。转移性右下腹 24 小时来诊。查体：体温 38.6℃，右下腹有固定压痛，明显肌紧张和反跳痛，白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 90%。诊断为急性阑尾炎，准备急症手术治疗。

() 39.该病人的病情应判断为

A.急性单纯性阑尾炎并局限性腹膜炎 B.急性化脓性阑尾炎并局限性腹膜炎

C.急性化脓性阑尾炎并弥漫性腹膜炎 D.急性坏疽性阑尾炎并门静脉炎

E.急性化脓性阑尾炎并阑尾脓肿

() 40.术前护理措施不包括

A.备皮 B.半卧体 C.应用抗生素 D.给麻醉前药物 E.腹痛时用止痛药

() 41. 胃、十二指肠溃疡急性大出血，有明显的休克表现，估计失血量为

A 300~400ml B 400~500ml C 500~600ml D 600~700ml E 800ml以上

() 42. 需要尽快做好紧急手术前准备的肠梗阻是

A 急性肠扭转 B 早期肠套叠 C 麻痹性肠梗阻 D 蛔虫性肠梗阻 E 粘连性肠梗阻

() 43. 阑尾切除术后早期，应注意观察的并发症是

A 盆腔脓肿 B 膈下脓肿 C 肠间脓肿 D 粘连性肠梗阻 E 内出血

() 44. 下列肛门疾患不需手术治疗的是

A 肛门周围脓肿 B 肛瘘 C 前哨痔 D 外痔血栓形成 E 肛裂

() 45. 男性，50岁。阑尾穿孔腹膜炎手术后第5日，体温39℃，切口无红肿，大便次数

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538020030060006035>