
菏泽医专附属医院护理考试题

1. 属于节律异常的脉搏是：[单选题]*

- A. 洪脉
- B. 绌脉(正确答案)
- C. 丝脉
- D. 滑脉

2. 李护士在评估某患者的粪便时，观察到粪便坚硬、呈羊粪样，书写评估报告时，原因可注明：[单选题]*

- A. 胆道梗阻
- B. 便秘(正确答案)
- C. 霍乱
- D. 腹泻

3. 防止空气栓塞的主要措施是：[单选题]*

- A. 严格控制输液总量
- B. 输液中不可随时加入药物
- C. 输液前应排尽空气(正确答案)
- D. 操作时严格遵守无菌技术

4. 青霉素过敏性休克呼吸受抑制时，可注射：[单选题]*

- A. 多巴胺
- B. 可拉明(正确答案)
- C. 氨茶碱

D. 盐酸异丙嗪

5. 运动员比赛时受伤，但自己并没感到疼痛，是受何种因素影响： [单选题]*

A. 文化修养

B. 年龄差异

C. 以往经验

D. 注意力影响(正确答案)

6. 患者，女，43岁，身高155cm，体重65kg，该患者所采用的最佳治疗饮食是： [单选题]*

A. 低脂饮食(正确答案)

B. 低胆固醇饮食

C. 低盐饮食

D. 低蛋白饮食

7. 下列食物中含铁量最少的食物是： [单选题]*

A. 海带

B. 蘑菇

C. 动物肝

D. 奶类(正确答案)

8. 在自然光线下，瞳孔直径可为： [单选题]*

A. 0.5~1mm

B. 2~5mm(正确答案)

C. 1.5~2mm

D. 2~2.5mm

9. 急性口服中毒可采用洗胃方法清除胃肠道内尚未被吸收的毒物，最常用的洗胃溶液为：[单选题]*

A. 1:15000高锰酸钾溶液

B. 1%~2%碳酸氢钠溶液

C. 20%甘露醇溶液

D. 清水(正确答案)

10. 一般患者的入院护理不包括：[单选题]*

A. 准备患者床单位

B. 通知医生诊视患者

C. 填写住院病历

D. 准备急救器材和药品(正确答案)

11. 晚间护理的内容是：[单选题]*

A. 经常巡视病房，了解患者睡眠情况(正确答案)

B. 协助患者排便，收集标本

C. 整理病室，开窗通风

D. 协助患者进食

12. 终尿的产生是通过：[单选题]*

A. 肾小管的重吸收和分泌(正确答案)

B. 肾小管的重吸收作用

C. 肾小管的滤过作用

D. 肾小球的分泌

13. 超声雾化吸入的疗效保证来自于药液气雾可深入到：[单选题]*

- A. 大支气管
- B. 支气管
- C. 咽喉
- D. 肺泡(正确答案)

14. 压疮淤血红润期的主要护理措施：[单选题]*

- A. 除去病因，定时翻身(正确答案)
- B. 局部使用抗生素，避免感染
- C. 厚层滑石粉包扎，减少摩擦
- D. 清洁创面，除腐生新

15. 张某，女，65岁，经常失眠，给10%水合氯醛溶液灌肠，下列操作不妥的是：[单选题]*

- A. 保留半个小时(正确答案)
- B. 嘱其先排便，排尿
- C. 晚间睡前灌入
- D. 肛管插入深度为15~20cm

16. 静脉输液过程中病人感觉胸部不适，随即发生呼吸困难，严重发绀，心前区听诊闻及持续响亮的“水泡音”，你认为是：[单选题]*

- A. 急性肺水肿
- B. 空气栓塞(正确答案)

C. 超敏反应

D. 溶血反应

17. 患者输液后沿静脉走向出现条索状红、肿、热、痛等症状时应： [单选题]*

A. 硫酸镁湿热敷(正确答案)

B. 70%乙醇湿热敷

C. 生理盐水热敷

D. 降低患肢位置

18. 正常的尿液pH值呈： [单选题]*

A. 弱酸性(正确答案)

B. 酸性

C. 中性

D. 弱碱性

19. 某患者在注射青霉素过程中，发生了过敏性休克，表现为胸闷、气急、伴濒死感，此症状是： [单选题]*

A. 皮肤过敏症状(正确答案)

B. 循环衰竭症状

C. 呼吸道阻塞症状

D. 中枢神经系统症状

20. 病人郑某，男，50岁，胃大部分切除术后9天，病情稳定，应给予的护理级别是： [单选题]*

A. 特级护理

-
- B. 一级护理
 - C. 二级护理(正确答案)
 - D. 三级护理

21. 引起大叶性肺炎最常见的病原菌是：[单选题]*

- A. 葡萄球菌
- B. 结核菌
- C. 肺炎链球菌(正确答案)
- D. 溶血性链球菌

22. 以昆虫为媒介传播的疾病是：[单选题]*

- A. 肺结核
- B. 流行性腮腺炎
- C. 猩红热
- D. 流行性乙型脑炎(正确答案)

23. 心衰患者的护理，下列哪项是错误的：[单选题]*

- A. 根据心功能情况决定休息时间和方式(正确答案)
- B. 给予低盐易消化饮食
- C. 保持大便通畅，嘱患者勿用力大便
- D. 严重左心衰竭者，应立即取平卧位休息

24. 患者，男性，36岁，以急性病毒性肝炎(甲型)收治入院。对于其妻子及4岁的女儿，最佳的处理是：[单选题]*

- A. 保护性隔离
- B. 预防性用药

C. 进行相关检查，若未感染可不做处理

D. 进行相关检查，若未感染可注射人丙种球蛋白(正确答案)

25. 吕某,诊断为类风湿关节炎,双侧近端指间关节肿胀且肿痛,每天早晨会出现晨僵,并且出现轻微畸形,吕某的上述症状中,95%以上的类风湿关节炎患者身上均可出现的是:[单选题]*

A. 疼痛

B. 畸形

C. 晨僵(正确答案)

D. 肿胀

26. 糖尿病患者在家注射速效胰岛素,出现极度饥饿、软弱、手抖、出汗、头晕等,此时应:[单选题]*

A. 让患者卧床休息至症状消失

B. 让患者平卧并协助活动四肢

C. 立即给一些口服糖水(正确答案)

D. 立即打电话询问保健医生

27. 患儿男,5岁,近几个月来发热,贫血进行性加重,身体上有紫斑出现,常有鼻出血,血尿等症状,骨髓象检查:幼红细胞、巨核细胞减少。则该患儿最可能的诊断为:[单选题]*

A. 白血病(正确答案)

B. 紫癜

C. 贫血

D. 肾衰竭

28. 护理急性肾衰竭少尿与无尿的病人, 下列措施中最重要的是:

[单选题]*

- A. 限制蛋白质的摄入
- B. 预防感染
- C. 保证饮食总热量
- D. 严格控制水、钾摄入(正确答案)

29. 患者男性, 18岁, 慢性肾炎。入院评估: 患者小学文化, 踝部水肿明显, 尿蛋白(+). 经治疗患者症状消失, 拟于明日出院。下列说法提示护理措施存在缺陷的是: [单选题]*

- A. 全身未见水肿
- B. 水肿严重时给予低盐饮食, 钠 $<6\text{g/d}$ (正确答案)
- C. 能说出药物的作用及不良反应
- D. 能说出自我护理方法

30. 肾病综合征最明显的临床症状是: [单选题]*

- A. 水肿(正确答案)
- B. 高血压
- C. 乏力头晕
- D. 低蛋白血症

31. 患者出现呕血症状, 此时估计胃内潴留量至少达到了: [单选题]*

- A. 400~500ml
- B. 250~300ml(正确答案)

C. 100~200ml

D. 10~50ml

32. 女性, 40岁, 患慢性风湿性心脏瓣膜病, 除具有原发症状外。突然出现一侧下肢剧痛, 动脉搏动消失, 局部皮肤苍白、发凉、发绀, 应考虑是: [单选题]*

A. 脑栓塞

B. 肢体栓塞

C. 下肢静脉炎

D. 下肢动脉栓塞(正确答案)

33. 肝硬化失代偿期患者, 突然出现呕血, 测血压75/45mmHg、脉搏130次/分, 面色苍白, 神志恍惚, 四肢厥冷, 无尿。出血量为: [单选题]*

A. 300ml左右

B. 500ml左右

C. 1000ml左右

D. 1500ml左右(正确答案)

34. 患者李某, 高血压三十余年, 伴冠心病, 近日出现夜间呼吸困难、咳嗽咳痰, 同时伴夜尿增多, 遵医嘱给予地高辛口服。下列情况应该暂停口服地高辛的是: [单选题]*

A. 头晕(正确答案)

B. 低钾

C. 脉搏43次/分钟

D. 恶心

35. 冠心病病人经股动脉行冠状动脉造影术，关于其术后护理的描述不正确的是：[单选题]*

A. 即刻做12导联心电图

B. 持续心电监护24小时

C. 每小时双下肢进行屈曲和伸直运动(正确答案)

D. 无恶心、呕吐等症状，术后2小时即可进食

36. 患者，女，66岁。冠心病病史10年，突然意识丧失，口唇紫绀，颈动脉搏动消失，血压测不到，心电图提示心室颤动。此时最有效的抢救措施是：[单选题]*

A. 胸外心脏按压

B. 人工呼吸

C. 心内注射肾上腺素

D. 非同步直流电复律(正确答案)

37. 判定左心功能不全最有意义的心脏体征是：[单选题]*

A. 舒张期奔马律(正确答案)

B. 心前区震颤

C. 心杂音强

D. 心率变慢

38. 心力衰竭患者的饮食为：[单选题]*

A. 低热量饮食可降低代谢率(正确答案)

B. 以少盐、易消化、清淡饮食为宜

C. 选择富有维生素、钾和适量纤维素的食物

D. 避免食用产气食物，致呼吸困难加重

39. 导致肺心病发生的最根本原因是：[单选题]*

A. 肺动脉高压

B. 缺氧(正确答案)

C. 二氧化碳潴留

D. 肺血管重构

40. 心力衰竭是由于各种心脏结构或功能异常导致心室充盈和(或)射血能力低下而引起的临床综合征，下列选项中_____不是其主要的临床表现。[单选题]*

A. 呼吸困难

B. 昏迷(正确答案)

C. 疲乏

D. 液体潴留

41. 高钾血症患者出现心律失常时，首先应该给予：[单选题]*

A. 5%碳酸氢钠溶液

B. 5%葡萄糖加胰岛素

C. 10%葡萄糖酸钙(正确答案)

D. 0.9%氯化钠溶液

42. 男性，30岁，全麻术后出现呼吸急促，呼吸有鼾声，继而出现鼻翼煽动、三凹征，应首先考虑：[单选题]*

A. 呕吐物误吸

B. 舌后坠(正确答案)

C. 气管导致扭曲

D. 低氧血症

43. 青年男性，背部痈形成脓肿时，有效的处理措施是应尽早：

[单选题]*

A. 理疗热敷

B. 大剂量应用抗生素

C. 切开引流(正确答案)

D. 外敷消炎膏

44. 完全胃肠外营养液中，提供热能的最主要的来源是：[单选

题]*

A. 葡萄糖(正确答案)

B. 脂肪

C. 氨基酸

D. 维生素

45. 患儿，女性，7岁，洗澡时烫伤双下肢，其烫伤面积是：[单

选题]*

A. 23%

B. 53%

C. 55%

D. 41%(正确答案)

46. 对轻症中暑者应给予：[单选题]*

-
- A. 静脉注射生理盐水
 - B. 温水擦浴
 - C. 药物降温
 - D. 阴凉通风处休息，饮清凉饮料(正确答案)

47. 颅内压增高引起的头痛特点是：[单选题]*

- A. 断续性头痛
- B. 闪电样头痛
- C. 持续性头痛
- D. 夜间、清晨加重(正确答案)

48. 损伤性血胸病人胸腔内积血不凝固的原因是：[单选题]*

- A. 出血量太大
- B. 凝血因子减少
- C. 胸腔内存在抗凝物质
- D. 肺及膈肌的去纤维化作用(正确答案)

49. 急性腹膜炎患者发生休克的主要原因是：[单选题]*

- A. 发热(正确答案)
- B. 剧烈疼痛
- C. 大量呕吐
- D. 毒素吸收

50. 胃部肿瘤合并幽门梗阻病人，术前护理中，可减轻胃黏膜水肿的措施是：[单选题]*

- A. 术前3日每晚用温生理盐水洗胃(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/546130233223010045>