

2023 年主治医师之内科主治 303 精选试题及答案二

单选题（共 30 题）

1、结核菌进入血液循环可引起

- A. 脓气胸
- B. 支气管扩张症
- C. 脑膜结核
- D. 喉、肠结核
- E. 肺心病

【答案】 C

2、符合 ALL 特点的是

- A. 苏丹黑染色阴性
- B. 可见 Auer 小体
- C. 过氧化物酶阳性
- D. 糖原 PAS 反应(+)或成块
- E. 非特异酯酶阳性

【答案】 D

3、脑膜炎双球菌，下列正确的是

- A. 共 13 群，以 XYZ 群最常见
- B. 内毒素是其重要致病因素
- C. 我国流行菌群以 B 群为主
- D. 在外界抵抗力强

E. 阳性双球菌

【答案】 B

4、患者女，20岁。受凉后发热1周，体温39度，伴咳嗽、咳黄痰、胸痛，经抗炎治疗后体温下降，胸痛消失，但出现胸闷、憋气、乏力。查体：右中下肺叩浊音，呼吸音消失；血常规：WBC $13.2 \times 10^9/L$ ，NE88%。

A. 肺炎旁胸腔积液或脓胸

B. 结核性胸膜炎

C. 胸膜间皮瘤

D. 恶性胸腔积液

E. 心源性胸腔积液

F. 肺脓肿

【答案】 A

5、患者，女，35岁，低热2个月，伴有腹痛、腹胀，查体腹部移动性浊音阳性，腹腔积液为渗出液，血沉60mm/h，最可能的诊断是

A. 腹膜间皮瘤

B. 系统性红斑狼疮

C. 肝硬化腹腔积液

D. 结核性腹膜炎

E. 肾病综合征

【答案】 D

6、关于甲醇中毒代谢描述错误的是

A. 甲醇可经皮肤吸收

- B. 甲醇在人体中主要是经过肝脏代谢
- C. 甲醇经过依赖叶酸盐的途径氧化为二氧化碳和水
- D. 经过呼吸道吸入的甲醇蒸气约有 80%被吸收
- E. 吸收后的甲醇多数从呼出气和尿排出

【答案】 D

7、据报道，现在有些医院已采取了一些隔离措施，使体格检查置于一个相对封闭的环境中，以免受检患者曝光于众人面前。更确切地说这些措施反映了医院和医生哪一种医德意识()

- A. 有利于患者的意识
- B. 热爱医学事业的意识
- C. 保护患者隐私意识
- D. 管理意识
- E. 服务意识

【答案】 C

8、患者，女性，58岁，有高血压、糖尿病史5年，血压、血糖控制不理想，晨起时突感左眼失明，右侧肢体不能活动，伴言语含混，半小时后症状基本消失。急送入院。查体：血压 160 / 95mmHg，神志清楚，吐词略含混，右上肢肌力4级，右下肢5级

- A. 血流动力学改变
- B. 脑血管痉挛
- C. 血黏滞度增高
- D. 脑外盗血
- E. 微栓塞

【答案】 A

9、罗格列酮的作用机制

- A. 激活 PPAR γ ，提高细胞对胰岛素作用的敏感性
- B. 抑制小肠黏膜刷状缘的 α -葡萄糖苷酶
- C. 抑制糖原异生和分解
- D. 刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素
- E. 促进胰岛 β 细胞合成胰岛素

【答案】 A

10、出血时间延长，血块退缩试验不良

- A. 纤维蛋白形成障碍
- B. 凝血活酶形成障碍
- C. 血小板质或量的异常
- D. 凝血酶形成障碍
- E. 血管壁的异常

【答案】 C

11、女性，56岁，患糖尿病7年，长期口服降糖药治疗，近1个月出现大量蛋白尿，肾活检提示基底膜增厚，IgG沿基底膜线性沉积。此时应

- A. 考虑糖尿病肾病，给予胰岛素治疗
- B. 考虑原发性膜性肾病，给予激素治疗
- C. 考虑糖尿病肾病，给予RAS阻断剂治疗
- D. 考虑原发性膜性肾病，给予激素+胰岛素+RAS阻断剂治疗
- E. 考虑原发性膜性肾病，给予胰岛素治疗

【答案】 D

12、治疗大多数品种的有机磷农药中毒采用

- A. 胆碱酯酶复能剂
- B. 阿托品加对症治疗
- C. 阿托品
- D. 阿托品加胆碱酯酶复能剂加对症治疗
- E. 对症治疗

【答案】 D

13、男性患者，65岁。因老年性慢性支气管炎合并下肢静脉血栓入院，予华法林治疗10天，突然出现四肢较多的青紫淤斑，查凝血酶原时间为33秒，活动度为23%，部分凝血活酶时间为98秒。既往无出血史。首选治疗应为

- A. 止血敏
- B. 维生素K
- C. 安络血
- D. 输全血
- E. 止血芳酸

【答案】 B

14、铁缺乏时，供给骨髓造血用的铁是下列哪项提供的

- A. 贮存铁
- B. 血红蛋白铁
- C. 运转中的铁
- D. 易变池铁

E. 肌红蛋白铁

【答案】 A

15、关于新月体性肾炎肾脏病理改变，下列描述正确的是

- A. I 型表现为 IgG 及 C3 呈颗粒样沉积于毛细血管壁
- B. I 型表现为 IgG 及 C3 呈线条样沉积于毛细血管壁
- C. III型免疫病理表现为 满堂亮
- D. II 型表现为 IgM 呈线条状沉积于毛细血管壁
- E. II 型表现为 IgA 及 C3 呈颗粒样沉积于系膜区和毛细血管壁

【答案】 B

16、造血干细胞异常引起的贫血是

- A. 自身免疫性溶血性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 珠蛋白生成障碍性贫血
- D. 缺铁性贫血
- E. 巨幼细胞性贫血

【答案】 B

17、女性，30岁。以头晕、头痛3个月就诊，近3个月来，患者时有全身不适，低热，易疲劳，食欲减退，体重下降。3天前曾有晕厥。入院后查体：双侧上肢血压压差增大(>10mmHg)，右颈部及右锁骨下可闻及收缩期血管杂音，右侧脉搏触不到。实验室检查示血沉增快，C反应蛋白升高。

- A. ACA
- B. ds-DNA

- C. ANA
- D. 抗主动脉抗体
- E. ANCA

【答案】 D

18、P 波

- A. 代表心房除极过程
- B. 代表右心房开始除极至心室开始除极的时间
- C. 代表心室除极的全部过程
- D. 代表心室缓慢复极的过程
- E. 代表心室快速复极的过程

【答案】 A

19、女性，45 岁，肥胖多年，口渴 5 个月，尿糖（+），空腹血糖 7.9mmol/L，饭后 2 小时血糖 12.1mmol/L

- A. 糖尿病型
- B. 肾性糖尿
- C. 食后糖尿
- D. 糖尿病 2 型
- E. 类固醇性糖尿病

【答案】 D

20、男性，47 岁，轻体力劳动者，初诊 LA-DA。查体：身高 1.75m，体重 55kg，心、肺、腹正常

- A. C 肽释放试验

- B. 胰岛素释放试验
- C. 口服葡萄糖耐量试验
- D. GAD-Ab
- E. IAA

【答案】 D

21、女性，35岁，患肺结核已3年，治疗不规则，2天前受凉后发热，T38℃，体检无明显异常，胸片示两上肺片状阴影，伴不规则透亮区，为判断肺结核是否有活动，下列最有意义的是

- A. 痰结核杆菌阳性
- B. 发热等结核中毒症状
- C. 胸片上浸润性病灶
- D. 胸片上有空洞性病变
- E. 血沉增高

【答案】 A

22、男性，30岁，4年来上腹部偏右侧节律性疼痛，进食后可缓解，伴反酸，3天前出现柏油样便

- A. 食管静脉曲张破裂出血
- B. 反流性食管炎出血
- C. 食管贲门黏膜撕裂综合征
- D. 十二指肠溃疡出血
- E. 出血糜烂性胃炎出血

【答案】 D

23、男性，14岁。严重口干，多饮、多尿伴遗尿2个月就诊。体检：身高132cm，体重26kg

- A. 肝损害
- B. 内脏血管收缩及平滑肌收缩引起腹痛
- C. 切勿过量引起水中毒
- D. 高血压
- E. 白细胞减少

【答案】 C

24、关于结核杆菌正确的是

- A. 兼性厌氧菌
- B. 厌氧菌
- C. 兼性需氧菌
- D. 需氧菌
- E. 既需氧又厌氧细菌

【答案】 D

25、男性，50岁，酒后上腹痛，腹胀8小时，查体：上腹明显压痛，肌紧张，反跳痛，血压120/80mmHg，脉搏88次/分，血清淀粉酶>500Somogyi单位

- A. 血清淀粉酶持续升高超过5天
- B. 血清钙低于1.75mmol/L
- C. 血清钾、血清镁同时降低
- D. 血清淀粉酶>500Somogyi单位
- E. 尿淀粉酶>1000Somogyi单位

【答案】 B

26、有关肺结核的预防性化学治疗方案，下列正确的是

- A. 异烟肼+利福平+乙胺丁醇，顿服 3 个月
- B. 异烟肼+利福平，顿服 3 个月
- C. 异烟肼+利福平，顿服半年
- D. 异烟肼 300mg / d，顿服 1 年
- E. 异烟肼 300mg / d，顿服 3 个月

【答案】 B

27、对于消化性溃疡的病理，以下哪种不正确

- A. 消化性溃疡多单发
- B. 溃疡的边缘不整齐
- C. 溃疡愈合一般需要 4~8 周
- D. 溃疡的直径一般小于 2cm
- E. 溃疡呈圆形或椭圆形

【答案】 B

28、女性，45 岁，发现右侧乳房包块及左侧腹股沟淋巴结肿大 1 个月，查体：右侧乳腺及左腹股沟各扪及一 2cm×2cm 大小包块，活动、质软、无痛

- A. 磁共振
- B. B 超
- C. 骨扫描
- D. 淋巴结活检
- E. 肝功能

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/546214020051010103>