

新冠重症病例救治培训考核考题及答案（医疗）

单选题

1.为加强重症监护病区（ICU）建设，原则上按照医院编制床位的（）设置重症监护病床。

A.10~15%(正确答案)

B.15~20%

C.20~25%

D.25~30%

2.当静脉输液治疗可能要超过（）天时，应使用中线导管或经外周中心静脉导管（PICC）。

A.5天

B.6天(正确答案)

C.7天

D.8天

3.β-内酰胺类抗生素的作用机制是（）

A.干扰核酸的复制与转录

B.影响细胞膜的通透性

C.抑制细胞壁的合成(正确答案)

D.为二氢叶酸还原酶抑制剂

E.干扰细菌蛋白的合成

4.ICU中应设置负压病房，普通病房与负压病房的配比应为（）

A.5:1

B.10:1

C.15:1(正确答案)

D.20:1

5.与一代头孢菌素相比，下列属于二代头孢菌素特点的是（）

- A.提高了对阴性杆菌 β -内酰胺酶稳定性 (正确答案)
- B.对厌氧菌无作用
- C.对绿脓杆菌有效
- D.肾毒性比一代高

6.我国导尿管相关尿路感染的定义是：患者留置导尿管或拔除导尿管（）内发生的泌尿系感染

- A.12小时
- B.24小时
- C.48小时 (正确答案)
- D.72小时

7.PSV模式下，Etrigg设定为正常肺吸气峰值流量的（）

- A.20%
- B.25% (正确答案)
- C.30%
- D.35%

8.有关COPD患者急性发作期持续低流量吸氧的主要原因是（）

- A.COPD患者红细胞携氧能力增强
- B.COPD患者氧在组织的释放增加
- C.低流量吸氧可以有效改善患者氧合
- D.低流量吸氧在COPD患者比在正常人可以更好的提高PaO₂ (正确答案)

9.下列哪一项是避免气体闭陷最有效的方法（）

- A.降低呼气阻力
- B.控制性低通气 (正确答案)
- C.缩短吸气时间
- D.降低CO₂产量

10.在器官功能失代偿期，使用RASS评分时，镇静目标常为（）

- A.0~-2分
- B.-1~-3分
- C.-2~-4分
- D.-3~-5分 (正确答案)

11.在重症患者中，使用行为疼痛量表（BPS）时，理想目标评分为（）

- A.3~4分(正确答案)
- B.5~6分
- C.6~7分
- D.7~8分

12.对于脓毒症患者来说，每日蛋白质供给量应为（）

- A.1.2~2.0g/kg/天(正确答案)
- B.1.5~2.0g/kg/天
- C.2.0~2.5g/kg/天
- D.2.5~3.0g/kg/天

13.在Cormack分级中，属于II级表现的是（）

- A.不见会厌
- B.可见会厌，不见声门
- C.声门部分暴露，可见后联合 (正确答案)

D.完全暴露声门

14.使用ECMO时，选择动脉插管需满足（）的血流量：[单选题]

A.2.0~2.2L/m²•min

B.2.2~2.5L/m²•min(正确答案)

C.2.5~2.8L/m²•min

D.2.8~3.0L/m²•min

15.在我国，ECMO辅助期间应维持ACT在（）

A.140~160s

B.160~180s(正确答案)

C.180~200s

D.200~220s

16.循环衰竭患者ECMO辅助期间，平均动脉压应维持在（）以上：

A.50~55mmHg

B.55~60mmHg

C.60~65mmHg(正确答案)

D.65~70mmHg

17.下列关于V-A ECMO说法不正确的是（）

A.准确监测CVP(正确答案)

B.气体交换能力佳

C.直接心脏支持

D.无氧合血液再循环

18.下列属于ECMO最严重的并发症是（）

- A.呼吸衰竭
- B.感染
- C.溶血
- D.颅内出血 (正确答案)

19.下列属于高回声人体组织的是 ()

- A.淋巴结、软骨、神经纤维
- B.各种被膜、筋膜、神经鞘 (正确答案)
- C.骨骼、钙化、结石
- D.肝、脾实质

20.下列不属于心脏超声胸骨旁短轴标准切面特征的是 ()

- A.图像位于屏幕正中央
- B.正常的右心室呈C型，壁薄
- C.正常左心室腔呈圆形，壁厚
- D.室间隔呈竖直状 (正确答案)
- E.乳头肌在3点钟和8点钟位置，紧贴室壁

21.在正常肺组织中，超声不可见以下哪种特征 ()

- A.蝙蝠征
- B.沙滩征
- C.窗帘征
- D.条码征 (正确答案)

22.下列选项中，不属于B线特征的是 ()

- A.正常人不可见(正确答案)
- B.从胸膜线发出

C.高回声

D.随着胸膜的滑动而滑动

23.行肾脏超声检查时，最常采用体位是（）

A.卧位

B.仰卧位

C.侧卧位 (正确答案)

D.Trendelenberg位

24.当进行血管超声时，超声波束与血流之间的夹角最佳范围是（）

A.20~50度

B.30~60度(正确答案)

C.40~70度

D.50~80度

25.根据血流动力学治疗原则，当HR下降时，会出现（）

A.SV减弱

B.EDV增加(正确答案)

C.EDP减弱

D.耗氧量减少

26.关于颈内静脉穿刺置管，下列说法不正确的是（）

A.基本步骤为seldinger法

B.男性进针深度为13~15cm

C.女性进针深度为12~14cm

D.胸片导管尖端位置位于右心房上2cm (正确答案)

27.肺血管通透性指数PVPI正常范围是（）

- A.1~2
- B.2~3
- C.1~3 (正确答案)
- D.2~4

28.在CRRT中，血浆中水份的清除主要依靠（）

- A.弥散
- B.对流
- C.超滤 (正确答案)
- D.吸附

29.下列不属于小分子物质的是（）

- A.尿素
- B.肌酐
- C.尿酸
- D.肿瘤坏死因子 (正确答案)

30.关于低分子肝素，下列说法错误的是（）

- A.主要通过肾脏代谢
- B.与凝血X因子结合
- C.鱼精蛋白可作为其有效拮抗剂 (正确答案)
- D.具有良好的量效关系

31.关于CVVH和CVVHDF前稀释说法错误的是（） A.增加凝血风险 (正确答案)

- B.超滤率高(正确答案)
- C.置换液用量增加

D.适用于血细胞比容大于40%

32.血液灌流的一般治疗时长为（） A.2-3小时 (正确答案)

B.4-6小时(正确答案)

C.6-8小时

D.8-12小时

33.Bounman认为，当患者尿量大于（）时就可以停止CRRT:

A.40ml/h

B.50ml/h

C.60ml/h(正确答案)

D.80ml/h

34.呼衰可作鼻或口鼻面罩机械通气的患者是

A、轻中度神志尚清，能配合的患者(正确答案)

B、病情严重，神志清，不合作的患者

C、昏迷的患者

D、呼吸道有大量分泌物的患者

35.严格执行手卫生可以降低VAP的发生率，手卫生的时机包括（）

A.在接触患者前后

B.接触患者体液后

C.在进行清洁/无菌程序之前

D.以上都是 (正确答案)

36.关于导管相关血流感染的定义，下列选项中正确的是（）

A.带有血管内导管或者拔除血管内导管48h内的患者出现菌血症或真菌血症，并伴发热(大于38.5℃)、寒战或者低血压等表现，除血管导管外没有其他明确的感染源

B.带有血管内导管或者拔除血管内导管48h内的患者出现菌血症或真菌血症，并伴发热(大于38℃)、寒战或者低血压等表现，除血管导管外没有其他明确的感染源(正确答案)

C.带有血管内导管或者拔除血管内导管24h内的患者出现菌血症或真菌血症，并伴发热(大于38℃、寒战或者低血压等表现，除血管导管外没有其他明确的感染源

D.带有血管内导管或者拔除血管内导管24h内的患者出现菌血症或真菌血症，并伴发热(大于38.5℃)、寒战或者低血压等表现，除血管导管外没有其他明确的感染源

37.以下关于氧疗目标正确的是（）

A.低氧伴高碳酸血症呼吸衰竭风险患者的氧疗目标SpO₂为90%—94%

B.低氧不伴高碳酸血症呼吸衰竭风险患者的氧疗目标 SpO₂为88%—92%

C.低氧伴高碳酸血症呼吸衰竭风险患者的氧疗目标SpO₂为88%—92% (正确答案)

D.低氧不伴高碳酸血症呼吸衰竭风险患者的氧疗目标SpO₂为92%—94%

38.气道压力过低最常见的报警原因是（）

A.气囊漏气

B.呼吸机管道脱离 (正确答案)

C.病人回路的漏气

D.低压报警设置太高

39.多重耐药感染主要以（）菌株为主

A.CRAB (正确答案)

B.CRE

C.CRPA

D.MRSA

40.关于呼吸机触发敏感度的设置，下列哪项是正确的（）

A.压力触发常为-1.5~-0.5cmH₂O，流速触发常为1~5L / min (正确答案)

B.压力触发常为-2~-1cmH₂O，流速触发常为1~5L / min

C.压力触发常为-0.5~-1cmH₂O，流速触发常为1~5L / min

D.压力触发常为-3~-2cmH₂O，流速触发常为1~5L / min

E.压力触发常为-3~-0.5cmH₂O，流速触发常为1~5L / min

41.血液净化技术不仅仅用于慢性肾衰竭的替代治疗，且已广泛用于下列多种危重病的治疗，除外（）

A.感染性休克

B.中毒

C.MODS

D.横纹肌溶解综合征

E.糖尿病酮症酸中毒 (正确答案)

42.下列选项能诊断为MODS的是（）

A.肺心病

B.SLE引起的肾和血液系统损害

C.休克继发的肾功能损害 (正确答案)

D.充血性心功能不全导致的淤血肝

E.肝肾综合征

43.中心静脉压（CVP）监测主要反映（）

A.左心房和右心房的压力

B.左心室和右心室的压力

C.上、下腔静脉和右心房的压力(正确答案)

D.胸腔内动、静脉压力

E.腹腔动、静脉压力

44.下列有关氧消耗的说法不正确的是（）

A.要求患者在安静状态下测定，而且要尽可能缩短测量时间

- B.能反映机体对氧的需求量
- C.代表组织的实际需氧量(正确答案)
- D.常用两种方法测定：直接测定法和反向Fick法
- E.按体表面积计算每分钟的组织氧消耗称为氧消耗指数，碱中毒时氧消耗指数减少

45.下列选项中，支持导管相关性感染的实验学检查是（）

- A.有一次半定量导管培养阳性(每导管节段 ≥ 15 CFU)或定量导管培养阳性(每导管节段 ≥ 1000 CFU)，同时外周静脉血培养阳性，并与导管节段培养为同一微生物
- B.从导管和外周静脉同时抽血做定量培养，两者菌落计数比 $\geq 5:1$
- C.从导管和外周静脉同时抽血做定量培养，中心静脉导管血培养阳性结果出现时间比外周血培养至少早2小时
- D.外周血和导管出口部位脓液培养均阳性，并为同一株微生物
- E.以上均是(正确答案)

46.临床上重症监护室患者最常见的感染部位是（）

- A.伤口
- B.消化道
- C.下呼吸道(正确答案)
- D.血液
- E.泌尿系

47.Ⅱ型呼吸衰竭发生的主要原因是（）

- A.肺泡通气量下降(正确答案)
- B.弥散功能障碍
- C.右向左分流
- D.左向右分流
- E.通气血流比例失调

48.重症患者急性肾衰竭的治疗原则不包括（）

- A.卧床休息，充分补充营养和热量
- B.必须限制水钠的摄入 (正确答案)
- C.控制感染
- D.肾替代治疗，及早清除毒素
- E.积极治疗原发病

49.心肺复苏后，最容易出现的继发性病理改变是（）

- A.心肌缺血性损害
- B.肝小叶中心性坏死
- C.肺水肿
- D.肾小管坏死
- E.脑缺氧性损害(正确答案)

50.若一个患者的SpO₂95%，氧分压80mmHg，吸入氧浓度50%，呼吸频率30次/分，那么该患者的ROX指数是（）

- A.6.33 (正确答案)
- B.160
- C.190
- D.0.063

51.下列关于严重感染的早期集束化治疗的说法不正确的是（）

- A.早期的血清乳酸测定
- B.抗生素使用前留取病原学标本
- C.ICU3小时之内开始广谱抗生素治疗 (正确答案)
- D.液体复苏使CVP>8cmH₂O

52.ARDS共同性病理变化有（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/548014042126006034>