

公共卫生与预防医学考试题库

第一部分 单选题(300题)

1、牙科手机和耐湿热、需要灭菌的口腔诊疗器械,首选灭菌方法为【单选题】——

- A. 环氧乙烷熏蒸灭菌
- B. 压力蒸汽灭菌
- C. 等离子体灭菌
- D. 化学方法进行浸泡灭菌 煮沸消毒

【答案】： B

2、使用无菌容器正确操作的是【单选题】——

- A. 容器内无菌物取出后,未污染物品可放回
- B. 开盖 30 分钟内盖好,以防污染
- C. 手指不可触及容器内面及边缘,盖的内面朝上
- D. 手抓边缘,以便持物牢靠 盖的内面朝下,以便放置稳妥

【答案】： C

3、下列哪项不是医院感染的特点【单选题】——

- A. 易感人群抵抗力低,病死率高
- B. 医院中流行的菌株大多为多重耐药性
- C. 医院中病原体来源广泛
- D. 在医院感染中人群的病死率很低 在医院内一旦发生感染很容易播散

【答案】： D

4、调查医院内感染的最佳方法是【单选题】——

- A. 从医院微生物室获得病例来源
- B. 临床医院填报病例
- C. 专职护士到病案室前瞻性发现病例
- D. 病室监控护士报告病例

专职护士到病案室从出院病历中查找病例

【答案】：C

5、除灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的压力蒸气灭菌法外,目前最常用的低温灭菌方法是【单选题】——

- A. 环氧乙烷灭菌法
- B. 戊二醛浸泡灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 微波灭菌法

【答案】：A

6、以下哪个手术属于 I 类手术【单选题】——

- A. 脑胶质瘤切除术
- B. 肛瘘切除术
- C. 胰十二指肠肠切除术
- D. 前列腺摘除术 肺叶切除术

【答案】：A

7、护士上午铺好无菌盘后,因临时有事离开 2 个小时后需使用该无菌盘,其应采取【单选题】——

- A. 将原来铺好的重新消毒
- B. 另取一个未经消毒的
- C. 使用昨天使用过的
- D. 使用原来铺好的 使用未使用但经消毒的

【答案】：D

8、冲手时应取姿势为【单选题】——

- A. 指尖朝下,手肘朝上
- B. 手指及前臂前伸
- C. 双手互相搓洗手臂
- D. 指尖朝上,手肘朝下 手指及前臂平伸

【答案】：D

9、根据我国下列卫生标准回答:监督、指导医务人员严格执行无菌技术操作规程,合理应用抗感染药,实施对一次性医疗用品的管理等有关医院内感染管理的制度的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】: E

10、关于使用中的灭菌剂的监测正确的是【单选题】——

- A. 生物监测每周一次
- B. 生物监测每天一次
- C. 生物监测不得检出致病微生物
- D. 化学监测每月一次 灭菌后的物品不得检出任何微生物

【答案】: E

11、拟定各级医院感染管理政策【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】: A

12、对特殊感染而无保留价值的物品,最彻底的灭菌方法是【单选题】

- A. 煮沸消毒灭菌法
- B. 过氧乙酸浸泡法
- C. 燃烧灭菌法
- D. 高压蒸汽灭菌法 日光曝晒法

【答案】: C

13、目前引起输血后肝炎的主要的肝炎病毒为【单选题】——

- A. 乙型肝炎病毒
- B. 甲型肝炎病毒
- C. 戊型肝炎病毒
- D. 丙型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】：D

14、交叉感染【单选题】——

- A. 病人在家中已发生的感染
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

【答案】：C

15、关于刷手的注意事项,其中正确的是【单选题】——

- A. 手刷 48 小时高压消毒 1 次
- B. 刷手的时间为 4 分钟
- C. 手刷放在洗手盆中
- D. 肥皂液每日更换 1 次 刷洗的范围限于被污染的部位

【答案】：D

16、内镜室的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

- A. 内镜室应设检查区和清洗消毒区
- B. 病人进行检查前必须先做肝功能、HBV、HCV 等标记物检查
- C. 需要隔离者留于最后作检查
- D. 每例内镜使用后应用高效消毒剂进行消毒处理,每天工作结束后对内镜进行终末消毒 每天清洗消毒容器

【答案】：C

17、下列哪项不是医院感染病原学的特点【单选题】——

- A.

细菌是最常见的病原体,细菌的种类和分布因感染类型.医院类别.患者具体情况和采取措施不同

B. 目前以革兰阴性杆菌为主,如肠杆菌和非发酵菌,这些细菌常有耐药性

C. 近年来随着抗生素的大量使用,革兰阳性球菌感染,特别是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染.凝固酶阴性葡萄球菌感染正在增加

D. 厌氧菌和深部真菌是机体正常菌群常引起内源性感染 真菌感染正在减少

【答案】：E

18、下述监测不合格的有【单选题】——

A. 层流洁净手术室空气细菌数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$

B. 重症监护室医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. 供应室无菌区物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. 一次性注射器和输液器细菌培养阴性,噬试验阳性 传染病病房物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】：D

19、下列细菌是目前医院感染常见的细菌,但除外【单选题】——

A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌

B. 大肠埃希菌

C. 沙门菌

D. 铜绿假单胞菌 克雷伯肺炎杆菌

【答案】：C

20、下列内镜需灭菌,但除外【单选题】——

A. 纤维支气管镜

B. 腹腔镜

C. 脑室镜

D. 关节镜 胸腔镜

【答案】：A

21、为预防医院感染的发生,新生儿病房床位之间的间距不少于【单选题】——

A.

100cm

B. 90cm

C. 80cm

D. 70cm 60cm

【答案】：B

22、下列隔离操作中哪项是错误的【单选题】——

A. 操作过程中应用手扶好露出鼻部的口罩

B. 用避污纸打开床旁桌上的瓶塞灌开水

C. 测脉搏时持手表放入塑料袋内

D. 用避污纸取回病人用过的药杯 用过的体温表放于消毒液中

【答案】：A

23、手术中切开空腔脏器前用纱垫保护的目的是【单选题】——

A. 防止内脏器官暴露过久

B. 防止细菌污染

C. 防止出血

D. 防止损伤 防止术后腹胀

【答案】：B

24、对预防传染性非典型肺炎无效的公众预防措施是【单选题】——

A. 在通风不好或人群密集的场所戴口鼻罩

B. 勤洗手

C. 讲究个人卫生

D. 注射丙种球蛋白 不接触传染性非典型肺炎病人或临床诊断病人

【答案】：D

25、医院感染管理中,应重点管控的传染来源是【单选题】——

A. 动物

B. 血液制品

C.

各种病人

D. 食品 病原携带者

【答案】：C

26、输血科的医院感染管理描述正确的是【单选题】——

A. 血液检验和处置室设在清洁区

B. 采集患者自体血应在 I 类环境中进行

C. 储存、发放血液应分室在 I 类环境中进行

D. 血浆置换术应在 II 类环境中进行 布局合理,分为有清洁区、污染区

【答案】：D

27、输液反应中属于医院内感染的是【单选题】——

A. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热

B. 由于液体被细菌污染引起的发热

C. 由于输注液体中的药物引起的发热

D. 由于输液管中的内毒素引起的发热 由于输注的液体中含有热源物质引起的发热

【答案】：B

28、下列属于医院感染的是【单选题】——

A. 皮肤粘膜开放性伤口只有细菌定植而无炎症表现

B. 无明显潜伏期的感染为入院 48h 后发生者属医院感染

C. 由于物理化学因素刺激而产生的炎症反应

D. 患者原有的慢性感染在院内急性发作 感染病灶自然扩散

【答案】：B

29、传染病院应设置在下列哪个地方【单选题】——

A. 远离公共场所

B. 交通便利的地方

C. 城市中心

D. 靠近综合性医院 水源充足的地方

【答案】：A

30、关于血液净化室的医院内感染管理,下列哪项不正确【单选题】——

- A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
- B. 工作人员定期体格检查,加强个人防护
- C. 透析器、管路应一次性使用
- D. 传染病病人在隔离净化室进行血液净化,专机透析 急诊病人不需固定透析机

【答案】： E

31、巴氏消毒常用消毒指标是【单选题】——

- A. 消毒温度为 65~75℃,作用时间 10~15min
- B. 消毒温度为 70~80℃,作用时间 5~8min
- C. 消毒温度为 45~55℃,作用时间 20~25min
- D. 消毒温度为 85~95℃,作用时间 10~15min 消毒温度为 62℃,作用时间 30min

【答案】： E

32、根据我国卫生标准回答以下问题:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】： A

33、铺无菌台无菌包布下垂长度为【单选题】——

- A. 10cm 以上
- B. 30cm 以上
- C.

50cm 以上

D. 20cm 以上 40cm 以上

【答案】： B

34、密闭式潴留导尿系统引起感染的危险因素中,哪一项最常见【单选题】——

A. 潴留导尿持续 1 周

B. 集尿袋位处膀胱水平之上

C. 抗生素膀胱冲洗

D. 集尿管扭结或阻塞 密闭系统的接头反复打开

【答案】： E

35、 I 、 II 级手术室空气采样的时间【单选题】——

A. 手术开始前 30 分钟

B. 彻底清扫后 30 分钟

C. 手术结束后 30 分钟

D. 采样前提前开启空气消毒机 30 分钟后 手术开始前 1 小时

【答案】： D

36、医院污物的处理原则,下述哪项是错误的【单选题】——

A. 防止污染扩散

B. 分类收集

C. 分别处理

D. 少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理 尽可能采用焚烧处理

【答案】： D

37、减少免疫功能低下者发生医院感染的措施不正确的是【单选题】——

A. 尽量减少侵入性操作

B. 大量应用广谱抗菌作用预防感染

C. 积极发现和治疗局部病灶和潜在性感染

D. 采取保护性隔离措施,切断感染途径 采用选择性脱污染措

施,减少内源性感染

【答案】： B

38、需要采取严密隔离的疾病是【单选题】——

- A. 乙型肝炎
- B. 艾滋病
- C. 鼠咬热
- D. 肺鼠疫

【答案】：D

39、在医院感染暴发流行或流行得到证实后,医院应在多长时间内报告上级卫生行政部门【单选题】——

- A. 48h
- B. 36h
- C. 24h
- D. 12h 6h

【答案】：C

40、根据我国卫生标准回答:使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出
细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】：D

41、为阳离子表面活性剂,对阴离子表面活性剂有拮抗作用的是【单选题】——

- A. 乙醇
- B. 甲醛
- C. 苯扎溴铵
- D. 过氧乙酸 纯乳酸

【答案】：C

42、每日 I 级手术间开始前,提前开启净化空调系统时间【单选题】——

- A. 10 分钟
- B. 30 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟 40 分钟

【答案】： B

43、B-D 试验只适用于【单选题】——

- A. 下排气压力蒸汽灭菌器检测
- B. 预真空压力蒸汽灭菌器监测
- C. 流动蒸汽灭菌器的监测
- D. 环氧乙烷灭菌器的监测 化学消毒液浸泡消毒时

【答案】： B

44、医院感染的含义是【单选题】——

- A. 所有发生在医院内的细菌感染
- B. 因医疗器械消毒不严造成的感染
- C. 病人在住院期间发生的感染
- D. 病人在住院期间或医院职工在护理或治疗患者过程中发生的感染 医院内病人直接或间接传播引起的感染

【答案】： D

45、低效消毒剂是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： C

46、带入感染【单选题】——

- A. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- B.

在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

D. 病人在家中已发生的感染 病原体来源于病人本身的感染

【答案】：C

47、预防免疫功能低下患者发生医院感染,不正确的是【单选题】——

A. 保护皮肤黏膜的完整性

B. 保护性隔离

C. 全身使用广谱抗生素

D. 治疗局部感染病灶 注射相关疫苗

【答案】：C

48、潜伏病毒的激活感染是【单选题】——

A. 麻疹恢复期

B. 隐性乙型脑炎病毒感染

C. 乙型肝炎病毒携带者

D. 单纯疱疹反复发作 慢性活动性肝炎

【答案】：D

49、关于洗手指征错误的是【单选题】——

A. 脱手套后不需洗手

B. 接触血液、体液和被污染的物品前后

C. 接触患者前后

D. 戴口罩和穿脱隔离衣前后 进行无菌技术操作前后

【答案】：A

50、关于锐器伤后的预防措施,错误的是【单选题】——

A. 如不慎发生锐器伤,应立即采取相应的保护措施,清创、对创面进行严格消毒处理

B. 对发生锐器伤者进行血源性疾病的检查和随访

C. 被HBV阳性病人血液、体液污染锐器刺伤,应在1周内注射乙

型肝炎高效价免疫球蛋白

D.

被 HBV 阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤,应及时进行血液乙肝标志物检查 被 HBV 阳性病人血液体液、污染锐器刺伤,血液乙肝标志物阴性者按规定接种乙肝疫苗

【答案】：C

51、有关内镜消毒下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 腹腔镜用环氧乙烷消毒
- B. 消化内镜用 500×10^{-6} 有效氯的含氯消毒剂消毒
- C. 直肠镜采用高压灭菌
- D. 内镜活检钳使用过频时,采用 2%戊二醛消毒 45 分钟 磷苯二甲醛消毒内镜 5 分钟可灭菌

【答案】：B

52、治疗室的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 注射、治疗时,应辅无菌盘,抽出的药液存放不能超过 2 小时
- B. 治疗室中开启的各种溶媒不得超过 24 小时
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需要 4 小时内使用
- D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换及灭菌 1~2 次 经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不得超过 48 小时

【答案】：E

53、生活垃圾为【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

54、目前胃镜消毒首选的消毒剂是【单选题】——

- A. 乙醇
- B. 84 消毒液
- C. 2%戊二醛

D. 洗必泰 新洁尔灭

【答案】：C

55、B-D 试验合格的标准是【单选题】——

- A. 指示图各部位颜色变化由深变浅
- B. 指示图各部位颜色变化为浅灰色
- C. 指示图各部位颜色变化为深黑色
- D. 指示图各部位颜色变化大致均匀 指示图各部位颜色变化深浅一致均匀

【答案】： E

56、根据我国卫生标准回答以下问题：接触黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ，致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ，致病性微生物不得检出

【答案】： B

57、对患者或怀疑患者传染病的产妇用过的一次性用品及胎盘必须【单选题】——

- A. 放入黄色塑料袋内，密闭运送，无害化处理
- B. 放入红色塑料袋内，密封后丢弃
- C. 放入黑色塑料袋内，按垃圾处理
- D. 放入黑色塑料袋内，密闭运送，无害化处理 放入白色塑料袋内，标记处理

【答案】： A

58、以下概念正确的是【单选题】——

- A. 地面应湿式清扫，保持清洁，局部有血迹等污染时局部用消毒剂处理
- B.

地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白

- C. 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗
- D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好

【答案】: A

59、普通病房【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$,物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$,医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】: C

60、某医院收入一痢疾患者,该患者在入院时又感染了白喉杆菌,入院后发生白喉,这属于【单选题】——

- A. 交叉感染
- B. 医源性感染
- C. 自身感染
- D. 带入感染 以上都不是

【答案】: D

61、对门诊胃镜室使用过的纤维胃镜进行消毒,应该选择的消毒溶液是【单选题】——

- A. 1%氯胺溶液
- B. 5%碘伏
- C. 0.1%苯扎溴铵溶液
- D. 2%碱性戊二醛溶液 0.2%过氧乙酸溶液

【答案】: D

62、根据我国卫生标准回答以下问题:接触皮肤的医疗用品【单选题】

——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出
细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】: C

63、有关抗生素管理下列哪项错误【单选题】——

- A. 把抗菌药物分成一线、二线药物,二线药物应控制使用
- B. 二线药物毒副作用大、价贵、疗效低
- C. 在同类抗生素中应留有替代性药,在必要时再启用
- D. 无药敏结果参考时,可按经验选药原则用药
定期全院菌株的药敏统计结果公布,为临床用药与药剂科进药提供信息

【答案】: B

64、重症监护病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】: B

65、下列细菌是目前医院内感染常见的细菌,但除外【单选题】——

- A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 沙门菌属
- D. 铜绿假单胞菌 肺炎杆菌

【答案】: C

66、下列哪项违反了隔离原则【单选题】——

A.

给同一种病种患者测血压时可不换血压计

- B. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣
- C. 严密隔离患者禁止走出病室
- D. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房 只要做好床边隔离,不同的呼吸道传染病患者可同住一室

【答案】： E

67、一次性使用的注射器使用后正确的做法是【单选题】——

- A. 直接放入耐刺、防渗漏的利器盒
- B. 使用后的一次性针头应重新套上针头套
- C. 使用后用手直接分离针头
- D. 使用后先浸泡再用手直接分离针头 使用后的针头连同注射器丢入医用垃圾桶内处理

【答案】： A

68、对一次性卫生用品、消毒药械的购置查检许可证,对其抽检进行细菌学检查【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】： D

69、胃镜、肠镜、十二指肠镜采用 2%碱性戊二醛消毒浸泡时间应不少于【单选题】——

- A. 10h
- B. 4h
- C. 60min
- D. 30min 10min

【答案】： E

70、张某,以“急性甲型肝炎”收住院治疗,病人正在治疗期间。对该病人应做何种隔离【单选题】——

- A. 保护性隔离
- B. 消化道隔离
- C. 严密隔离
- D. 昆虫隔离 呼吸道隔离

【答案】： B

71、下述不属于灭菌剂是【单选题】——

- A. 20%戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 环氧乙烷
- D. 甲醛 含氯消毒剂

【答案】： E

72、手术部位感染的常见诱因是【单选题】——

- A. 留置导尿管
- B. 气管切开
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： D

73、三级医院【单选题】——

- A. 医院感染发生率 \leq 8%
- B. 切口感染率 \leq 0.5%
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】： B

74、取无菌纱布的正确方法是【单选题】——

- A. 戴手套拿取纱布
- B. 以上都不是
- C. 用灭菌换药镊子夹取纱布

D. 用无菌持物钳夹取纱布 用消毒的手指拿取纱布

【答案】：D

75、医院感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 下呼吸道 胃肠道

【答案】：D

76、肾移植患者应采取【单选题】——

- A. 保护性隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 严密隔离
- D. 消化道隔离 接触隔离

【答案】：A

77、医院内下呼吸道感染的常见诱因是【单选题】——

- A. 留置导尿管
- B. 气管切开
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：B

78、无菌治疗巾打开后,未用完其继续使用的有效时间是【单选题】——

- A. 4h
- B. 12h
- C. 6h
- D. 2h 24h

【答案】：E

79、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最迟不得超过【单选题】——

- A. 72h
- B.

48h

C. 24h

D. 12h 4h

【答案】：D

80、下列消毒剂中哪一种为高效消毒剂【单选题】——

A. 聚维铜碘

B. 碘酊

C. 乙醇

D. 含氯消毒剂 酚类消毒剂

【答案】：D

81、病室内住有百日咳病人,已知病室长6m、宽3.2m、高3m,用纯乳酸进行空气消毒,乳酸的用量是【单选题】——

A. 7ml

B. 6ml

C. 12ml

D. 15ml 5ml

【答案】：A

82、下列消毒剂中属高水平消毒剂的是【单选题】——

A. 戊二醛

B. 聚维酮(络合碘)

C. 苯扎溴铵(新洁尔灭)

D. 乙醇 碘酊

【答案】：A

83、输血科预防医院感染的措施错误的是:【单选题】——

A. 每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和霉菌

B. 保持环境清洁,每天清洁桌面

C. 血浆置换术应在II类环境中进行并注意消毒隔离

D. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平

被血液污染的台面可用新洁尔灭消毒处理

【答案】：E

84、根据我国下列卫生标准回答:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

85、美国一护士在护理埃博拉感染患者时,也被诊断为埃博拉出血热,其属【单选题】——

- A. 外来病毒感染
- B. 非接触性感染
- C. 自患传染性疾病
- D. 医院感染 因空气造成的感染

【答案】：D

86、根据我国下列卫生标准回答:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品的卫生标准是【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】：A

87、严密隔离的措施不对的是【单选题】——

- A.

隔离病房应经常开窗通风,不同类感染患者可同居一室

- B. 入室人员需戴口罩、穿隔离衣及戴手套。一切物品专用
- C. 接触每个患者及其污染物后,必须洗手
- D. 污染的敷料及用品应装袋贴标签,送消毒处理 接触者尽可能注射疫苗或采取预防措施

【答案】： A

88、对洗衣房的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】 ——

- A. 布局上要求洁、污分区,路线由污到洁,不能逆行
- B. 运送车辆应洁、污分开,浸有血液、体液的布类应置于防水袋内封闭运送
- C. 洗衣房应有定期清洁消毒制度
- D. 各类衣服应分类清洗,感染病人与普通病人的衣物应分开清洗对血污布类应区分其感染性,必要时按感染性布类处理

【答案】： E

89、有关医院感染预防与控制的错误概念是【单选题】 ——

- A. 洗手是预防医院感染的重要措施
- B. 滥用抗感染药物可致二重感染
- C. 部分医院感染是可以预防的
- D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致

【答案】： E

90、II类区域空气消毒合格的标准是【单选题】 ——

- A. 细菌总数 $\leq 300\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 400\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌

【答案】： C

91、下列哪种情况属于医院感染：【单选题】——

A.

皮肤、粘膜的开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者

- B. 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎症
- C. 婴儿经胎盘获得的感染,如 CMV、弓形虫病发生在出生后 48 小时以内者
- D. 住院中由于治疗措施而激活的感染 由于输注苏打外渗引起的局部炎症

【答案】： D

92、一级医院【单选题】——

- A. 医院感染发生率 \leq 8%
- B. 切口感染率 \leq 0.5%
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】： D

93、血液-体液隔离应用的标志是【单选题】——

- A. 红色标志
- B. 棕色标志
- C. 黄色标志
- D. 绿色标志 灰色标志

【答案】： A

94、关于使用中的消毒剂、灭菌剂的监测,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 应进行生物和化学监测
- B. 生物监测:消毒剂每季度 1 次,其细菌含量必须 $<100\text{cfu/mL}$,不得检出致病性微生物
- C. 灭菌剂每月生物监测 1 次,不得检出任何微生物
- D. 含氯消毒剂、过氧乙酸等的浓度应每天监测 对戊二醛浓度的监测应每月不少于 1 次

【答案】： E

95、医院感染控制措施中手术部位感染已证实有效的措施不对的是【单选题】——

- A. 清洁的手术环境
- B. 工作人员装束和手术室的无菌操作
- C. 术前沐浴和患者局部皮肤准备
- D. 合理的预防性抗生素的应用和外科伤口监测 熏蒸消毒,术前剃毛

【答案】：E

96、消毒的含义是【单选题】——

- A. 杀灭物品上的所有微生物
- B. 杀灭物品上的芽孢
- C. 消灭包括细菌芽孢在内的各种病原微生物
- D. 消除物品上的一切污秽 消灭除细菌芽孢外的各种病原微生物

【答案】：E

97、无菌盘铺好后有效期不超过多长时间【单选题】——

- A. 2h
- B. 12h
- C. 16h
- D. 4h 8h

【答案】：D

98、医院感染常规监测中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 医院感染高危科室、高危人群监测
- B. 漏报率监测
- C. 医院感染高危因素监测
- D. 医院感染暴发流行监测 传染病报告卡监测

【答案】：E

99、医院感染的传播途径一般不包括【单选题】——

- A. 经土壤传播

B. 经共同媒介物传播

C.

经空气传播

D. 经生物媒介传播 经接触传播

【答案】：A

100、无菌盘铺好后有效期不超过【单选题】——

A. 8h

B. 2h

C. 16h

D. 12h 4h

【答案】：E

101、三级综合医院的医院感染管理机构每月发布发生率最高的医院感染性疾病是【单选题】——

A. 泌尿道感染

B. 表皮传染病

C. 呼吸道传染病

D. 外伤感染 肠道传染病

【答案】：C

102、预防免疫功能低下病人发生医院内感染不正确的是【单选题】——

A. 注射相关疫苗

B. 全身使用广谱抗生素预防感染

C. 治疗局部感染病灶

D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】：B

103、卫生部对医院感染有关的检查指标中下列哪项是错误的【单选题】——

A. 医务人员接受医院感染在职教育每年不少于6学时

B. 常规器械消毒合格率应达100%

C. 当证实有医院感染爆发时医院应于48小时内报告当地卫生部

门

D. 医院抗生素使用率力争小于 50%

一级、二级、三级医院感染率应分别控制在 $\leq 7\%$ 、 $\leq 8\%$ 、 $\leq 10\%$

【答案】：C

104、下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 无菌器械保存液应该是无菌的,最多允许检出少量微球菌
- B. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 200\text{cuf/mL}$,不得检出致病性微生物
- C. 无菌器械保存液细菌总数应 $\leq 5\text{cuf/mL}$,不得检出致病性微生物
- D. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 10\text{cuf/mL}$,允许检出金黄色葡萄球菌
- E. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 100\text{cuf/mL}$,不得检出致病性微生物

【答案】：E

105、接触传染病患者后隔离衣应放在【单选题】——

- A. 治疗区,清洁面向外
- B. 走廊,清洁面向外
- C. 走廊,清洁面向内
- D. 办公室,清洁面向外 病室,清洁面向外

【答案】：B

106、有关紫外线消毒效果监测下列哪项规定是错误的【单选题】——

- A. 对灯管应用时间、照射累计时间进行记录并签名
- B. 对紫外线灯管在安装后、使用前应进行强度监测
- C. 使用中的灯管的强度监测应每个月监测1次
- D. 新购灯管强度大于 $100\mu\text{W/cm}^2$,使用中灯管强度大于 $70\mu\text{W/cm}^2$ 为合格灯管 照射前后人工染菌杀灭率达到99.9%以上为合格灯管

【答案】：C

107、患者女性,45岁。III度烧伤后行植皮术,大腿内侧供皮区消毒不可使用【单选题】——

- A. 3%碘酊
- B. 1:1000 苯扎溴铵酊
- C.

0.5%PVP 碘

D. 1:1000 氯己定酞 70%乙醇

【答案】：A

108、下述哪项不属于微生物【单选题】——

A. 病毒

B. 支原体

C. 细菌

D. 衣原体 钩虫

【答案】：E

109、医院感染监测系统必须符合的标准不正确的是【单选题】——

A. 将成本和工作量减到最低程度,通过及时反馈促进各科室参与监测

B. 灵活,按条件允许适时改变

C. 易于接受

D. 采用统一的诊断标准和监测方法 普遍适应

【答案】：E

110、关于各种危险性物品的处理方法不正确的是【单选题】——

A. 凡是高度危险的物品,必须选用灭菌法

B. 凡中度危险性物品,一般情况下达到消毒即可

C. 中度危险性物品的消毒要求并不相同,部分内窥镜必须达到高效消毒

D. 凡低度危险性物品,一般可用低效消毒方法 而对便器、卫生洁具等物品则只作一般的清洁处理即可

【答案】：E

111、手术间通常保持的湿度【单选题】——

A. 40~60%

B. 30~50%

C. 30~40%

D. 50~60% 40~50%

【答案】：D

112、输液反应中属于医院感染的是【单选题】——

- A. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热
- B. 由于液体被细菌污染引起的发热
- C. 由于输注液体中药物引起的发热
- D. 由于输液管中的内毒素引起的发热 由于输液的血管、导管的感染引起的发热

【答案】： B

113、当被沾有 HBsAg 阳性血的针头刺伤时,立即应作的主要处理是【单选题】——

- A. 乙型肝炎高价免疫血清注射
- B. 给受伤者立即注射丙种球蛋白
- C. 乙型肝炎疫苗注射
- D. 伤口立即涂以碘酒 受伤者立即抽血作乙型肝炎全套抗原抗体检测

【答案】： A

114、从医院获得幽门螺杆菌感染的高危人群中主要是【单选题】——

- A. 检验人员
- B. 消化内科医师
- C. 消化内科护士
- D. 腹部外科医师 口腔科医师

【答案】： B

115、 I 类、 II 类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

【答案】： D

116、对本地区的医院感染管理进行技术指导【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： B

117、关于消毒灭菌方法的选择,错误的是【单选题】——

- A. 耐热耐湿的物品首选压力蒸气灭菌法灭菌
- B. 手术器具与物品首选压力蒸气灭菌法灭菌
- C. 消毒首选物理方法,不能用物理方法消毒时选择化学消毒方法消毒
- D. 不耐热的物品如各种导管、精密仪器、人工移植物可以选择化学灭菌方法,如环氧乙烷灭菌 化学灭菌剂浸泡灭菌方便实用,应加以推广

【答案】： E

118、目前国内医院感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 下呼吸道 胃肠道

【答案】： D

119、下列哪种情况属于医院感染【单选题】——

- A. 烧伤创面培养出金黄色葡萄球菌
- B. 经产道感染的乙型肝炎
- C. 红霉素静脉滴注后发生静脉炎;拔出的导管在血平皿上滚动培养,细菌菌落数 8 个
- D. 羊肠线吸收不佳的炎症反应 入院后 5 天发生的甲型肝炎

【答案】： B

120、医院感染控制措施中血管内装置感染,已证实有效的措施错误的是【单选题】——

- A. 所有导管均应为密闭系统并限制插管的持续时间
- B. 局部皮肤准备,插管时的无菌技术,疑有感染应立即拔除导管
- C. 中心血管导管插管时外科灭菌
- D. 限制敷料更换的频率,短期使用抗生素包裹的导管,限制插管时间
抗微生物药膏用于皮肤准备

【答案】： E

121、铺无菌盘时,使用无菌持物钳的操作如下,其中正确的是【单选题】——

- A. 夹取物品时钳端触及罐口边缘
- B. 使用中钳端始终朝下,无反转动作
- C. 用无菌持物钳夹取消毒油纱布
- D. 到远处夹取物品后立即返回放回浸泡容器内 从浸泡容器中取放时先将钳前端打开

【答案】： B

122、后勤人员在治疗室要安置新的紫外线灯做空气消毒,护理人员指导安装其灯管离地面的距离为【单选题】——

- A. <4m
- B. <2m
- C. <2.5m
- D. <3m <3.5m

【答案】： B

123、关于无菌技术,以下操作错误的是【单选题】——

- A. 消毒液应浸没持物镊的 2/3 左右
- B. 一份无菌物品仅供一位病人使用
- C. 治疗室要湿式清扫,每日紫外线照射 1 次
- D. 衣帽要整齐,口罩遮住口鼻,修剪指甲,洗手

无菌物品与非无菌物品应分别放置

【答案】：A

124、使用中消毒液细菌菌落总数应【单选题】——

- A. $\leq 200\text{cfu/ml}$
- B. $\leq 100\text{cfu/ml}$
- C. $\leq 15\text{cfu/ml}$
- D. $\leq 10\text{cfu/ml}$ $\leq 5\text{cfu/ml}$

【答案】：B

125、注射室属于【单选题】——

- A. I类地区
- B. II类地区
- C. III类地区
- D. IV类地区 非分类地区

【答案】：C

126、引起医院感染的病原微生物主要是【单选题】——

- A. 条件致病菌
- B. 细菌
- C. 弓形体
- D. 衣原体 真菌

【答案】：A

127、给传染病患者发药,下述哪一项是错误的【单选题】——

- A. 协助同一病种的患者服药后,再给另一病种患者喂药
- B. 用过的药杯放在消毒液内浸泡
- C. 全病区发药完毕,按常规消毒药杯
- D. 车下层放盆,内盛消毒液 将备好的药及水壶放在治疗车上

【答案】：A

128、紫外线辐射强度为多少时更换紫外线灯管【单选题】——

- A.

$\approx 70 \mu W/cm^2$

- B. $= 70 \mu W/cm^2$
- C. $< 70 \mu W/cm^2$
- D. $\geq 70 \mu W/cm^2$

【答案】： C

129、下述不符合环境卫生学标准的是【单选题】——

- A. 层流洁净手术室物体表面细菌数 $\leq 5cfu/cm^2$
- B. 普通手术室空气细菌数 $\leq 500cfu/m^3$
- C. 治疗室医务人员手细菌数 $\leq 10cfu/cm^2$
- D. 传染病房物体表面细菌数 $\leq 15cfu/cm^2$ 婴儿室空气细菌数 $\leq 200cfu/m^3$

【答案】： B

130、病房的医院内感染管理措施中错误的是【单选题】——

- A. 感染病人与非感染病人分开
- B. 同类感染病人相对集中
- C. 特殊感染病人单独安置
- D. 室内应定时通风换气,必要时进行空气消毒 地面应常规使用含氯消毒剂消毒

【答案】： E

131、下列消毒剂中属高水平消毒剂的有【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 络合碘
- C. 苯扎溴铵
- D. 乙醇 碘酊

【答案】： A

132、下列哪项不属于灭菌剂【单选题】——

- A. 过氧乙酸
- B. 戊二醛
- C.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/555344334343011204>