

2023 年江苏省成考（专升本）大学医学综合预测试卷

一、单选题

1、心脏内兴奋传导最慢的组织是()

- (A) 窦房结
- (B) 浦肯野纤维
- (C) 房室结
- (D) 心室肌

2、衡量细胞兴奋性大小的常用指标是()

- (A) 静息电位大小
- (B) 阈强度大小
- (C) 动作电位幅度
- (D) 动作电位宽度

3、红细胞双凹圆碟形的形状改变可影响其功能特性的是（）

- (A) 对促红细胞生成素的敏感性
- (B) 叠连的速度
- (C) 渗透脆性
- (D) 表面抗原的类型
- (E) 可塑性变形能力

4、腹部移动性浊音不正确的检查方法是（）

- (A) 变换体位后继续原方向叩诊
- (B) 叩诊音变浊音后改变体位
- (C) 自腹中部沿脐水平面叩诊
- (D) 变换体位时板指不应移动

(E)受检者首先需采取平卧位

5、正常时激活膀胱壁牵张感受器的膀胱内尿量最小范围是 ( )

(A)200~300mL

(B)800~900mL

(C)600~700mL

(D)400~500mL

(E)1000~1100mL

6、参与骨盆构成的骨有 ( )

(A)尾骨

(B)耻骨

(C)坐骨

(D)骶骨

(E)髌骨

7、某患者腹壁曲张静脉分布于腹壁两侧，脐上和脐下静脉血流方向均向上。最可能的原因是【】

(A)肝静脉血栓

(B)胃底静脉开放

(C)脾肾静脉分流

(D)下腔静脉阻塞

(E)门静脉癌栓

8、患者血气分析报告：pH7.24，PaCO<sub>2</sub>76mmHg，PaO<sub>2</sub>55mmHg，HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>32mmol/L，BE4.5mmol/L。应判定为()

(A)失代偿性代谢性酸中毒

(B)失代偿性呼吸性碱中毒

(C)代偿性呼吸性酸中毒

(D)失代偿性呼吸性酸中毒

9、胸膜下界的体表投影在腋中线相交于()

(A)第 8 肋

(B)第 9 肋

(C)第 10 肋

(D)第 11 肋

10、不属于丹毒临床表现的是 ( )

(A)多见于下肢

(B)畏寒、发热

(C)皮肤和淋巴结多见化脓破溃

(D)头痛、全身不适

(E)局部烧灼样疼痛

11、与阴道后穹后方相邻的腹膜间隙是 ( )

(A)卵巢窝

(B)膀胱上窝

(C)膀胱子宫陷凹

(D)直肠膀胱陷凹

(E)直肠子宫陷凹

12、男，50 岁。间断反酸，规律性剑突下疼痛 2 年，排柏油样便 2 天。最可能的诊断是

【】

(A) 急性糜烂出血性胃炎

- (B) 胃癌伴消化道出血
- (C) 消化性溃疡并出血
- (D) 贲门黏膜撕裂综合征
- (E) 食管静脉曲张破裂出血

13、光期引起视杆细胞膜发生的变化是 ( )

- (A)超极化
- (B)极化
- (C)反极化
- (D)去极化
- (E)复极化

14、形成腹股沟韧带的结构是【】

- (A) 腹内斜肌和腹横肌下缘合成
- (B) 腹内斜肌腱膜
- (C) 腹横肌腱膜
- (D) 腹内斜肌和腹横肌腱膜合成
- (E) 腹外斜肌腱膜

15、触及左锁骨上窝硬而无痛的肿大淋巴结时，首先考虑的病因是【】

- (A) 鼻咽癌
- (B) 甲状腺乳头状癌
- (C) 原发性肝癌
- (D) 贲门黏液细胞癌
- (E) 右侧小细胞肺癌

16、参与脂肪消化和吸收的主要胆汁成分是【】

- (A) 胆盐
- (B) 阴离子
- (C) 胆固醇
- (D) 胆色素
- (E) 磷脂酰胆碱

17、呼吸过程中肺内压最低值出现的时期是 ( )

- (A) 呼气末
- (B) 呼气中期
- (C) 吸气初
- (D) 吸气中期
- (E) 吸气末

18、下列监测值中不正确的是 ( )

- (A) CVP 的正常值为 5~12cmH<sub>2</sub>O
- (B) 心排血量的正常值为 4~6L/min
- (C) PCWP 的正常值为 6~15cmH<sub>2</sub>O
- (D) 动脉血乳酸盐的正常值为 1~15mmol/L
- (E) 血 pH 的正常范围为 7.35~7.45

19、女，30岁。寒战、发热4天。查体：右侧肋脊点、肋腰点压痛阳性。首选的辅助检查是 ( )

- (A) 肾功能
- (B) 腹部 B 超
- (C) 粪便常规
- (D) 尿常规

(E)结肠镜

20、提高心肌传导性的因素是（）

(A)静息电位减小

(B)钠电流被阻断

(C)钠通道数量减少

(D)动作电位除极化速度增大

(E)阈电位水平抬高

21、关于休克的一般紧急治疗，不正确的选项为（）

(A)创伤制动、保证呼吸道通畅

(B)及早建立静脉通路

(C)早期给予鼻导管或面罩吸氧

(D)采取平卧位

(E)注意保暖

22、刺激缩胆囊素释放的最强因素是【】

(A) 脂肪酸

(B) 促胃液素

(C) 乙酰胆碱

(D) 葡萄糖

(E) 蛋白质分解产物

23、正常时肾小球不能滤过的物质是（）

(A)尿素

(B)氨基酸

(C)大分子蛋白质

(D)葡萄糖

(E)电解质

24、阻塞性通气功能障碍患者肺功能改变的特点是 ( )

(A)一秒率降低

(B)通气/血流比例失调

(C)气速指数 $>1.0$

(D)残气量减少

(E)肺活量增加

25、术前准备中，下列处理错误的是【】

(A)心力衰竭的患者需控制3~4周后才实行手术

(B)血浆白蛋白测定低于 $30\text{g/L}$ ，则术前需肠内或肠外营养支持

(C)肝功能损害者经治疗好转后方可手术

(D)糖尿病患者手术前应将血糖控制到正常

(E)肾功能重度损害者在有效的透析后仍能耐受手术

26、注入乳糜池的淋巴干是 ( )

(A)左颈干

(B)右锁骨下干

(C)左锁骨下干

(D)右颈干

(E)肠干

27、视近物时，形态改变最显著的眼结构是()

(A)巩膜

(B)角膜

(C)玻璃体

(D)晶状体

28、肺动脉的发出部位是【】

(A)左心房

(B)右心房

(C)右心室

(D)左心室

(E)右心耳

29、既是症状，也是体征的选项是【】

(A)腹痛

(B)心悸

(C)头晕

(D)黄疸

(E)胸闷

30、导致肠鸣音亢进常见的原因是【】

(A)机械性肠梗阻

(B)胃溃疡伴幽门梗阻

(C)服用硫酸镁后

(D)低钾低氯血症

(E)缺血性肠病

31、组织液与血液各种成分的主要区别是【】

(A)大分子蛋白质

(B)有机酸

- (C) 钠离子
- (D) 钾离子
- (E) 钙离子

32、男性患者有尿道外括约肌环绕尿道的部位是 ( )

- (A)尿道内口
- (B)尿道外口
- (C)尿道前列腺部
- (D)尿道球部
- (E)尿道膜部

33、造成心室前负荷增大的因素是 ( )

- (A)心肌收缩力增强
- (B)静脉回流速度下降
- (C)心室充盈量增大
- (D)心率增快
- (E)心室顺应性减小

34、甲状腺癌患者检查最常见的是 ( )

- (A)甲状腺肿大可触及震颤
- (B)甲状腺多发结节伴触痛
- (C)甲状腺包块伴波动感
- (D)甲状腺包块不规则、质硬
- (E)甲状腺肿大并可触及颈动脉搏动

35、具有结肠带和肠脂垂的肠管是 ( )

- (A)肛管

- (B) 直肠
- (C) 阑尾
- (D) 盲肠
- (E) 回肠

36、Brudzinski 征阳性的表现是 ( )

- (A) 趾背伸四趾屈曲
- (B) 颈部抵抗增强
- (C) 股四头肌收缩
- (D) 伸膝受阻伴疼痛
- (E) 髌关节及膝关节屈曲

37、对糖、脂肪和蛋白质均有消化作用的消化液是 ( )

- (A) 小肠液
- (B) 胆汁
- (C) 胃液
- (D) 唾液
- (E) 胰液

38、根据烧伤早期补液的原则，第一个 8 小时内，应该输入第一天总液体量的【】

- (A) 1 / 6
- (B) 1 / 3
- (C) 1 / 4
- (D) 1 / 5
- (E) 1 / 2

39、开口于上鼻道的鼻旁窦是【】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/556010141220010104>