

临床护士应知应会及三基理论练习题与答案

1、患者男性, 60 岁, 有胃溃疡病史, 近日来腹痛加剧, 医嘱做粪便隐血试验, 隐血试验前 3 天可食用的菜谱是

- A、卷心菜, 五香牛肉
- B、菠菜, 红烧青鱼
- C、茭白, 豆腐
- D、油豆腐, 鸡血汤
- E、青菜, 炒猪肝

答案: C

2、气管切开术后应抬高床头()

- A、 $30^{\circ} - 45^{\circ}$
- B、 $25^{\circ} - 30^{\circ}$
- C、 $20^{\circ} - 45^{\circ}$
- D、 $45^{\circ} - 55$

答案: A

3、病变主要在肾脏, 临床表现主要在膀胱, 见于下列哪疾病:

- A、肾肿瘤
- B、肾结石
- C、多囊肾
- D、肾结核
- E、急性肾盂肾炎

答案: D

4、呼吸道和消化道的共同通道是

- A、鼻
- B、咽
- C、喉
- D、气管
- E、肺泡

答案: B

5、患者女, 25 岁, 似定早孕诊断实验, 留取尿标本最适宜的时间是

- A、即刻
- B、下午
- C、临睡前
- D、晨起 E 中午

答案: D

6、 男性, 56 岁, 突然心悸, 气促, 咯粉红色泡沫痰, 血压 195/90mmHg, 心率 135 次/分。护士应首先备好下列哪组药物()

- A、 西地兰, 硝酸甘油, 异丙肾上腺素
- B、 硝普钠、 西地兰, 速尿
- C、 毒 K, 硝普钠, 心得安
- D、 胍乙啶, 酚妥拉明, 西地兰
- E、 硝酸甘油, 西地兰, 多巴胺

答案: B

7、 林某, 男, 70 岁。今天突发糖尿病眼症酸中毒昏迷, 经补碱及静脉滴注小剂量胰岛素和大量补液后神志转清, 后又进入昏迷。此时应首选的处理措施为()

- A、 静脉补钾
- B、 静脉补钙
- C、 吸氧
- D、 停止补液
- E、 停止补碱并静脉滴注甘露醇

答案: E

8、 患者进入手术室后在麻醉实施前必须由具有执业资质的()共同核查。

- A、 手术医师和麻醉医师
- B、 麻醉医师和手术护士
- C、 手术医师和手术室护士
- D、 麻醉医师和巡回护士
- E、 手术医师、 麻醉医师和手术室护士

答案: D

9、 患者, 女性, 50 岁。寒战、 发热伴下腹坠胀 2 天。有便意不尽、 排尿困难。直肠指检于直肠前壁触及压痛肿块, 有波动感。患者最可能的诊断为

- A、 高位肌间脓肿
- B、 骨盆直肠间隙脓肿
- C、 坐骨肛管间隙脓肿
- D、 直肠壁内脓肿
- E、 直肠后间隙脓肿

答案: B

10、 检查肾小管浓缩功能时, 实验期 1 天控制全天饮食中水分总量应为()

- A、 100-200ml
- B、 300-400ml
- C、 500-600ml

D、1000-2000ml

E、2000-3000ml

答案：C

11、某病人输液时,述胸部不适,随即出现呼吸难,严重发绀,胸前区听诊可闻及响亮的持“水泡声”,该病人可能发生了()

A、发热反应

B、空气栓塞

C、,右心衰竭

D、,过敏反应

E、急性肺水肿

答案：B

12、女性,28岁,A因车祸致大腿严重挤压伤就诊,尿蛋白++++,其蛋白尿的类型可能为

A、肾小球性

B、肾小管性蛋白尿

C、溢出性蛋白尿

D、分泌性蛋白尿

E、组织性蛋白尿

答案：C

13、患者、女性、28岁,腰痛,阵发性下腹部疼痛,尿频,尿急,尿痛,伴畏冷,发热1天就诊,查尿蛋白(+),白细胞10/HP,红细胞12/HP.诊断最可能的是()

A、急性膀胱炎

B、尿道综合征

C、泌尿系结石

D、急性肾盂肾炎

E、急性肾炎

答案：D

14、王先生,36岁,右股股沟肿块1个月余,肿块于咳嗽、用力时出现,平卧休息后可消失,体格检查:肿块突入阴囊,回纳后压住深环肿块不突出,则其目前最可能的病情是()

A、易复性腹股沟直疝

B、易复性腹股沟斜疝

C、难复性腹股沟直疝

D、难复性腹股沟斜疝

E、绞窄性腹股沟直疝

答案：B

15、右心功能不全的呼吸困难是由于：

- A、气道反应性增强
- B、支气管狭窄及阻塞
- C、肺循环淤血
- D、气道炎症
- E、体循环淤血

答案：E

16、治疗低血容量性休克的关键是：

- A、原发病的处理
- B、一般紧急治疗
- C、纠正酸碱平衡
- D、原发病的处理和及时补充血容量,恢复有效灌注
- E、应用血管活性药物

答案：D

17、在鼻饲插管过程中病人出现呛咳、发绀,应采取的措施是

- A、嘱病人深呼吸
- B、嘱病人做吞咽动作
- C、托起病人的头部插管
- D、用注射器抽吸胃液
- E、拔出胃管休息片刻后再插管

答案：E

18、下列属于先天性心血管病的是（ ）

- A、原发性高血压
- B、法洛氏三联症
- C、风湿性心脏病
- D、冠心病
- E、心血管神经症

答案：B

19、系统性红斑狼疮的皮肤损害的部位最常见于（ ）

- A、腹部
- B、暴露部位
- C、颈部
- D、前胸上部
- E、下肢

答案：B

20、谢某,男,23岁。因甲状腺功能亢进症收入院。治疗过程中突然出现烦躁不安、大汗淋漓、恶心、呕吐,继而昏迷。体温41℃,心率160次/分。首先考虑该病人可能出现了()

- A、甲状腺功能亢进性心脏病
- B、糖尿病酮症酸中毒
- C、甲亢伴低血糖
- D、甲状腺危象
- E、甲亢继发感染

答案：D

21、空气栓塞患者采取的体位时()

- A、半坐卧位
- B、头高足低左侧卧位
- C、头高足低右侧卧位
- D、头低足高右侧卧位
- E、头低足高左侧卧位

答案：E

22、患者女,40岁。侵蚀性葡萄胎。给予5-氟尿嘧啶和放线菌素D联合化疗8天。该患者可能出现的最严重不良反应是

- A、恶心、呕吐
- B、脱发
- C、骨髓抑制
- D、出血性膀胱炎
- E、口腔溃疡

答案：C

23、为昏迷患者进行口腔护理,防止误吸的措施是()

- A、使用开口器协助患者张口
- B、由外向内擦洗牙齿各面
- C、协助患者漱口
- D、血管钳夹紧棉球,挤出多余液体
- E、检查口腔粘膜

答案：D

24、提示T管引流病人胆道远端通畅的表现是()。

- A、腹痛和黄疸减轻,引流量增多
- B、体温正常,引流量增多

- C、上腹胀痛,引流量减少
- D、食欲好转,黄疸消退,引流量减少
- E、黄疸消退,引流量增多,食欲无变化

答案: D

25、出现黑便,出血量至少应是:

- A、5ml 以上
- B、20ml 以上
- C、30ml 以上
- D、60ml 以上
- E、100ml 以上

答案: D

26、患者转科时应重点交接以下内容,除了:

- A、病情及护理重点
- B、检查引流管
- C、患者的贵重药品及物品
- D、患者的经济情况
- E、全身皮肤情况

答案: D

27、患者男性,70岁。患冠心病20年,近1年活动后易发生心悸、气短,医生诊断为心功能II级,护士指导该患者活动与休息的原则应为

- A、可不限活动,增加午休时间
- B、可起床轻微活动,需增加活动间歇时间
- C、以卧床休息、限制活动量为宜
- D、以卧床休息为主,间断起床活动
- E、需严格卧床休息

答案: B

28、患者女性,32岁,头痛一年半,近两个月头痛加重,伴有喷射样呕吐。烦躁后出现意识障碍,右侧瞳孔缩小,后又散大,光反应迟钝,左侧肢体运动障碍。

呼吸加快,CT示左顶叶肿瘤。首先采取的急救措施应是

- A、立即开颅切除肿瘤
- B、20%甘露醇静脉注射
- C、脑脊液体外引流
- D、去骨瓣减压
- E、气管插管,保持呼吸道通畅

答案: B

29、护士自执业证书被吊销之日起()年内不得申请执业注册。

- A、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 4
- E、 5

答案： B

30、护理记录的PIO格式中的O是指()

- A、 护理评估
- B、 护理措施
- C、 护理结果
- D、 护理问题
- E、 护理评价

答案： C

31、王女士, 42岁。阑尾炎术后需输液 2000ml, 其输液速度为 50 滴/分, 可在几小时内输完

- A、 8 小时
- B、 9 小时
- C、 10 小时
- D、 7 小时
- E、 6 小时

答案： C

32、下列不属于新冠病毒肺炎病例密切接触者的是：

- A、 与病例共同居住、学习、工作的人员
- B、 诊疗、护理、探视落实有效防护的人员
- C、 病例同室的其他病友
- D、 与病例共同乘坐同一交通工具并密切接触者
- E、 接触确诊患者时未有效防护的人员

答案： B

33、留痰标本时, 找癌细胞可选用什么固定标本()

- A、 75%乙醇
- B、 95%乙醇
- C、 40%甲醛
- D、 . 20% 甲醛
- E、 10%甲苯

答案：B

34、患儿,女性,5岁。B超发现右侧甲状腺一直径1.3cm实性结节,无包膜。颈部未探及肿大淋巴结。治疗方案选择

- A、密切随访
- B、¹³¹I内照射治疗
- C、手术切除
- D、服用甲状腺素片
- E、穿刺活检

答案：C

35、给昏迷病人插胃管时,将下颌贴近胸骨柄,是为了

- A、增大咽喉部通道弧度
- B、顺利通过气管分叉处
- C、顺利通过膈肌
- D、减少食道黏膜损伤
- E、减轻病人不适

答案：A

36、一病人精神紧张、烦躁不安、面色苍白、尿量减少、脉压小。此时治疗上应首先给()

- A、血管收缩药
- B、血管扩张药
- C、静脉补液
- D、强利尿剂
- E、5%碳酸氢钠溶液

答案：C

37、下列哪项不符合消毒隔离原则()

- A、体温表用有效碘500mg/L的消毒剂浸泡30分钟或75%乙醇浸泡30分钟
- B、护理做到一床一毛巾、一桌一抹布
- C、不穿污染的工作服进食堂、会议室等
- D、无菌操作时严格遵守无菌技术操作原则
- E、洗手设施符合要求,遵守手卫生管理要求

答案：A

38、急性血源性化脓性骨髓炎最常见的发病部位为()

- A、脊椎
- B、髌骨
- C、桡骨小头

D、胫骨近端

E、肱骨近端

答案：D

39、陈女士, 28 岁, 发作性呼吸困难 16 年, 多在春秋季节发病, 发病前鼻痒、打喷嚏。最可能的诊断是()

A、感染性哮喘

B、运动性哮喘

C、外源性哮喘

D、内源性哮喘

E、混合性哮喘

答案：C

40、胰岛素最主要的不良反应是：

A、过敏性休克

B、皮下脂肪萎缩

C、血管神经性水肿

D、皮肤破损硬结

E、低血糖

答案：E

41、 吞咽障碍评定时, 某患者喝 30ml 水, 两次以上喝完, 没有发生呛咳, 该患者饮水试验结果属于几级()

A、 I

B、 II

C、 III

D、 IV

E、 V

答案：B

42、注某, 男, 65 岁。确诊为冠心病 2 年。护士为其进行健康教育时, 告知其引起发病的危险因素不包括

A、高血压

B、肥胖

C、高纤维素饮食

D、吸烟

E、缺少运动

答案：C

43、李某,男,35岁。确诊为慢性乙型肝炎病毒携带者。对其进行的健康指导不妥的是()

- A、早期抗病毒治疗
- B、避免饮酒
- C、适当运动
- D、定时复查
- E、食具等应专用

答案: A

44、对口腔粘膜的护理评估包括口腔气味、口唇色泽、口腔粘膜是否完整等,当患者出现心肺功能不全表现()

- A、烂苹果味
- B、氨臭味
- C、大蒜味
- D、口唇发绀
- E、口唇樱桃红色

答案: D

45、 护士给病人氧气雾化吸入时,操作不当的是()

- A、先讲解示范
- B、协助病人漱口
- C、将药液稀释至 5-10ml
- D、氧气雾化中的湿化瓶内用水不宜过多
- E、嘱病人用嘴吸气、用鼻呼气

答案: D

46、静脉留置针,皮肤消毒直径多少 cm 并于穿刺点上方多少 cm 扎止血带()

- A、5cm6cm
- B、6-8cm6cm
- C、5-7cm10cm
- D、6-8cm10cm

答案: D

47、 李某,男,67岁。患慢性阻塞性肺疾病近 20 年,1 周前突发高热.咳嗽伴咳痰急诊入院。入院后给予抗生素经验性治疗,体温持续在 39—40℃,并出现寒战。疑有菌血症,为明确诊断,此时应考虑做的检查是()

- A、血常规
- B、胸部 X 线检查
- C、痰培养

- D、血培养
- E、肺功能检查

答案：D

48、哮喘持续状态,是指严重哮喘持续时间达()

- A、6 小时
- B、10 小时
- C、24 小时
- D、48 小时
- E、12 小时

答案：C

49、陈女士,56 岁,深静脉血栓抗凝治疗期间,测得凝血时间 22 分钟,有轻度牙龈出血的护理措施最恰当的是()

- A、减少抗凝药物剂量
- B、请示医师调整用量
- C、维持原用药剂量
- D、立即停止用药
- E、鼓励病人下地活动

答案：B

50、侯先生,41 岁,乙肝史 10 余年,近来自觉右上腹胀痛,首选的检查是()

- A、MRI
- B、腹腔镜
- C、肝动脉造影
- D、核素肝扫描
- E、超声检查

答案：E

51、指导出院后继续服药的患者应该()服药

- A、.按时、正确、安全
- B、.按时、足量、正确
- C、.按时、足量、全程
- D、.规律、全程、足量
- E、.根据不适随时调节

答案：A

52、青年患者左膝半月板损伤 1 年。反复疼痛,关节肿胀,最合理的治疗方法为

- A、常规半月板切除术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/558030047060006035>