

传染病学(医学高级)：败血症测试模拟考试卷

考试时间：120 分钟

考试总分：100 分

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试成绩公正。

1、单项选择题

革兰阴性杆菌败血症常见的原发病灶是()A . 泌尿生殖道、胆道、肠道

B . 皮肤疖痈

C . 呼吸道

D . 中耳

E . 口腔黏膜

本题答案：

2、单项选择题

关于败血症的病原治疗原则，错误的是()A . 尽量选用杀菌药物

B . 尽早应用杀菌药物

C . 剂量宜大，疗程宜长，一般为 3~4 周

D . 联合应用 3 种以上的抗菌药物，并注意药物间的配伍禁忌

E . 尽量静脉途径给药

本题答案：

3、名词解释

菌血症

本题答案：

4、单项选择题

下列哪种细菌所致的败血症较易引起 DIC()A . 大肠埃希菌

B . 金葡菌

C . 厌氧菌

线

学

级

名

密

D . 真菌

E . 铜绿假单胞菌

本题答案：

5、单项选择题

败血症的毒血症症状主要为()A . 寒战、高热，可有出汗，但出汗后症状不缓解

B . 乏力、头痛，意识障碍

C . 不思饮食、恶心、呕吐

D . 脉率和呼吸均加速

E . 可出现中毒性脑病等

本题答案：

6、问答题

张，女，60岁，畏寒、发热10天，于2004年8月2日就诊。体格检查：脾大。血常规：WBC4.510/L，N0.68。

若进一步检查发现皮肤有瘀点，是否更正上述诊断?应进一步做何检查以帮助诊断?

本题答案：

7、填空题

可以引起败血症病人出现早期感染性休克的细菌类别是_____。

本题答案：

8、多项选择题

伤寒与革兰阴性杆菌败血症的不同点有()A . 可有特殊的中枢神经系统中毒症状

B . 皮疹为玫瑰疹

C . 可有肝脾大

D . 不易发生感染性休克

E . 热程多为短程发热

本题答案：

9、单项选择题

败血症与变应性亚败血症的鉴别下列哪项最重要()A . 发热高低

B . 皮疹有无

- C . 激素治疗是否有效
- D . C 反应蛋白阳性
- E . 抗菌药物治疗是否有效

本题答案：

10、多项选择题

革兰阴性杆菌败血症的临床特点有()A . 原发病灶以泌尿生殖道、胆道、肠道多见

- B . 可有高热，亦可体温不升
- C . 迁徙性病灶少见，而相对缓脉、双峰热相对较多见
- D . 可有 DIC 和感染性休克
- E . 易出现猩红热样皮疹

本题答案：

11、问答题

疑似败血症病人做病原学检查时应注意哪些事项?

本题答案：

12、判断题

由于高效抗菌药物应用于临床，败血症发病率和死亡率已很低

本题答案：

13、配伍题

治疗绿脓杆菌败血症首选()

治疗肠球菌败血症首选()

治疗厌氧菌首选()

治疗真菌败血症首选()A . 甲硝唑

- B . 两性霉素 B
- C . 哌拉西林+氨基糖甙类
- D . 青霉素(氨苄青霉素)+氨基糖甙类
- E . 头孢他啶

本题答案：

14、单项选择题

下列哪项不是厌氧菌败血症的特点()A . 婴幼儿发病率高

B . 入侵途径以胃肠道及女性生殖道为主

- C . 易并发血栓性静脉炎及迁徙性脓肿
- D . 易并发肺炎
- E . 黄疸少见

本题答案：

15、单项选择题

下列哪项是金葡菌败血症的主要临床特点()A . 皮肤瘀点

- B . 迁徙性损害
- C . 双峰热
- D . 易并发心内膜炎
- E . 持续高热

本题答案：

16、判断题

败血症患者做血培养检查时每次采血量年长儿和成人应达 10ml 以上

本题答案：

17、单项选择题

女，40 岁，干部，突起畏寒、寒战、高热 6 小时，呼吸急促、烦躁不安 2 小时入院。体查：体温 40.8℃，血压 94/83mmHg，神志清楚，四肢厥冷，口唇和甲床轻度发绀

该患者应立即进行下列处理，除外()A . 先补平衡盐液

- B . 继之或同时另一路补低分子右旋糖酐
- C . 特殊情况下可给予输血浆或白蛋白
- D . 明显酸中毒时补 5%碳酸氢钠
- E . 20%甘露醇与速尿交替使用利尿

本题答案：

18、填空题

MRSA 及 MRSE 败血症病原治疗首选____、_____。

本题答案：

19、问答题

王，男，30 岁。因持续发热 15 天，巩膜黄染 3 天，便血、神志不清 1 天于 2003 年 6 月 3 日急诊入院。

病人于 5 月 14 日开始感觉腹痛、腹泻，1~3 次/天；伴发热、畏寒、寒战。在

当地疑为感冒予对症处理后体温降至正常。次日又高热，同时可见少量皮疹，有瘙痒感。血常规 WBC4.2109/L，N0.80，L0.17，E0.03，17日到县医院就诊，查体 BP80/50mmHg，大、小便正常，肥达反应 H1：80、O1：160、A1:40，B(-)。3天前发现巩膜轻度黄染，肝功能 TBIL160mmol/L、ALT62u/L。因发热不退，使用激素降温和控制中毒症状。化验检查 HsAg(+)、HBeAg(+)、抗-HBcIgM(+)。29日突然躁动不安，不认识亲人，解黑便约300ml。查体：颈稍有抵抗感，血压有所下降；腰穿 CSF 压力 80mmHg，潘迪试验(+)，糖 2.0mmol/L，细胞数 1400106/L，WBC8106/L，墨汁染色(-)。因诊断不明及便血转来我院。体格检查：T39℃，P126次/分，R30次/分，BP90/60mmHg 急性重病容，神志欠清，皮肤注射处可见紫癜，巩膜轻度黄染。颈稍有抵抗感，右下肺可闻及少许湿啰音，肝、脾肋下 0.5cm，腹水征(-)，肠鸣音减弱。血常规：Hb80g/L，WBC5.4109/L，N0.76，L0.24，PLT40109/L。尿常规：清亮，Pro(+)，糖(+)，镜检(-)，尿双胆(+)。大便常规：镜检 WBC0~3个/HP，RBC(+++)~(+++)/HP，OB(+++)。胸透：无异常。

该病人的诊断及诊断依据是什么？

本题答案：

20、多项选择题

- 治疗败血症抗菌药物的使用原则正确的是()
- A . 早期、足量、杀菌剂为主
 - B . 一般用 2 种药物联合治疗
 - C . 治疗败血症的疗程一般不少于 3 周
 - D . 病原菌未明确前暂不进行抗菌药物治疗
 - E . 根据细菌培养及药敏试验及时调整抗菌药物

本题答案：

21、多项选择题

- 金葡菌败血症的临床特点有()
- A . 迁徙性脓肿
 - B . 男性青壮年多见
 - C . 原发病灶以皮肤疖肿等多见
 - D . 皮疹为多形性，以坏死性皮疹多见
 - E . 感染性休克少见

本题答案：

22、单项选择题

容易并发细菌性心内膜炎的败血症为()A . 肠球菌败血症

B . 革兰阴性杆菌败血症

C . 金葡菌败血症

D . 厌氧菌败血症

E . 表皮葡萄球菌

本题答案：

23、单项选择题

有 | 本题答案：

26、判断题

所有败血症患者白细胞总数均升高

本题答案：

27、问答题

刘，男，25岁，农民，因持续畏寒、发热14天，于2006年8月4日入院。病人自诉6月1日突起畏寒、寒战、发热，体温波动在37.8~39.9℃，伴有全身不适、头痛、肌肉酸痛、咳嗽、食欲不振、乏力等症状，起病第3天到当地医院就诊。体格检查：T39.2℃，P102次/分，R26次/分；Bp100/75mmHg神清合作，全身皮肤可见弥漫性红色皮疹，压之褪色；全身浅表淋巴结未触及肿大，皮肤巩膜无黄染；心率102次/分，心尖区可闻及1~2级吹风样杂音；左下肺可闻及少许湿啰音，腹平软，肝未扪及；脾左肋下0.5cm，质软，边锐，有触痛；右臀部可见一3cm4cm大小的脓肿。血常规：WBC11109/L，N0.89。小便常规：WBC0~1(+)/HP。蛋白(++)。肝功能：ALT87.8U/L，GLO32.4g/L，TBIL19.3mmol/L。肥达反应：H1:40，O1:80，A1:40，B1:40。经用青霉素320万U，庆大霉素(24万U/d)治疗5天，疗效不显，后改用菌必治(国产，2g/d)和林可霉素(1.2g/d)治疗5天效果欠佳，症状逐渐加重，出现黄疸、肝大，B超检查发现肝内有多发直径10~20mm的低密度灶。

该病人进一步应做哪些检查?理原则如何(含选用何种抗菌药物)?

本题答案：

28、问答题

试述革兰阳性球菌败血症与革兰阴性杆菌败血症的鉴别要点。

本题答案：

29、填空题

败血症的主要临床表现有____、____、____、____、____。

本题答案：

30、单项选择题

厌氧菌败血症常见的致病菌是()A . 脆弱类杆菌

B . 梭状芽胞杆菌

C . 白假丝酵母菌

D . 双歧杆菌

E . 消化链球菌

本题答案：

31、名词解释

败血症

本题答案：

32、单项选择题

革兰阳性败血症，哪项最具有临床诊断参考价值()A . 近有皮肤感染，呼吸道感染

B . 时间长

C . 肝脾肿大

D . 病程中出现迁徙病灶，脑脓肿、肝脓肿

E . WBC 升高，N 升高

本题答案：

33、单项选择题

有关真菌败血症下列哪项错误()A . 以白假丝酵母菌为多见

B . 常见于长期应用广谱抗菌药物者

C . 大多为医院内感染

D . 长期应用激素患者多见

E . 男性青壮年多见

本题答案：

34、单项选择题

人体对各种损害因素所引起的全身性炎症反应称()A . 败血症

B . AIDS

C . ARDS

D . 毒血症

E . SIRS

本题答案：

35、名词解释

SIRS

本题答案：

36、填空题

迁徙性损害系由细菌栓子播散至身体其他部位引起，多见于___与___所致的败血症。

本题答案：

37、单项选择题

有关败血症与伤寒的鉴别下列哪项最重要()A . 有无表情淡漠、反应迟钝等特殊中枢神经系统中毒症状

B . 血常规中白细胞计数及中性粒细胞高低

C . 有无皮疹

D . 有无体温正常

E . 有无早期感染性休克

本题答案：

38、多项选择题

关于老年人败血症正确的有()A . 多继发于肺部感染

B . 易并发心内膜炎

C . 由褥疮入侵者少见

D . 预后差

E . 致病菌以革兰阳性球菌多见

本题答案：

39、多项选择题

败血症发病机制中的细菌因素有()A . 金葡菌可产生多种酶和毒素，引起严重的败血症和脓毒血症

B . 大肠埃希菌产生的内毒素损伤血管内皮细胞，激活各种细胞因子，导致微循环障碍

- C . 细菌的繁殖速度快
- D . 细菌荚膜有抗吞噬作用
- E . 细菌在自然界中有顽强的生存能力

本题答案：

40、单项选择题

医院内感染败血症最常见的致病菌为()A . 肺炎链球菌

- B . 白色念珠球菌
- C . 链球菌
- D . 厌氧菌
- E . 大肠埃希菌

本题答案：

41、单项选择题

败血症一经临床诊断，在未获得病原学结果之前下列哪项处理最重要()A .

维持水、电解质和酸碱平衡

- B . 选用适当的抗菌药物
- C . 处理局部病灶
- D . 应用肾上腺皮质激素
- E . 对症治疗

本题答案：

42、单项选择题

下列哪项不是变应性亚败血症的临床特点()A . 发热较高，但无明显毒血症症状

- B . 血常规中白细胞计数和中性粒细胞明显升高
- C . 血培养阳性
- D . 抗菌药物治疗无效
- E . 血沉增快，C 反应蛋白阳性

本题答案：

43、填空题

机体反应较差者及少数革兰阴性杆菌败血症患者的白细胞总数可正常或偏低，但__仍增多。

本题答案：

44、单项选择题

- 复数菌败血症是指()
- A . 毒血症症状比一般的败血症病人重 2 倍
 - B . 两人以上同时感染同一种细菌
 - C . 同一份血标本检出 2 种以上的细菌或 72 小时内不同血标本检出 2 种以上细菌
 - D . 同一份血标本检出 3 种以上的细菌或 72 小时内不同血标本检出 3 种以上细菌
 - E . 两人以上同时感染 2 种以上病菌

本题答案：

45、问答题

王，男，30 岁。因持续发热 15 天，巩膜黄染 3 天，便血、神志不清 1 天于 2003 年 6 月 3 日急诊入院。

病人于 5 月 14 日开始感觉腹痛、腹泻，1~3 次/天；伴发热、畏寒、寒战。在当地疑为感冒予对症处理后体温降至正常。次日又高热，同时可见少量皮疹，有瘙痒感。血常规 WBC4.2109/L，N0.80，L0.17，E0.03，17 日到县医院就诊，查体 BP80/50mmHg，大、小便正常，肥达反应 H1：80、O1：160、A1:40，B(-)。3 天前发现巩膜轻度黄染，肝功能 TBIL160mmol/L、ALT62u/L。因发热不退，使用激素降温和控制中毒症状。化验检查 HsAg(+)、HBeAg(+)、抗-HBcIgM(+)。29 日突然躁动不安，不认识亲人，解黑便约 300ml。查体：颈稍有抵抗感，血压有所下降；腰穿 CSF 压力 80mmHg，潘迪试验(+)，糖 2.0mmol/L，细胞数 1400106/L，WBC8106/L，墨汁染色(-)。因诊断不明及便血转来我院。体格检查：T39℃，P126 次/分，R30 次/分，BP90/60mmHg 急性重病容，神志欠清，皮肤注射处可见紫癜，巩膜轻度黄染。颈稍有抵抗感，右下肺可闻及少许湿啰音，肝、脾肋下 0.5cm，腹水征(-)，肠鸣音减弱。血常规：Hb80g/L，WBC5.4109/L，N0.76，L0.24，PLT40109/L。尿常规：清亮，Pro(+)，糖(+)，镜检(-)，尿双胆(+)。大便常规：镜检 WBC0~3 个/HP，RBC(+++)~(+++)/HP，OB(+++)。胸透：无异常。

该病人应进一步做何检查？

本题答案：

46、单项选择题

男，60 岁，因持续畏寒、发热 15 天入院，伴有头痛、关节痛。入院时体格检

查：T39℃，BP100/70mmHg；神清合作，未见皮疹；心率105次/分，律齐，未闻及杂音；右下肺可闻及湿啰音，腹平软；肝右肋下1.5cm，质软，有触痛；脾左肋下2.0cm，质软，边锐，有触痛。血常规：WBC18109/L，N0.89。胸片：右下肺发现浸润性病灶。

准备为上述病例做的下列进一步检查中，哪项的诊断意义最大()A．胸部X线检查

B．肥达反应

C．骨髓涂片

D．血培养

E．痰菌培养

本题答案：

47、填空题

疑似败血症病人做病原学检查时，每次采血量新生儿和婴儿不少于_____ml，年长儿和成人不少于_____ml。

本题答案：

48、单项选择题

有关新生儿败血症的临床特点下列哪项不正确()A．多由母亲产道感染

B．主要病原菌为大肠埃希菌和B型溶血性链球菌

C．主要临床表现为纳差、呕吐、精神萎靡等

D．可并发中枢神经系统感染

E．大多数患儿有发热

本题答案：

49、名词解释

复数菌败血症

本题答案：

50、多项选择题

金葡菌败血症的特征()A．原发病灶以皮肤黏膜及呼吸道感染为主

B．急性起病，寒战、高热

C．关节症状明显，皮疹形态多样化，易发生迁徙病灶

D．感染性休克较少见

E．并发心内膜炎机率较高

本题答案：

51、单项选择题

烧伤后败血症最常见的致病菌是()A . 金葡菌和铜绿假单胞菌

B . 金葡菌和大肠埃希菌

C . 表葡菌和变形杆菌

D . 大肠埃希菌和变形芽胞杆菌

E . 铜绿假单胞菌和厌氧菌

本题答案：

52、填空题

变应性亚败血症与败血症不同点在于_____、_____、_____、_____、
_____、_____。

本题答案：

53、问答题

刘，男，25岁，农民，因持续畏寒、发热14天，于2006年8月4日入院。病人自诉6月1日突起畏寒、寒战、发热，体温波动在37.8~39.9℃，伴有全身不适、头痛、肌肉酸痛、咳嗽、食欲不振、乏力等症状，起病第3天到当地医院就诊。体格检查：T39.2℃，P102次/分，R26次/分；Bp100/75mmHg神清合作，全身皮肤可见弥漫性红色皮疹，压之褪色；全身浅表淋巴结未触及肿大，皮肤巩膜无黄染；心率102次/分，心尖区可闻及1~2级吹风样杂音；左下肺可闻及少许湿啰音，腹平软，肝未扪及；脾左肋下0.5cm，质软，边锐，有触痛；右臀部可见一3cm4cm大小的脓肿。血常规：WBC11109/L，N0.89。小便常规：WBC0~1(+)/HP。蛋白(++)。肝功能：ALT87.8U/L，GLO32.4g/L，TBIL19.3mmol/L。肥达反应：H1：40，O1：80，A1：40，B1：40。经用青霉素320万U，庆大霉素(24万U/d)治疗5天，疗效不显，后改用菌必治(国产，2g/d)和林可霉素(1.2g/d)治疗5天效果欠佳，症状逐渐加重，出现黄疸、肝大，B超检查发现肝内有多个直径10~20mm的低密度灶。

该病人最有可能的诊断及诊断依据是什么?应与哪些疾病鉴别?

本题答案：

54、单项选择题

病原体在机体某一局部生长繁殖，产生毒素和代谢产物侵入血流所引起全身性

感染称()A . 败血症

B . 菌血症

C . 脓毒血症

D . 毒血症

E . SIRS

本题答案：

55、问答题

张，女，60岁，畏寒、发热10天，于2004年8月2日就诊。体格检查：脾大。血常规：WBC $4.5 \times 10^9/L$ ，N0.68。

该病人的诊断应考虑哪几种疾病?询问病史时应注意哪些问题?

本题答案：

56、问答题

王，男，30岁。因持续发热15天，巩膜黄染3天，便血、神志不清1天于2003年6月3日急诊入院。

病人于5月14日开始感觉腹痛、腹泻，1~3次/天；伴发热、畏寒、寒战。在当地疑为感冒予对症处理后体温降至正常。次日又高热，同时可见少量皮疹，有瘙痒感。血常规 WBC $4.2 \times 10^9/L$ ，N0.80，L0.17，E0.03，17日到县医院就诊，查体 BP80/50mmHg，大、小便正常，肥达反应 H1：80、O1：160、A1:40，B(-)。3天前发现巩膜轻度黄染，肝功能 TBIL $160 \mu\text{mol/L}$ 、ALT 62u/L 。因发热不退，使用激素降温和控制中毒症状。化验检查 HsAg(+)、HBeAg(+)、抗-HBcIgM(+)。29日突然躁动不安，不认识亲人，解黑便约300ml。查体：颈稍有抵抗感，血压有所下降；腰穿CSF压力80mmHg，潘迪试验(+)，糖 2.0mmol/L ，细胞数 $1400/10^6/L$ ，WBC $8/10^6/L$ ，墨汁染色(-)。因诊断不明及便血转来我院。体格检查：T 39°C ，P126次/分，R30次/分，BP90/60mmHg急性重病容，神志欠清，皮肤注射处可见紫癜，巩膜轻度黄染。颈稍有抵抗感，右下肺可闻及少许湿啰音，肝、脾肋下0.5cm，腹水征(-)，肠鸣音减弱。血常规：Hb 80g/L ，WBC $5.4 \times 10^9/L$ ，N0.76，L0.24，PLT $40 \times 10^9/L$ 。尿常规：清亮，Pro(+)，糖(+)，镜检(-)，尿双胆(+)。大便常规：镜检 WBC0~3个/HP，RBC(++~+++)/HP，OB(++)。胸透：无异常。

简述该病人的治疗原则。

本题答案：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/576011052052010103>