

三基三严模考试题含答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 与建的动力平衡无关的为

- A、内外的动力
- B、左右的动力
- C、上下的动力
- D、向前的动力
- E、向后的动力

正确答案：B

2. 关于手外伤的清创，下列哪项是错误的（ ）

- A、先冲洗伤口周围，然后再冲洗伤口
- B、掌深、浅动脉弓同时受损时，可不必修复，因手部血运丰富
- C、清创应从伤口的一侧至另一侧，由浅入深
- D、骨折和脱位宜一期修复，肌腱和神经损伤可二期修复
- E、最好在止血带控制下清创

正确答案：B

3. 若无感染征象时，血管导管不宜常规更换，不应当为预防感染而定期更换中心静脉导管、肺动脉导管和脐带血管导管。成人外周静脉导管（ ）天更换一次；儿童及婴幼儿使用前评估导管功能正常且无感染时可不更换。

- A、2-3
- B、3-4
- C、4-5
- D、1-2

正确答案：B

4. 保存温度对血小板活性影响很大，适宜温度为（ ）

- A、 $20^{\circ}\text{C}\sim 24^{\circ}\text{C}$
- B、 $18^{\circ}\text{C}\sim 22^{\circ}\text{C}$
- C、 $4^{\circ}\text{C}\sim 6^{\circ}\text{C}$
- D、 $8^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$
- E、室温

正确答案：A

5. 病理反射的出现是由于（ ）

- A、基底节受损
- B、神经系统兴奋性增高
- C、脑干网状结构损害
- D、锥体束受损
- E、脊髓反射弧的损害

正确答案：D

6. 膀胱三角的标志为()

- A、输尿管间壁与膀胱尖之间
- B、尿道内口与膀胱底之间
- C、尿道内口与两输尿管口之间
- D、两输尿管口与膀胱尖之间
- E、尿道内口与膀胱尖之间

正确答案：C

7. 胃底腺主细胞分泌()

- A、胃蛋白酶原
- B、胃蛋白酶原和内因子
- C、内因子
- D、胃蛋白酶
- E、胃蛋白酶和内因子

正确答案：A

8. 新生儿感染主要传播途径是()?

- A、飞沫传播
- B、空气传播
- C、粪口-传播
- D、接触传播

正确答案：D

9. 开放性骨折清创术中哪项处理是错误的()

- A、彻底切除失去活力的筋膜、肌肉和肌腱
- B、彻底清除大小游离碎骨片
- C、保留与骨膜和软组织有联系的小骨片
- D、对仍有血液供应的皮肤,只切除1~2 mm的污染区
- E、若皮肤剥离面广,应将表面皮肤切开,显露皮下创腔或隧道

正确答案：B

10. 普鲁卡因青霉素之所以能长效,是因为()

- A、加进了增效剂
- B、抑制排泄
- C、减慢了吸收
- D、改变了青霉素的化学结构
- E、延缓分解

正确答案: C

11. 肾单位的组成是:()

- A、肾小球和集合小管
- B、肾小体、肾小管和集合小管
- C、肾小体、近端小管和远端小管
- D、肾小球、肾小囊和肾小管
- E、肾小球和肾小管

正确答案: E

12. 男,30岁,自7m高处坠下,腹痛,半小时后送来急诊室就医。体格检查:面色苍白,脉搏120次/min且弱,血压60/40 mmHg。为明确有无内脏损伤,首先应进行哪项检查()

- A、胸、腹部X线摄片
- B、腹部B超
- C、腹部CT
- D、诊断性腹腔穿刺
- E、血常规

正确答案: D

13. 冠内固位形不包括()

- A、针形
- B、鸠尾形
- C、片切型
- D、箱状形
- E、沟形

正确答案: C

14. 治疗耐青霉素G的金黄色葡萄球菌败血症,可首选()

- A、羧苄西林
- B、氨苄西林

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/576101144235011005>