

2022 护士职业资格证考试《专业实务》真题模拟试题 含答案

考试须知：

- 1、考试时间：120 分钟，本卷满分为 380 分。
- 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。
- 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

姓名：_____

考号：_____

得分	评卷人
	A1 型题（本题共 50 题，每小题 3 分，共 150 分）

1、高热时酒精擦浴其散热方式为（ ）。

- A、辐射
- B、对流
- C、蒸发
- D、传导
- E、接触

2、现有95%乙醇500ml，要配制70%乙醇，需加入灭菌馏水（ ）。

- A、155ml
- B、165ml
- C、178ml
- D、185ml
- E、195ml

3、患者男，22岁。手术后麻醉未清醒，手足厥冷，全身发抖，欲用热水袋取暖，下列操作方法，不恰当的是（ ）。

- A. 热水袋水温应控制在60° C以内

B. 热水袋套外再包裹大毛巾

C. 密切观察局部皮肤颜色

D. 及时更换热水

E. 交接班时应着重交代

4、子宫内膜异位症患者卵巢病变最常见的类型是（ ）。

A. 卵巢恶性肿瘤

B. 卵巢黄体囊肿

C. 卵巢滤泡囊肿

D. 卵巢炎性包块

E. 卵巢巧克力囊肿

5、为急性胰腺炎患者解痉镇痛时，不能使用的药品是（ ）。

A. 山莨菪碱

B. 吗啡

C. 阿托品

D. 哌替啶

E. 溴丙胺太林

6、哮喘发生的本质是（ ）。

A. 交感神经兴奋

B. 迷走神经兴奋

C. 气道反应性降低

D. 免疫介导气道慢性炎症

E. β -肾上腺素受体功能低下

7、纤维内窥镜的消毒灭菌宜用（ ）。

A. 酒精浸泡法

B. 戊二醛浸泡法

C、紫外线照射法

D、高压蒸汽灭菌法

E、煮沸法

8、患者经抗炎、利尿、强心治疗后，体温降至正常，可平卧，现改用地高辛口服，护士给药时特别注意()。

A. 应饭后服药

B. 应空腹服药

C. 应准时服药

D. 用药前测脉率

E. 服药后少饮水

9、抽取测定血钾的标本应置于()。

A、石蜡油试管

B、普通抗凝管

C、胆汁培养基

D、肝素抗凝管

E、干燥清洁试管

10、扩张型心肌病病人心脏结构最基本的改变是()。

A、室间隔肥厚

B、心室容积减少

C、单侧或双侧心腔扩大

D、左心室肥厚

E、右心室流出道梗阻

11、乙脑的主要传播媒介是()。

A. 家禽

B. 家猪

C. 蚊虫

D. 跳蚤

E. 水源

12、妊娠期患者出现咯血应禁用的止血药是（ ）。

A. 肾上腺素

B. 垂体后叶素

C. 维生素

D. 酚磺乙胺(止血敏)

E. 氨基乙酸

13、已被肯定可致白血病的化学物质是（ ）。

A. 氯霉素

B. 保泰松

C. 烷化剂

D. 细胞毒药物

E. 苯及其衍生物

14、溃疡性结肠炎病人主要的症状是（ ）。

A. 高热

B. 腹泻

C. 关节痛

D. 呕吐

E. 腹胀

15、以工作为中心进行岗位分工称为（ ）。

A. 功能制护理

B. 小组护理

C. 责任制护理

D. 整体护理

E. 个案护理

16、使用冰槽时，为防止冻伤需保护的部位是（ ）。

A、前额

B、颞部

C、头顶

D、耳部

E、面颊

17、护士护理危重症患者时，首先观察（ ）。

A. 生命体征及瞳孔变化

B. 意识状态的改变

C. 有无脱水、酸中毒

D. 肢体活动情况

E. 排尿排便情况

18、临终患者最后丧失的感觉是（ ）。

A、视觉

B、嗅觉

C、味觉

D、听觉

E、触觉

19、中医饮食上五味指的是（ ）。

A、酸、苦、甘、辛、咸

B、酸、苦、甘、甜、涩

C、酸、苦、麻、辣、涩

D、甜、辣、苦、涩、咸

E. 甜、辣、苦、酸、辛

20、关于侵蚀性葡萄胎的叙述，正确的是（ ）。

A. 多继发于人工流产术后

B. 转移灶最常见的部位是肺部

C. 肺部声称灶表现为紫蓝色结节

D. 最主要的症状是停经后阴道出血

E. 侵蚀性葡萄胎是一种良性滋养细胞疾病

21、关于腹股沟直疝，下列哪一项是错误的（ ）。

A. 多见于老人

B. 疝块由直疝三角突出，不进入阴囊

C. 疝块呈半球形，基底较宽

D. 回纳疝块后压迫内环，疝块仍可出现

E. 疝囊颈位于腹壁下动脉的外侧

22、冠状动脉发生粥样硬化易患因素(或危险因素)中不妥的是（ ）。

A. 高血压

B. 高脂血症

C. 吸烟

D. 糖尿病

E. 与苯接触

23、新生儿寒冷损伤综合征最突出的表（ ）。

A. 反应低下

B. 心音低钝

C. 低体温

D. 哭声弱

E. 拒乳

24、下列药物过敏实验的皮试液浓度正确的是()。

A、青霉素:500U/0.1ml

B、链霉素: 2500U/0.1ml

C、普鲁卡因: 0.25mg/0.1ml

D、细胞色素C: 0.75mg/0.1ml

E、破伤风抗毒素: 150IU/0.1ml

25、使用红外线烤灯时,错误的操作是()。

A、对病人的情况进行评估

B、暴露治疗部位

C、灯距为20-30cm

D、时间为20-30min

E、注意观察病人反应

26、一个患者想去买东西,走到街上,突然发现人很拥挤,认为这预示着自己要大难临头。确切地说这种症状是()。

A. 关系妄想

B. 被害妄想

C. 象征性思维

D. 原发性妄想

E. 特殊意义妄想

27、属于传染病预防措施的是()。

A、计划免疫

B、封锁疫区

C、环境消毒

D、限制集会

E、停工停课

28、婴幼儿易患上呼吸道感染的因素主要是（ ）。

- A. 居室拥挤
- B. 免疫特点
- C. 护理不当
- D. 疾病影响
- E. 冷热失调

29、分泌碱性粘液，保护胃黏膜的细胞是（ ）。

- A. 胃主细胞
- B. 胃黏液细胞
- C. 胃腺壁细胞
- D. 胃窦部G细胞
- E. 胃壁平滑肌细胞

30、某患者，心电监测时，心电监护仪突然显示完全不规则波浪形曲线，无QRS波与T波，以下判断错误的是（ ）。

- A. 病人发生室颤
- B. 立即静脉推注利多卡因
- C. 施行非同步电复律
- D. 立即进行心肺复苏
- E. 病人发生猝死，无抢救意义

31、水痘患者出疹的顺序是（ ）。

- A. 斑疹、丘疹、疱疹、脓疱、结痂
- B. 丘疹、斑疹、疱疹、脓疱、结痂
- C. 疱疹、斑疹、丘疹、脓疱、结痂
- D. 丘疹、疱疹、斑疹、脓疱、结痂
- E. 斑疹、疱疹、丘疹、脓疱、结痂

32、某医院有两位 等待肾移植的患者，其中一位患者是25岁青年农民，因外伤致双肾破裂。另一位患者是因长期肾炎而至肾衰竭的65岁教授。现只有一个可供27. 医务人员进行决策时考虑的标准不包括（ ）。

- A. 年龄
- B. 预期寿命
- C. 免疫相容性
- D. 身体的整体功能
- E. 患者的社会地位

33、某护生在一所二级甲等医院完成毕业实习后，但未通过护士执业资格考试。护理部考虑其平时无护理差错，且普外科护士严重短缺，因此聘用其任普外科护士。护理部的做法违反的是（ ）。

- A. 护士条例
- B. 侵权责任法
- C. 民法通则
- D. 医疗机构管理办法
- E. 医疗事故处理条例

34、关于腹股沟直疝，下列哪一项说法是正确的（ ）。

- A. 多见于青壮年男性
- B. 多为单侧，右侧较左侧多见
- C. 疝内容物可进入阴囊
- D. 疝块位于腹股沟韧带上方
- E. 还纳后压迫内环，不能阻止疝突出

35、关于社区开展预防一氧化碳中毒的健康教育，正确的叙述是（ ）。

- A. 关闭门窗
- B. 定期检查管道安全
- C. 使用不带有自动熄火装置的煤灶

D. 通气开关可长期开放

36、关于腹外疝的叙述下列哪项是不正确的()。

A. 腹壁存在薄弱环节或缺损

B. 疝内容物是腹腔脏器

C. 疝内容物一定向体表突出

D. 疝囊是腹膜壁层的一部分

E. 疝外被盖是指疝囊外的筋膜组织和肌肉，不包括皮下组织及皮肤

37、“120”接诊了一名车祸致昏迷的患者，脑部CT提示颅内大量出血，需立刻行开颅手术。患者无亲属陪伴，也无证实其身份和联系人的信息，依据《侵权责任法》的规定，术前正确的做法是()。

A、通知手术室准备手术

B、报告派出所寻找家属

C、报告科室负责人获批

D、报告医院负责人获批

E、报告卫生行政部门负责人获批

38、选择抗生素最理想的依据是()。

A. 脓液的性质

B. 细菌的种类

C. 细菌药敏试验

D. 感染的严重程度

E. 药物的抗菌谱

39、老年人血管变化的特点是()。

A. 脉压降低

B. 收缩压升高

C. 主动脉壁变薄

D. 周围动脉壁变薄

E. 血管软化程度增加

40、下列可以测量口腔温度的是()。

A. 腹泻

B. 新生儿

C. 精神障碍患者

D. 昏迷

E. 扁桃体术后

41、某失血性休克患者快速输入全血1200ml后出现手足抽搐、皮肤黏膜出血、血压下降、心率减慢，该患者可能发生()。

A. 溶血反应

B. 过敏反应

C. 发热反应

D. 枸橼酸钠中毒反应

E. 心脏负荷过重

42、护士从事护理活动唯一合法的法律文书是()。

A. 《护士条例》

B. 护士执业证书

C. 护理或助产专业毕业证书

D. 《护士管理办法》

E. 医疗事故处理条例

43、肺结核最主要的传播途径是()。

A. 呼吸道传播

B. 消化道传播

C. 皮肤黏膜传播

D. 泌尿道传播

E. 生殖道传播

44、对急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的病情判断最有意义的检查是()。

A. X线胸片

B. 动脉血气分析

C. 血常规检查

D. 胸部CT检查

E. 肺功能检查

45、属于气体杀菌剂的是()。

A. 37%~40%甲醛

B. 环氧乙烷

C. 过氧乙酸

D. 戊二醛

E. 乙醇

46、吸气时出现脉搏显著减弱或消失的现象可见于()。

A. 主动脉瓣关闭不全

B. 心包积液

C. 右心衰竭

D. 冠心病

E. 房室传导阻滞

47、患者女，10岁。发热4天，伴有咳嗽，全腹疼痛。查体：体温38~39℃，右下肺有湿罗音，全腹轻度腹胀，腹肌紧张，压痛，反跳痛，肠鸣音减弱。腹腔穿刺抽出保无臭味脓汁。诊断为腹部感染合并原发性腹膜炎。该患儿腹腔脓液涂片镜检最有可能检出的致病菌是()。

A. 溶血性链球菌

B. 金黄色葡萄球菌

C. 大肠杆菌

D. 变形杆菌

E. 厌氧类杆菌

48、门静脉系与腔静脉系之间最主要的交通支是（ ）。

A. 直肠下段肛管交通支

B. 前腹壁交通支

C. 腹膜后交通支

D. 胃底、食管下段交通支

E. 肠系膜交通支

49、贯穿于护理活动全过程的是（ ）。

A. 护理活动和护理诊断

B. 护理诊断和护理计划

C. 护理计划和护理评价

D. 护理诊断和护理评价

E. 护理评估和护理评价

50、糖皮质激素用于治疗哮喘的主要作用是（ ）。

A、降低痰液黏稠度

B、抑制气道炎症反应

C、舒张支气管平滑肌

D、抑制咳嗽中枢

E、兴奋呼吸中枢

得分	评卷人

A2 型题（本题共 50 题，每小题 3 份，共 150 分）

1、患者，男性，37岁。1年前因外伤性肠穿孔行肠切除加肠吻合术，半年后出现切口疝，最可能的原因是（ ）。

A. 术后并发肠痿

B. 术后曾有腹腔内感染

C. 早期活动

D. 曾有切口感染

E. 前列腺肥大

2、某护士大专毕业，工作3年，刚刚晋升护师。在临床努力工作，护士长在工作中有时检查她的工作，给予她一些建议和指导，同时也信任和尊重她。针对这种具有初步成熟度的护士，护士长对该护士的领导行为应采取的是（ ）。

A. 高工作与低关系

B. 高工作与高关系

C. 低工作与高关系

D. 低工作与低关系

E. 亲密型关系

3、患者男，63岁，慢性胃炎，幽门螺杆菌（+），需要采用抗菌药物治疗，其用药原则是：（ ）。

A. 剂量宜大

B. 宜静脉给药

C. 联合用药

D. 宜长期使用

E. 药物种类不受限制

4、某产妇，30岁，妊娠足月分娩，胎盘娩出后，阴道出血多，子宫软，按摩后子宫变硬，流血停止。此阴道流血的原因可能是（ ）。

A. 胎膜残留

B. 子宫收缩乏力

C. 软产道损伤

D. 凝血功能障碍

E. 子宫血管高度扩张

5、患者男，58岁。冠心病史6年，因心绞痛急诊入院。患者情绪紧张，主诉乏力，食散不振。医嘱：药物治疗，绝对卧床休息。护士评估患者存在的健康问题，需要首先解决的是（ ）。

A. 焦虑

B. 生活自理缺陷

C. 疲乏

D. 疼痛

E. 便秘

6、患者男性，65岁，因上呼吸道感染入院，经医生同意可以出院。出院护理错误的一项是（ ）。

A. 征求患者意见

B. 热情护送出院

C. 协助办理出院手续

D. 介绍出院后有关注事项

E. 停止注射，继续服用口服药

7、患者女性，37岁，静脉留置套管针第3天，今晨输液液体滴入不畅，局部无肿胀，检查有回血，护士首先应（ ）。

A. 盐水或肝素钠冲管

B. 更换针头重新穿刺

C. 减慢输液速度

D. 输液静脉上方热敷

E. 检查管道，抬高输液瓶位置

8、患者男，28岁，患支气管哮喘。经常入睡后发作，患者白天没有精力工作，每到晚上就害怕病情发作，甚至危及生命，惶惶不可终日。该患者最主要的心理反应是（ ）。

A. 依赖

B. 恐惧

C. 悲观

D. 焦虑

E. 抑郁

9、产妇送入产房准备接生的指征正确的是（ ）。

A. 初产妇、经产妇有规律宫缩时

B. 初产妇宫口开至3~4cm，经产妇宫口开大10cm且宫缩好

C. 初产妇宫口开至3~4cm，经产妇宫口开大3~4cm且宫缩好

D. 初产妇宫口开至10cm，经产妇宫口开大10cm且宫缩好

E. 初产妇宫口开至10cm，经产妇宫口开大3~4cm且宫缩好

10、患者，男性，40岁。以充血性心力衰竭入院，医院给予洋地黄增强心肌收缩力，护士在观察患者脉搏时，发现在一系列正常均匀的脉搏中，出现一次提前而较弱的搏动，其后有一较正常延长的间歇，此脉搏称为（ ）。

A. 丝脉

B. 洪脉

C. 缓脉

D. 间歇脉

E. 短绌脉

11、患者男，62岁。以霍乱收治入院，护士在向患者及家属坐入院宣导时，错误的内容是（ ）。

A、患者不能走入病室

B、双休日家属可探视

C、剩饭需煮沸后倾倒

D、排泄物需严格消毒

E、通向走廊的门窗需关闭

12、患者男，65岁。护士在巡视候诊大厅时发现该患者独自就诊，持续咳嗽，呼吸急促，面色潮红，经询问患者主诉发烧2天。护士首先应（ ）。

A、立即扶患者坐下

B、将患者带至发热门诊

C、详细询问患者病史

D、向医务科汇报

E、通知患者家属来院

13、患者女性，23岁。溜冰时不慎跌倒，主诉当时右手掌撑地，右腕部剧痛。查体见右腕部肿胀，活动障碍，局部呈“餐叉”畸形。该患者可能发生了（ ）。

A. 桡骨远端伸直型骨折

B. 桡骨远端屈曲型骨折

C. 腕关节扭伤

D. 掌骨骨折

E. 腕骨骨折

14、患者，男性，36岁。患慢性痢疾，其病变部位在乙状结肠，对其进行保留灌肠宜采取（ ）。

A. 头低脚高位

B. 头高脚低位

C. 左侧卧位

D. 右侧卧位

E. 屈膝位

15、患儿，10个月，因腹泻重度脱水入院，经输液脱水症状减轻，已排尿，但表现四肢无力、腹胀、心音低钝，应考虑（ ）。

A. 低血钾

B. 低血糖

C. 低血钙

D. 低血镁

E. 代谢性酸中毒

16、患者女，50岁，工人，高中文化，有听力障碍。护士在病室与其沟通时，不妥的方式是（ ）。

- A、核实信息
- B、倾听时身体位置与患者同高
- C、用手势和表情加强信息传递
- D、提高讲话声音与其交流
- E、可适当使用文字交流

17、患者男性, 25岁, 双腿不慎被开水烫伤, 可考虑为其选用的保护具是 ()。

- A. 床档
- B. 支架被
- C. 肩部约束带
- D. 髋部约束带
- E. 踝部约束带

18、患儿女, 1岁。因淋巴结核住院, 医嘱肌内注射数种药物。护士为该患儿肌内注射时, 不恰当的操作是 ()。

- A、宜选用肌肉肥厚的臀大肌
- B、注射时应固定好肢体, 防止折针
- C、注意药物的配伍禁忌
- D、注意经常更换注射部位
- E、切勿将针梗全部刺入

19、某患者患风湿性心脏病8年余, 近日上呼吸道感染, 查体肝颈静脉回流征阳性, 提示 ()。

- A. 心源性休克
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 心房颤动
- D. 右心功能不全
- E. 左心功能不全

20、女, 34岁。发热、咳嗽, 左侧胸痛, 喜左侧卧位, 启诉此卧位可使胸部疼痛减轻, 喘气

够用。此卧位性质属（ ）。

- A. 主动卧位
- B. 被动卧位
- C. 被迫卧位
- D. 习惯卧位
- E. 特异卧位

21、某护士，业务水平较高，为人热情但脾气暴躁，护患关系紧张。有利于她建立良好护患关系的措施是（ ）。

- A. 做好患者心理护理
- B. 加强工作责任心
- C. 刻苦练习各项操作技术
- D. 尽量减少与患者的交流和沟通
- E. 学会控制情绪, 耐心解释患者的疑问

22、申请注册的护理毕业生，必须完成临床实习的最少时限是不少于（ ）。

- A. 6个月
- B. 7个月
- C. 8个月
- D. 9个月
- E. 10个月

23、患者男，28岁。主诉腹痛、腹泻2天，以急性胃肠炎收入院，护士遵医嘱为其进行静脉输液，操作过程中护士运用的主要非语言沟通形式是（ ）。

- A、触摸
- B、眼神
- C、仪表
- D、手势
- E、表情

24、患者女，25岁。产后一周出现会阴侧切伤口感染，细菌培养结果为金黄色葡萄球菌感染。该细菌最有可能对哪种抗生素存在耐药性（ ）。

- A. 头孢菌素
- B. 红霉素
- C. 甲硝唑
- D. 青霉素
- E. 两性霉素B

25、患者男性，70岁。以“风湿性心脏病、心房纤维颤动、左侧肢体偏瘫”收住院。护士为其测量心率、脉率的正确方法是（ ）。

- A. 先测心率，再在健侧测脉率
- B. 先测心率，再在患侧测脉率
- C. 一人同时测心率和脉率
- D. 一人听心率，一人在健侧测脉率，同时测1分钟
- E. 一人听心率，一人在患侧测脉率，同时测1分钟

26、患者男，56岁，Ⅲ度烧伤面积大于60%，入院后的护理级别是（ ）。

- A、重症护理
- B、特级护理
- C、一级护理
- D、二级护理
- E、三级护理

27、患者男性，23岁，高热5天，怀疑败血症，需取血做血培养，其目的是（ ）。

- A. 查白细胞数量
- B. 查红细胞数量
- C. 查心肌酶活性
- D. 测转氨酶值
- E. 查找致病菌

28、29岁产妇，因双胞胎妊娠行剖宫产娩出两活婴。新生儿均因轻度窒息转儿科治疗。该产妇因患有活动性乙型肝炎，护士告知其需要退奶，产后第2天值班护士查房时发现产妇情绪低落，其可能的原因不包括（ ）。

- A. 母婴分离
- B. 手术后疲劳
- C. 生产过程中缩宫素的使用
- D. 产妇体内雌、孕激素水平急剧下降
- E. 家属对新生儿的高度关注带来的失落感

29、患者男性，67岁，昏迷，用热水袋时要求水温不超过50℃，其原因是（ ）。

- A. 机体对热敏感度增加
- B. 局部感觉迟钝
- C. 皮肤抵抗力下降
- D. 血管对热反应过敏
- E. 加深患者昏迷程度

30、患者男，26岁。以肺炎入院，给予抗生素治疗。一周以来体温一直维持在39到40度，24小时波动范围不超过1度，此热型属于（ ）。

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 不规则热
- E. 药物热

31、患儿男，母乳喂养，体重8Kg，身高72cm，坐稳并能左右转身，能发简单的“爸爸”、“妈妈”的音节，刚开始爬行，其月龄可能是（ ）。

- A. 3-5个月
- B. 6-7个月
- C. 8-9个月

D. 10-11个月

E. 12个月

32、患者女性，70岁。腹部手术后第3天，护士在观察病情时获得资料：患者的肠鸣音每分钟4次。护士收集资料的方法属于（ ）。

A. 视觉观察法

B. 触觉观察法

C. 听觉观察法

D. 嗅觉观察法

E. 味觉观察法

33、患者，男性，54岁。头痛、头晕、失眠、注意力不集中1个月余，因工作劳累、精神紧张病情加重来就诊。查体：体温36.5℃，脉搏78次/分，呼吸18次/分，血压19/12kPa，左上臂一周前因摔伤用绷带包扎。患者有高血压家庭史。测量血压的注意事项中，错误的是（ ）。

A. 打气不可过猛过高

B. 应选择左上臂测量

C. 听诊器的胸端不可放在袖带下面

D. 做到四定，以保证血压的准确性

E. 血压未听清应将袖带内气驱尽后重测

34、患者男性，67岁，哮喘发作伴咳嗽，行超声雾化吸入治疗，正确的做法是（ ）。

A. 调整定时器，打开雾量调节开关，接通电源

B. 面罩置患者口鼻部，闭口深呼吸

C. 治疗毕，先关闭电源，再关雾化开关

D. 雾化时，患者呼吸宜浅快

E. 水槽内水量不足及时补充

35、患儿，男，1岁，患化脓性脑膜炎。入院后出现意识不清，呼吸不规则，两侧瞳孔不等大，对光反射迟钝。该患儿可能出现的并发症是（ ）。

A. 脑疝

- B. 脑脓肿
- C. 脑积水
- D. 脑室管膜炎
- E. 颅神经损伤

36、患者男性，76岁，因脑血栓导致左侧偏瘫。住院2日后，护士发现其右侧骶尾部皮肤发红，并伴有肿、热、痛，皮肤未破损。此患者右侧骶尾部皮肤改变为压疮的（ ）。

- A. 淤血红润期
- B. 炎性浸润期
- C. 浅度溃疡期
- D. 坏死溃疡期
- E. 深度溃疡期

37、患者男，35岁。胃肠道术后第1天尚未排气，但患者感觉饥饿要求进食，护士首先应采取的措施是（ ）。

- A、直接拒绝患者请求
- B、询问患者想进食的食物
- C、告知其不能进食的原因
- D、告知可进食的食物种类
- E、直接将此情况报告医生

38、患者男性，17岁，中耳炎1年，3天前感冒，出现发热 $T38^{\circ}\text{C}$ ，继而出现剧烈头痛、呕吐、抽搐和意识障碍，送到医院查血白细胞 $13\times 10^9/\text{L}$ ，颈项强直，并抽取脑脊液检查，医生诊断化脓性脑膜炎。其典型的化脓性脑脊液变（ ）。

- A. 细胞数增高，蛋白增高，外观浑浊
- B. 细胞数增高，蛋白降低，外观浑浊
- C. 细胞数增高，糖下降，外观浑浊
- D. 细胞数下降，蛋白升高，外观脓性
- E. 细胞数增高，蛋白升高，外观清

39、为避免骨折断端的移位，急救及护理中应特别注意（ ）。

- A. 原暴力作用方向
- B. 肢体自身重量
- C. 肌肉牵拉作用
- D. 固定搬运方法
- E. 局部加压包扎

40、患者，男性，35岁。近2个月来右腰部有隐痛、钝痛。今晨7时突然发作阵发性刀割样疼痛，向下腹及会阴部放射。患者辗转不安，呻吟呼痛，面色苍白，伴镜下血尿。此疼痛为（ ）。

- A. 心绞痛
- B. 肠绞痛
- C. 胆绞痛
- D. 肾绞痛
- E. 坐骨神经痛

41、患者男性，30岁，尿道损伤后出现排尿困难，导尿管能插入膀胱，导尿管的留置时间应（ ）。

- A. 1~3天
- B. 4~5天
- C. 10~14天
- D. 21~28天
- E. 30~40天

42、患者男，70岁。高血压病史20年，糖尿病病史15年。平时血压控制在160—170/100—105mmhg之间。该患者的高血压危险度分层属于（ ）。

- A. 无危险组
- B. 低度危险组
- C. 中度危险组
- D. 高度危险组

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/577060014026006036>