

皮肤与性病学(医学高级): 诊断学基础三

1、多选 对肝源性低血糖描述, 正确的是 ()。

- A. 服糖后 2h 血糖可降至正常
- B. 服糖后 2h 血糖不能降至正常
- C. 尿糖不会出现阳性
- D. 空腹血糖低于正常
- E. 服糖后血糖峰值提 (江南博哥) 前出现并超过正常

正确答案: B, D, E

2、多选 运动实验的适应证包括 ()。

- A. 评估冠心病病人的心脏负荷能力
- B. 对不典型胸痛或可疑冠心病病人进行鉴别诊断
- C. 评价冠心病的药物或介入手术治疗效果
- D. 观察是否有电解质紊乱
- E. 观察洋地黄中毒的程度

正确答案: A, B, C

3、多选 急性下壁心肌梗死的心电图诊断包括 ()。

- A. V1、V2 出现异常 Q 波, 时限 $>0.04s$
- B. II、III、aVF、ST 段弓背上抬, 与 T 波形成单向曲线
- C. II、III、aVF 出现异常 Q 波, 时限 $>0.04s$
- D. I、aVL 出现 ST 段弓背型上抬, T 波直立
- E. I、aVL 出现异常 Q 波, 时限 $>0.04s$

正确答案: B, C

4、单选 下列关于完全性右束支阻滞心电图表现的描述不正确的是 ()。

- A. V1 或 V2 导联 QRS 呈 rsR' 型
- B. I、V5、V6 导联 S 波增宽
- C. V1、V2 导联 T 波倒置
- D. V1 导联 R 峰时间 >0.05 秒
- E. I、V5、V6 导联 T 波与 QRS 主波方向相反

正确答案: E

5、单选 心室复极的方向是 ()。

- A. 心内膜向心外膜方向推进
- B. 心内膜与心外膜同步复极
- C. 心外膜向心内膜方向推进
- D. 室间隔向心室内膜推进
- E. 右心室向左心室方向推进

正确答案: C

6、单选 提示诊断肺气肿的最有价值的肺功能检测指标是 ()。

- A. 肺活量

- B. 肺总量
- C. 残气量
- D. 残气量 / 肺总量%
- E. 通气 / 血流

正确答案： D

7、多选 深吸气量组成包括（）。

- A. 补吸气容积
- B. 补呼气容积
- C. 残气量
- D. 潮气容积
- E. 肺活量

正确答案： A, D

8、多选 肝炎病毒中，核酸为 DNA 的有（）。

- A. HAV
- B. HIV
- C. HCV
- D. HEV
- E. HBV

正确答案： B, E

9、单选 女性，52岁，消瘦、吞咽困难2月余，伴心悸、气短、双下肢水肿。查体：口唇发绀，心尖部舒张期隆隆样杂音，S1亢进，二尖瓣开放拍击音明显，肺动脉瓣区S2亢进分裂。双下肢水肿的原因是（）。

- A. 右心功能衰竭
- B. 并发肾功能损害
- C. 心包积液
- D. 合并营养不良
- E. 血浆胶体渗透压过低

正确答案： A

10、单选 有关病历书写中医生的签名规定以下哪点是错误的（）。

- A. 实习医生、进修医生签全名
- B. 经治医生应在上级医生修改后再签名
- C. 实习医务人员、试用期医务人员书写的病历，应当经过本医疗机构注册的医务人员审阅、修改并签名。
- D. 签名位置在各项书写的右下角
- E. 上级医师在署名的左侧以斜线相隔

正确答案： B

11、多选 肾性血尿 RBC 形态改变的因素是（）。

- A. 红细胞在尿道内停滞时间较长

- B. 受介质张力影响
- C. 受酸碱度变化影响
- D. 受渗透压变影响
- E. 通过肾小球基底膜的挤压

正确答案： B, C, E

12、多选 诊断前列腺癌时，可选择检测的肿瘤标志物（）。

- A. NSE
- B. CEA
- C. AFP
- D. PSA
- E. PAP

正确答案： D, E

13、单选 下列关于心绞痛发作时心电图表现的描述不正确的是（）。

- A. ST 段水平型或下斜型下移 $\geq 0.1\text{mV}$
- B. 心电图原有 ST-T 改变，胸痛发作时可转为正常
- C. 心绞痛缓解后，ST 段可恢复正常
- D. 常出现异常 Q 波
- E. 出现 ST 段抬高

正确答案： D

14、多选 属于伤寒杆菌抗原的是（）。

- A. “甲”鞭毛抗原
- B. “乙”鞭毛抗原
- C. “H”抗原
- D. “丙”鞭毛抗原
- E. “O”抗原

正确答案： C, E

15、单选 运动负荷试验时，极量心率粗略算法为（）。

- A. 190-年龄
- B. 200-年龄
- C. 210-年龄
- D. 220-年龄
- E. 250-年龄

正确答案： D

16、多选 能引起肾小球滤过率升高的有（）。

- A. 原发性肾小球肾炎
- B. 肢端肥大症
- C. 慢性肾衰竭
- D. 妊娠

E. 巨人症

正确答案：B, D, E

17、多选 可引起乳酸脱氢酶增高的有（）。

A. 肝脏疾病

B. 进行性肌营养不良

C. 急性心肌梗死

D. 恶性肿瘤

E. 肺梗死

正确答案：A, B, C, D, E

18、单选 男，30岁，2天前受凉后突然寒战、高热、胸痛、咳铁锈色痰。应首先选择的检查为（）。

A. 胸片

B. 肺部CT

C. 痰培养

D. 血沉

E. 胸部B超

正确答案：A

19、单选 疑难病历讨论记录内容不含以下哪一条（）。

A. 讨论日期

B. 主持人及参加人员，姓名和职称

C. 病情简介，诊治难点，与会者讨论要点

D. 讨论发言人签名

E. 主持人总结并审阅后签名

正确答案：D

20、多选 阵发性房性心动过速的心电图表现为（）。

A. $QRS < 0.12s$

B. 可见心室夺获

C. $QRS > 0.12s$

D. 心房率 $150 \sim 250 / \text{min}$

E. P'波与窦性者不同，可直立或倒置

正确答案：A, D, E

21、多选 B细胞特有的表面标志（）。

A. CD4

B. CD8

C. CD20

D. CD3

E. CD19

正确答案：C, E

22、单选 使有氧代谢不能正常进行，生命难以维持的 PaO₂ 是在（）。

- A. 60mmHg
- B. 50mmHg
- C. 40mmHg
- D. 30mmHg
- E. 20mmHg

正确答案：E

23、单选 患者，女，18岁，1天前因在路边摊点进餐后感头昏、疲劳，随后出现米汤样腹泻，间断呕吐，不伴里急后重，大便量多，无黏液脓血。入院查体：体温、血压正常，腹部无压痛，未扪及包块。新鲜大便悬滴检查可见运动活泼呈穿梭状的弧菌。对该患者腹泻的分类和原因说法正确的是（）。

- A. 慢性腹泻，为肠道内感染
- B. 慢性腹泻，为全身性感染
- C. 急性腹泻，为急性中毒
- D. 急性腹泻，为肠道内感染
- E. 急性腹泻，为全身性感染

正确答案：D

24、多选 心肌传导功能异常的表现形式包括（）。

- A. 完全性传导阻滞
- B. 传导延迟
- C. 单向阻滞
- D. 折返激动
- E. 隐匿性传导

正确答案：A, B, C, D, E

25、多选 在选择实验室或其他检查时应注意（）。

- A. 检查的灵敏度和特异性
- B. 安全性
- C. 成本与效果分析
- D. 检查的时机
- E. 检查的意义

正确答案：A, B, C, D, E

26、多选 胃镜检查的适应证是（）。

- A. 原因不明的上腹部疼痛、不适、饱胀、食欲下降
- B. 腹痛、腹泻或腹部包块
- C. 不明原因的便血
- D. 上消化道息肉摘除
- E. 上消化道出血原因不明


正确答案：A, D, E

27、多选 低血钠症见于（）。

- A. 长期使用皮质激素者
- B. 反复使用速尿
- C. 慢性肾功能不全少尿期
- D. 肾上腺皮质功能亢进
- E. 肾上腺皮质功能减退

正确答案：B, C, E

28、单选?患者女性，32岁，胸闷、头昏症状。心电图如图5-18所示，应诊断



为（）。

- A. 完全性干扰性房室脱节
- B. 高度房室传导阻滞
- C. 二度II型窦房阻滞
- D. 三度房室传导阻滞
- E. 非阵发性交界性心动过速

正确答案：D

参考解析：窦性心动过速，三度房室传导阻滞，交界性逸搏心律**参考解析：**心电图显示窦性频率为118次/分，各导联P-P间期基本规则；QRS波群呈室上性，R-R间期规则，频率为38次/分；心房率>心室率，P波与QRS波群无相关性。发生完全性房室传导阻滞时，所有室上性冲动均不能下传心室，故心室将由交界区或心室异位起搏点所控制。当由交界区起搏点控制心室时，心电图表现为：QRS波群形态正常，室率缓慢而规则，频率一般在40~60次/分。

29、多选 引起弥散量降低的有（）。

- A. 肺出血
- B. 肺结核
- C. 气胸
- D. 肺间质纤维化
- E. 红细胞增多症

正确答案：B, C, D

30、单选 有关典型预激综合征的心电图表现不正确的是（）。

- A. PR 间期 <0.12 秒
- B. QRS 波增宽 ≥ 0.12 秒
- C. QRS 起始部有预激波
- D. P-J 间期延长
- E. 继发性 ST-T 改变

正确答案：D

31、多选 临床常见诊断失误的原因有（ ）。

- A. 医学知识不足
- B. 先入为主、主观臆断
- C. 病史资料不完整、不确切
- D. 观察不细致或检查结果误差较大
- E. 缺乏临床经验

正确答案：A, B, C, D, E

32、单选 正常成人 PR 间期为（ ）。

- A. $0.10\sim 0.20$ 秒
- B. $0.12\sim 0.20$ 秒
- C. $0.06\sim 0.08$ 秒
- D. $0.32\sim 0.44$ 秒
- E. $0.08\sim 0.22$ 秒

正确答案：B

33、单选 男性，54 岁，乙肝病史 10 年，1 个月来乏力腹胀，双下肢水肿，1 周来自觉低热、乏力、腹胀日益加重，腹痛。查体：移动性浊音（+）。腹水检查：李凡它试验（+），细胞数 $0.8\times 10^9/L$ ，WBC $0.6\times 10^9/L$ ，中性 90%。主要的治疗是（ ）。

- A. 抗感染治疗
- B. 抗结核治疗
- C. 开腹探查
- D. 放腹水
- E. 腹水浓缩回输

正确答案：A

34、多选 病态窦房结综合征的心电图表现有（ ）。

- A. 出现窦性心律不齐
- B. 窦性停搏或窦房阻滞
- C. 心动过缓心率 $<60 / \text{min}$
- D. 持续的窦性心动过缓，心率 $<50 / \text{min}$ ，且不易用阿托品等药物纠正
- E. 常出现慢-快综合征

正确答案：B, D, E

35、多选 诊断干细胞癌时，首选的肿瘤标志物（ ）。

- A. APF
- B. PSA
- C. hCG
- D. AFP
- E. CEA

正确答案： A, C, D

36、单选 急诊病历何时完成（）。

- A. 处理完成后半日内
- B. 接诊后 1 小时
- C. 接诊后同时
- D. 死亡后
- E. 当日

正确答案： C

37、多选 右心室肥大的心电图特点包括（）。

- A. V5 导联 $R / S \leq 1$
- B. $R_w + S_{V5} > 1.05mV$
- C. 重症者 $R_{V1} + S_{V5} > 1.2mV$
- D. V1 导联 $R / S \geq 1$
- E. 心电轴右偏 $\geq 90^\circ$

正确答案： A, B, C, D, E

38、单选 下列可导致 FRC 增高的疾病是（）。

- A. 肺间质纤维化
- B. ARDS
- C. 严重脊柱侧凸
- D. 阻塞性肺气肿
- E. 肺不张

正确答案： D

39、多选 可抑制肾小管对肌酐分泌的药物有（）。

- A. 胃复安
- B. 阿莫西林
- C. 甲苄嘧啶
- D. 甲氧咪胍
- E. 西咪替丁

正确答案： C, D, E

40、多选 可出现糖耐量减低的疾病有（）。

- A. 皮质醇增多症
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 肥胖病

D. 肢端肥大症

E. 2 型糖尿病

正确答案：A, B, C, D, E

41、单选 男性，54 岁，间断性颜面水肿 10 年。查体：血压 150/97mmHg，贫血貌，眼睑及下肢轻度凹陷性水肿。血常规：血红蛋白 90g/L，红细胞 $3.5 \times 10^{12}/L$ ，尿蛋白（++），尿红细胞 3~5/HP，蜡样管型 0~2/HP，血清白蛋白 27g/L，血肌酐 350mmol/L，尿素氮 13mmol/L。该患者所患疾病可能为（）。

A. 心脏疾病

B. 肝脏疾病

C. 肾脏疾病

D. 特发性水肿

E. 老年性水肿

正确答案：C

42、多选 肝功能检查包括（）。

A. 肝炎病毒标志物测定

B. 电解质测定

C. 血清总蛋白及白蛋白及球蛋白测定

D. 血清转氨酶测定

E. 血清胆红素测定

正确答案：C, D, E

43、单选 患者，男，62 岁，进行性吞咽困难 2 个月，1 周来仅能进流食。X 线食管造影：食管中段约 5cm 长不规则样狭窄，管壁僵硬，蠕动消失。该患者吞咽困难属于（）。

A. 机械性吞咽困难

B. 运动性吞咽困难

C. 口咽性吞咽困难

D. 机械性与运动性两者均有

E. 精神性吞咽困难

正确答案：D

44、多选 尿胆红素试验阳性的疾病有（）。

A. 肝硬化

B. 梗阻性黄疸

C. 胆石症

D. 胰头癌

E. Rotor 综合征

正确答案：A, B, C, D, E

45、多选 C1q 减低可见于（）。

A. 骨髓炎

- B. 过敏性紫癜
- C. 肾病综合征
- D. SLE
- E. 类风湿关节炎

正确答案：C, D

46、单选 男性，66岁，发热1周，意识障碍2小时入院。有糖尿病史6年，查体：T39.7℃，BP80/50mmHg，右肺可闻及湿啰音。血糖44.3mmol/L，血酮体52.3mg/d。该患者动脉血气最可能的结果是（）。

- A. pH<35、PaCO₂↓、HCO₃⁻↑
- B. pH<35、PaCO₂↓、HCO₃⁻↓
- C. pH<35、PaCO₂↑、HCO₃⁻↑
- D. pH>45、PaCO₂↓、HCO₃⁻↑
- E. pH>45、PaCO₂↓、HCO₃⁻↓

正确答案：B

47、单选 下列关于二度I型房室传导阻滞的描述不正确的是（）。

- A. PR间期逐渐延长
- B. 可见QRS波群脱落
- C. 房室传导比例常为2:1~4:1
- D. 漏搏后的PR间期又趋缩短
- E. 病变多位于房室结或希氏束的近端

正确答案：C

48、多选 可引起血糖降低的情况有（）。

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 胰岛素用量过大
- C. 口服避孕药
- D. I型糖原累积病
- E. 恶病质

正确答案：B, D, E

49、单选 关于各项记录，不正确的是（）。

- A. 应注明年、月、日
- B. 急诊病历书写就诊时间应具体到分钟
- C. 表格式病历各栏内必须按项填写
- D. 表格栏无内容者可画“/”或“—”
- E. 表格式病历无内容者可空白

正确答案：E

50、多选 引起弥散量增加的有（）。

- A. 先天性心脏病
- B. 风湿性心脏病

- C. 红细胞增多症
- D. 贫血
- E. 肺出血


正确答案： C, E

51、单选 关于功能残气量的描述错误的是（ ）。

- A. 可直接由肺量计测得
- B. 具有较好的重复性
- C. 主要反映胸廓弹性回缩和肺的弹性回缩力之间的关系
- D. 超过 40%提示肺气肿
- E. 肺弹性回缩力下降可使 FRC 增高

正确答案： D

52、单选?患者女性，34 岁，反复发作心动过速，临床检查未发现器质性心脏病。心电图如图 5-2 所示，应诊断为（ ）。



- A. 阵发性室性心动过速
- B. 房性心动过速伴室内差异传导
- C. 非阵发性室性心动过速
- D. 交界性心动过速
- E. 室性期前收缩，三联律

正确答案： A

参考解析：阵发性室性心动过速**参考解析：**心电图为 12 导联同步记录。窦性心律，可见提前出现的连续 3 次宽大畸形的 QRS 波，其前无相关 P 波。胸导联 QRS 波呈左束支阻滞图形，II、III、aVF 导联呈高 R 波，aVR 和 aVL 导联 QRS 主波为负向，I 导联 QRS 振幅较小。此图为典型的右室流出道室性心动过速的表现。起源于右室流出道的异位心动过速是特发性室性心动过速的一种常见类型。

53、多选 可引起肌酸激酶增高的有（ ）。

- A. 长期应用激素

- B. 心肌炎
- C. 甲状腺功能亢进
- D. 溶栓治疗
- E. 急性心肌梗死

正确答案：B, D, E

54、多选 平坦型葡萄糖耐量曲线常见于（）。

- A. 甲状腺功能减退
- B. 腺垂体功能减退症
- C. 肾上腺皮质功能亢进
- D. 胃切除后
- E. 胰岛 B 细胞瘤

正确答案：B, C, E

55、多选 急性前间壁心肌梗死的心电图诊断包括（）。

- A. V1 出现异常 Q 波，V 呈 QS
- B. V1-V3ST 段弓背向上抬高与 T 波形成单向曲线
- C. V3、V2 的 ST 段斜型上抬，T 波高耸呈帐篷
- D. V1-V3ST 段弓背型上抬伴倒置 T 波
- E. V1-V 呈 QS

正确答案：B, D, E

56、单选 下列最易引起阿-斯综合征的情况是（）。

- A. 心房扑动伴 2:1 传导
- B. 阵发性室上性心动过速
- C. 非阵发性室性心动过速
- D. 三度房室传导阻滞
- E. 窦性心动过速

正确答案：D

57、多选 可引起功能性蛋白尿的情况有（）。

- A. 隐匿性肾炎
- B. 体位改变
- C. 发热
- D. 肾小球肾炎
- E. 剧烈运动

正确答案：B, C, E

58、单选 入院记录应在何时完成（）。

- A. 入院 24 小时内
- B. 最迟应在患者入院后 48 小时内完成
- C. 双休日可在入院后 3 天
- D. 入院后 3 天

E. 春节期间可在一周内

正确答案： A

59、单选 男，82岁，高血压20年。反复上腹痛溃疡病史10年。间歇性发作足踝关节痛8年。今晨突然倒地昏迷1小时入院。最佳主诉选择为（）。

- A. 高血压20年
- B. 间歇性发作足踝关节痛8年
- C. 高血压20年，昏迷1小时
- D. 反复上腹痛10年
- E. 溃疡病10年

正确答案： C

60、多选 引起血尿酸增加的原因有（）。

- A. 服碳酸氢钠后
- B. 肾小管转运功能障碍
- C. 尿酸生成酶缺陷
- D. 嘌呤类食物进食过多
- E. 蔬菜进食过多

正确答案： B, C, D

61、单选 女，30岁，发热1周，左腹股沟区可扪及5cm×4cm×3cm大小肿物，有压痛，有波动感。为明确诊断应采用的检查是（）。

- A. 切开
- B. 诊断性穿刺
- C. 腹部B超
- D. CT检查
- E. 钡剂灌肠

正确答案： B

62、多选 通常所说的SNP包括（）。

- A. 由单个碱基的缺失所致
- B. 单个碱基的颠换所致
- C. 以上都不对
- D. 单个碱基的转换所致
- E. 由单个碱基的插入所致

正确答案： B, D

63、多选 可使BUN升高的有（）。

- A. 器质性肾功能损害
- B. 肾前性少尿
- C. 上消化道出血
- D. 高蛋白饮食
- E. 甲状腺功能亢进

正确答案：A, B, C, D, E

64、多选 影响血 β 2-M水平的因素有（）。

- A. 泌尿系感染
- B. 炎症
- C. 年龄
- D. 性别
- E. 肿瘤

正确答案：A, B, E

65、单选 不是结肠镜检查禁忌证的是（）。

- A. 急性肠道感染
- B. 严重的肺功能不全者
- C. 便血
- D. 肠粘连者
- E. 精神、心理原因不能配合检查者

正确答案：C

66、单选 关于非阵发性心动过速的描述不正确的是（）。

- A. 心动过速频率与窦性心律频率相近
- B. 易发生干扰性房室脱节
- C. 易出现各种融合波
- D. 易发生夺获心搏
- E. 多发生在无器质性心脏病患者

正确答案：E

67、单选 符合高血钾心电图表现的是（）。

- A. T波高耸，基底部狭窄，呈帐篷型T波
- B. u波倒置
- C. 冠状T波
- D. ST段水平型下移
- E. QT间期缩短

正确答案：A

68、单选 主诉记录（）。

- A. 主要症状
- B. 主要生化检查异常
- C. 主要阳性体征
- D. 主要症状 / 体征及持续时间
- E. 起病情况

正确答案：D

69、多选 右心房肥大的心电图诊断包括（）。

- A. P波高尖

- B. P 波时限 $<0.11s$
- C. 电轴右偏
- D. P 波电压 $>0.25mV$
- E. P 波电压 $<0.25mV$

正确答案：A, D

70、多选 反映肝实质细胞损伤的血清酶包括（）。

- A. γ -谷氨酰转移酶
- B. 天冬氨酸氨基转移酶
- C. 单胺氧化酶
- D. 丙氨酸氨基转移酶
- E. 乳酸脱氢酶

正确答案：B, D

71、多选 关于糖耐量减低的描述正确的是（）。

- A. 餐后 2h 血糖在 $7.8\sim 11.1mmol/L$ 之间
- B. 空腹血糖 $6.11\sim 7.0mmol/L$
- C. 尿糖阳性
- D. OGTT 试验血糖峰值可延长至 1h 后
- E. OGTT 试验血糖恢复正常的时间延长至 2~3h

正确答案：A, B, C, D, E

72、单选 男性，56 岁，心悸、胸闷 2 个月，突发胸痛 2 小时，呈持续性疼痛，伴呼吸困难，服用各种药物不能缓解。查体：心率 85 次/分，心音低，心律不齐，可未闻及期前收缩。首选的检查为（）。

- A. 心电图
- B. 心脏常规拍片
- C. 心肌酶谱
- D. 胸片
- E. 超声

正确答案：A

73、多选 房性早搏的心电图特点是（）。

- A. $QRS>0.12s$
- B. $P'-R>0.12s$
- C. P' 波提前出现
- D. 代偿间期不完全
- E. 提前出现的 QRS 波群无提前出现的 P' 波

正确答案：B, C, D

74、多选 C3 增高可见于（）。

- A. 肿瘤
- B. 活动性 SLE

- C. 急性炎症
- D. 传染病早期
- E. 类风湿性关节炎

正确答案：A, C, D

75、单选 女性，20岁，自幼有轻伤后出血不止，伴有关节肿痛，反复鼻出血、牙龈出血1年余，常见皮肤黏膜出血点，自诉月经量过多。最可能的诊断是（）。

- A. 再生障碍性贫血
- B. 急性白血病
- C. 过敏性紫癜
- D. 血友病
- E. 血小板减少性紫癜

正确答案：D

76、多选 不完全性右束支传导阻滞的心电图改变是（）。

- A. QRS>0.12s
- B. 室上性起搏点
- C. V1呈rSR图形
- D. QRS波群时间在0.09~0.11s之间
- E. V1V2呈QS型

正确答案：B, C, D

77、多选 诊断疾病的步骤包括（）。

- A. 搜集临床资料
- B. 确立诊断
- C. 提出初步诊断
- D. 修正诊断
- E. 分析、评价、整理资料

正确答案：A, B, C, D, E

78、单选 病历书写要工整、清楚，标点正确，对错字错句的处理可做（）。

- A. 划双横线
- B. 刀刮
- C. 胶粘
- D. 涂黑
- E. 剪贴

正确答案：A

79、单选 患者，女，42岁，右上腹绞痛3小时入院。查体：皮肤、巩膜未见黄染。辅助检查：血清总胆红素 $26\mu\text{mol/L}$ ，超声示胆总管结石。该患者行胆红素测定时，可出现哪种改变（）。

- A. 血清总胆红素和非结合胆红素升高

- B. 血清总胆红素和结合胆红素升高
- C. 血清总胆红素和结合胆红素及非结合胆红素升高
- D. 结合胆红素 / 总胆红素比值 $<20\%$
- E. 结合胆红素 / 总胆红素比值明显下降

正确答案：B

80、单选 患者，女，42岁，右上腹绞痛3小时入院。查体：皮肤、巩膜未见黄染。辅助检查：血清总胆红素 $26\mu\text{mol/L}$ ，超声示胆总管结石。关于黄疸的诊断，该患者符合哪项（）。

- A. 无黄疸
- B. 隐性黄疸
- C. 轻度黄疸
- D. 中度黄疸
- E. 重度黄疸

正确答案：B

81、单选 心室除极首先从（）。

- A. 左室开始
- B. 右室开始
- C. 室间隔中部开始
- D. 室间隔上部开始
- E. 基底部开始

正确答案：C

82、多选 血氨升高常见于（）。

- A. 尿毒症
- B. 上消化道出血
- C. 肝性脑病
- D. 贫血
- E. 低蛋白饮食

正确答案：A, B, C

83、单选 下列不符合左前分支阻滞心电图表现的是（）。

- A. 电轴左偏 $<-45^\circ$
- B. QRS波群时间延长 >0.12 秒
- C. II、III、aVF导联QRS波呈rS型
- D. I、aVL导联QRS波呈qR型
- E. 胸导联可出现R波递增不良

正确答案：B

84、多选 阵发性室性心动过速的心电图改变是（）。

- A. 频率 $140\sim 200/\text{min}$
- B. 代偿间期不完全

- C. 连续 3 个以上的室性异位搏动
- D. 常见室性融合波或心室夺获
- E. 逆行 P' 波可出现在 QRS 波群之前

正确答案：A, C, D

85、单选 不是胃镜检查禁忌证的是（ ）。

- A. 食管静脉曲张
- B. 急性咽喉、食管及胃的腐蚀性炎症
- C. 严重的肺功能不全
- D. 疑有空腔脏器穿孔
- E. 神志不清或精神异常

正确答案：A

86、单选 女性患者，36 岁，反复出现下肢水肿，蛋白尿 3 年，一直服用泼尼松 30mg/d 治疗，最近 3 天因受凉后出现咽痛、发热、咳嗽，住院发现双下肢膝以下高度水肿，尿蛋白（++++），红细胞 0~3/HP，并加大泼尼松至 60mg/d，晨顿服，且加用环磷酰胺 0.2g，静脉点滴，隔日 1 次，入院后第 4 天患者感尿频、尿急、尿痛，查尿常规：白细胞（+++），加用头孢唑林（先锋 V 号）静脉滴注，第 5 天出现水肿加重，尿量 300ml/d，尿素氮 20mmol/L，血肌酐 987mmol/L，并有心悸、气促感，查体心率 110 次 / 分，双肺湿啰音，BP165/110mmHg，即做紧急血透，血透 3 小时后气促好转，水肿缓解，但回病房后排出红色尿 100ml，镜检红细胞（+++），为均一型血尿。该患者出现少尿的可能原因是（ ）。

- A. 肾实质性病变加重
- B. 环磷酰胺引起肾损害
- C. 头孢唑林产生肾损害
- D. 尿路感染引起
- E. 与泼尼松使用有关


正确答案：A

87、多选 肾小管功能测定包括（ ）。

- A. 肌酐测定
- B. 尿素氮测定
- C. 肾脏浓缩和稀释试验
- D. 有效肾血浆流量测定
- E. 尿渗量测定

正确答案：C, D, E

88、单选?患者男性，47 岁，无症状。心电图如图 5-20 所示，应诊断为（ ）。



- A. 右心室肥厚
- B. 预激综合征
- C. 完全性右束支阻滞
- D. 完全性左束支阻滞
- E. 后壁心肌梗死

正确答案： C

参考解析： 窦性心动过缓，完全性右束支阻滞**参考解析：** 心电图显示窦性心律，频率 56 次 / 分，P-P 间期规则；QRS 增宽为 0.12 秒；V1 导联 QRS 波群呈 rsR' 型；I、II、aVL、V3~V6 导联有宽而粗钝的 S 波。完全性右束支阻滞时，激动沿左束支下传，心室开始除极的程序不变，仍按原来的途径进行，当 0.04 秒时左侧室间隔及左室除极结束，激动经过室间隔向右室进行，由于激动在右室心肌内缓慢进行，因而终末除极向量向右向前，出现本图所示的典型右束支阻滞图形。

89、多选 冠心病的危险因素有（ ）。

- A. TG 升高
- B. LDL-C 升高
- C. TC 升高
- D. HDL-C 降低
- E. LPA. 升高

正确答案： A, B, C, D, E

90、多选 IgE 水平增高的有（ ）。

- A. 结节病
- B. 寄生虫感染
- C. 先天性丙种球蛋白缺乏症
- D. 风湿性关节炎
- E. 过敏性鼻炎

正确答案： A, B, E

91、多选 尿胆原增多见于（ ）。

- A. 肾小管尿胆原重吸收增高
- B. 肝功能受损
- C. 肠道吸收尿胆原增高
- D. 体内胆红素生成亢进且胆管通畅
- E. 肠道阻塞

正确答案：A, B, C, D, E

92、单选 女，32岁，反复尿频、尿急、尿痛半年，经抗生素治疗无好转，伴右侧腰部胀痛及午后潮热。为了解患者肾脏形态改变，最有价值的检查是（）。

- A. 肾脏B超
- B. 静脉尿路造影
- C. 腹部平片检查
- D. CT
- E. MRI

正确答案：B

93、多选 急性肝损伤时，实验诊断指标变化特征有（）。

- A. 转氨酶显著升高，通常超过正常参考范围上限8倍以上
- B. 白蛋白显著下降
- C. 常伴有血清胆红素的升高
- D. ALP可升高，但一般不会超过其正常参考范围上限的3倍
- E. 急性肝损伤时，血清胆红素升高以结合胆红素为主

正确答案：A, C, D, E

94、单选 最能准确反映阻塞性通气功能障碍的指标是（）。

- A. 一秒率
- B. 肺活量
- C. 通气储备功能
- D. 潮气容积
- E. 肺总量

正确答案：C

95、单选 判断呼吸衰竭的指标是指安静状态下呼吸空气时PaO₂测定值小于（）。

- A. 20mmHg
- B. 30mmHg
- C. 40mmHg
- D. 50mmHg
- E. 60mmHg

正确答案：A

96、单选？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578043062134006065>