

护理基本技能练习题及答案

1、同时注射几种药液时,下列说法错误的是

- A、 注射应慢
- B、 解除思想顾虑
- C、 减轻疼痛
- D、 先注射刺激性强的药物
- E、 分散注意力

答案: D

2、尿失禁病人在护理上哪项是不必要的?

- A、 保持床铺的清洁干燥
- B、 保持皮肤的清洁干燥
- C、 垫尿布、勤洗、勤换
- D、 每次排尿后,用新洁尔灭棉球消毒外阴
- E、 定时按摩受压部位

答案: D

3、目前,医学界逐渐开始以那些作为死亡的诊断依据

- A、 脑死亡
- B、 心跳停止
- C、 呼吸停止
- D、 各项反射消失
- E、 瞳孔散大,对光反射消失

答案: A

4、单人操作时,胸外按压与吹气之比为

- A、 15:1
- B、 30:2
- C、 5:1
- D、 15:3
- E、 15:4

答案: B

5、护士在护理服用洋地黄药物的患者时,操作不妥的是

- A、 询问患者不适主诉
- B、 给药前先数心率
- C、 观察洋地黄药物浓度
- D、 心率 <60 次/分,不能给药
- E、 嘱咐患者如果一次漏服,下一次要加量补服

答案：E

6、下列体位与压疮好发部位的关系不正确的是()

- A、 仰卧--骶尾部
- B、 俯卧--内踝
- C、 侧卧--髋部
- D、 坐位--坐骨结节
- E、 仰卧--足跟部

答案：B

7、下列有关饮食护理的说法,错误的是

- A、 对禁食或限制饮食的病人,应讲解原因,取得配合
- B、 为病人创造清洁、整齐、安静、空气清新、舒适的就餐环境
- C、 帮助病人纠正错误的饮食习惯和饮食行为
- D、 对食管胃底静脉曲张病人插胃管提供胃肠内营养
- E、 按医嘱确定饮食种类,向病人指导可选择的食物和不可选择的食物

答案：D

8、病人,女性,45岁。因风湿性心脏病住院治疗。入院后查体心功能三级。在一次输液过程中,病人擅自将滴速调至80滴每分,输液进行20分钟以后,病人出现呼吸困难、咳嗽、咳粉红色泡沫痰。为降低肺泡内泡沫的表面张力护士可采用

- A、 10%~20%的乙醇湿化给氧
- B、 20%~30%的乙醇湿化给氧
- C、 30%~40%的乙醇湿化给氧
- D、 40%~50%的乙醇湿化给氧
- E、 50%~60%的乙醇湿化给氧

答案：B

9、下列哪项不属于尸体护理的目的

- A、 保持尸体整洁
- B、 保持尸体姿势良好
- C、 使尸体易于辨认
- D、 使尸体五官端详
- E、 给家属以安慰

答案：D

10、输液过程中导致静脉痉挛的原因是

- A、 输液速度过快
- B、 液体注入皮下组织

- C、 针头阻塞
- D、 患者肢体抬举过高
- E、 输入的药液温度过低

答案： E

11、 患者, 女, 23 岁。 因感染需服磺胺药治疗, 护士嘱其服药后多饮水, 其目的是

- A、 减少副作用
- B、 保护肝脏
- C、 促进吸收
- D、 冲淡药味
- E、 防止在肾脏析出结晶

答案： E

12、 口腔护理的目的不包括 ()

- A、 使口腔湿润
- B、 清洁口腔
- C、 去除口臭
- D、 治疗口腔溃疡
- E、 观察病情

答案： D

13、 电动吸引器吸痰是利用

- A、 正压作用原理
- B、 静压作用原理
- C、 空吸作用原理
- D、 虹吸作用原理
- E、 负压作用原理

答案： E

14、 给婴儿口服脊髓灰质炎减毒活疫苗时, 正确的做法是

- A、 用温热水送服
- B、 用热开水送服
- C、 冷开水送服或含服
- D、 热开水溶解后服用
- E、 服后半小时可饮用热牛奶

答案： C

15、 刘女士, 36 岁, 在门诊咨询如何灭头虱, 护生小李告知其 30%百部含酸煎剂的制作过程正确的是 ()

A、百部 30g+水 500ml 煎煮 30 分钟,用双层纱布过滤后 将药液挤出。药渣+水 500ml 煎煮 30 分钟。两次药液浓缩至 100ml,冷却后加乙酸 1ml

B、百部 30g+水 500ml 煎煮 30 分钟,用双层纱布过滤后 将药液挤出。药渣+水 500ml 煎煮 15 分钟。两次药液浓缩至 100ml,冷却后加乙酸 1ml

C、百部 30g+水 500ml 煎煮 30 分钟,用双层纱布过滤后 将药液挤出。药渣+水 500ml 煎煮 30 分钟。两次药液浓缩至 100ml,冷却后加乙酸 2ml

D、百部 30g+水 500ml 煎煮 30 分钟,用双层纱布过滤后 将药液挤出。药渣+水 500ml 煎煮 15 分钟。两次药液浓缩至 100ml,冷却后加乙酸 2ml

E、百部 30g+水 500ml 煎煮 30 分钟,用双层纱布过滤后 将药液挤出。药渣+水 500ml 煎煮 30 分钟。两次药液浓缩至 100ml,冷却后加醋酸 1ml

答案: A

16、禁用热疗病人是()

- A、早产儿
- B、牙周炎早期
- C、末指循环不良
- D、胃肠痉挛
- E、老年病人

答案: B

17、查寄生虫卵应注意采集粪便的:

- A、脓血部分
- B、粘液部分
- C、边缘部分
- D、不同部分
- E、全部

答案: D

18、插胃管时病人出现呛咳、发绀,护士应

- A、立即拔出胃管
- B、嘱病人深呼吸
- C、指导病人做吞咽动作
- D、稍停片刻重新插入
- E、继续插入

答案: A

19、患者随意运动丧失,对言语及光线刺激无反应,伴排便、排尿失禁,下列护理措施哪项不妥()

- A、给予一级护理

- B、取下义齿,定时漱口
- C、使用床档,防止坠床
- D、留置导尿管
- E、定时翻身

答案: B

20、患者,男性,55岁。因关节疼痛需每日红外线照射一次,在照射过程中观察皮肤出现紫红色,此时护士应该(2012年)

- A、停止照射,改热敷
- B、立即停止照射,涂凡士林保护皮肤
- C、适当降温,继续照射
- D、改用小功率灯,继续照射
- E、改大功率灯,继续照射

答案: B

21、某肺心病患者因呼吸困难,行气管切开,护士为其吸痰时,正确的操作是

- A、动作迅速,由浅到深,以保证充分吸痰
- B、动作轻柔并向上提拉,左右旋转
- C、动作宜慢并上下提拉,左右旋转
- D、动作轻柔,由上而下,边插入边抽吸
- E、动作快并上下提拉,左右旋转

答案: B

22、患者,男。36岁,因车祸内脏破裂大出血而欲行急诊手术。去手术室之前,护士遵医嘱迅速为患者建立了一个静脉通道并进行输血治疗。因时间紧迫,护士从血库取回血后,为了尽早将血输给患者,便将血袋放在热水中提温,5min后便给患者输入。当输入10min后,患者头部胀痛,并出现恶心呕吐,腰背部剧痛。接下来,当大量血红蛋白进入血浆后,此反应致死的原因是

- A、心力衰竭
- B、呼吸衰竭
- C、肾衰竭
- D、过敏性休克
- E、感染性休克

答案: C

23、患者女,23岁。因化脓性扁桃体炎于今年6月3日就诊。无过敏史。即用当天配制的青霉素皮试液常规注入0.1毫升(内含40U)5分钟后患者突然晕厥倒地。医生医嘱:肌内注射0.1%盐酸肾上腺素0.5ml,肾上腺素治疗过敏性休克的机制是(护考真题):

- A、 激动 α 受体, 促进血管收缩, 增加心排出量
- B、 激动 M 受体, 支气管平滑肌舒张
- C、 激动 α 受体, 支气管粘膜血管收缩
- D、 镇静催眠, 减轻氧气耗损
- E、 兴奋中枢, 使呼吸加深加快

答案: A

24、 休克病人经积极治疗, 每小时尿量大于多少即表明休克纠正(护考真题):

- A、 10ml
- B、 15ml
- C、 20ml
- D、 25ml
- E、 30ml

答案: E

25、 小量不保留灌肠时, 可采用“1、2、3”溶液, 即

- A、 50%硫酸镁 50ml, 甘油 60ml, 温开水 70ml
- B、 50%硫酸镁 40ml, 甘油 50ml, 温开水 60ml
- C、 50%硫酸镁 60ml, 甘油 70ml, 温开水 80ml
- D、 50%硫酸镁 30ml, 甘油 60ml, 温开水 90ml
- E、 50%硫酸镁 30ml, 甘油 50ml, 温开水 70ml

答案: D

26、 患儿, 2 岁, 因肺炎入院, $T39.8^{\circ}\text{C}$, $P122/\text{min}$, 呼吸 $25/\text{min}$ 。医嘱: 青霉素 40 万 U, im, Qid; 维生素 C 0.2g, 止咳糖浆 5ml, 口服, Tid, 青霉素皮试阴性后, 护士为其行肌肉注射, 部位应选择()

- A、 臀大肌
- B、 上臂三角肌
- C、 臀中、小肌
- D、 腹部
- E、 股外侧肌

答案: C

27、 口服给药注意事项中正确的是()

- A、 铁剂、阿司匹林宜饭前服
- B、 服止咳糖浆后宜多饮水
- C、 服磺胺类药物后宜多饮水
- D、 服强心苷类药物前先测血压
- E、 镇静安神药宜清晨空腹服用

答案：C

28、静脉输液引起发热反应的常见原因是()

- A、 输液量过多
- B、 输液速度过快
- C、 输液温度过低
- D、 输液时间过长
- E、 制剂不纯

答案：E

29、患者突然病情恶化,为抢救患者生命,需立即手术治疗,但短期内无法联系患者家属,此时合理的处理措施是

- A、 继续联系患者家属
- B、 联系患者单位
- C、 征求上级卫生管理部门意见
- D、 置之不理
- E、 由医院负责人决策

答案：E

30、灭头虱操作中,护士应()

- A、 严格执行无菌操作原则
- B、 防止灭虱液与头皮接触
- C、 观察患者有无皮肤过敏
- D、 将剪下的头发及时扔进污物箱
- E、 用纱布蘸百部酊、按顺序擦遍头发

答案：C

31、为昏迷患者行口腔护理时,不需准备的用物是()

- A、 棉球
- B、 开口器
- C、 弯止血钳
- D、 吸水管
- E、 治疗巾

答案：D

32、发生溶血反应最常见的原因是

- A、 血液储存过久
- B、 Rh 血型不合
- C、 输入异型血
- D、 血液震荡过剧

E、 体温过低或过高

答案： C

33、 患者, 女, 56 岁, 在路上行走时不慎绊倒, 手掌、 手腕部、 膝盖部挫伤。

局部处理方法错误的是

A、 局部制动

B、 抬高患肢

C、 血肿加压包扎

D、 早期局部热敷

E、 血肿若进行性增大, 需切开止血

答案： D

34、 最严重的输血反应是

A、 空气栓塞

B、 过敏反应

C、 溶血反应

D、 循环负荷过重

E、 枸橼酸钠中毒

答案： C

35、 下列哪项不符合压疮炎症浸润期的临床表现 ()

A、 受压表面呈紫红色

B、 皮下产生硬结

C、 浅层组织有脓液流出

D、 局部表皮松解剥脱

E、 常有水泡形成

答案： C

36、 患者, 女性, 42 岁。 因车祸入院, 吸氧时家属自行将氧流量调至 10L/分, 半小时后患者出现烦躁不安、 面色苍白、 进行性呼吸困难。 该患者最可能发生的情况是

A、 急性左心衰

B、 肺水肿

C、 肺气肿

D、 氧中毒

E、 气胸

答案： D

37、 肾盂肾炎病人, 尿液检查脓细胞, 尿颜色可呈现

A、 淡黄色

- B、棕色
- C、白色混浊
- D、乳白色
- E、深黄色

答案：C

38、下列不是输液目的选项是

- A、纠正水电解质失调
- B、增加血容量
- C、输入药物
- D、供给各种凝血因子
- E、利尿消肿

答案：D

39、李某, 35岁, 鼻唇沟处有一感染化脓灶, 以下护理措施中错误的是

- A、肌肉注射抗生素
- B、口服抗生素
- C、局部换药处理
- D、局部湿热敷
- E、局部涂抗生素药膏

答案：D

40、患者, 男, 72岁, 因冠心病间断发生左心衰竭 3年, 半天来与家人争吵后心悸、气短、不能平卧, 咳粉红色泡沫痰, 急诊入院, 体检:BP90/60mmHg, R28次/分, 神清, 坐位口唇发绀, 两肺满布湿啰音及哮鸣音。急诊护士应给予患者的吸氧方法是

- A、持续低流量吸氧
- B、间断低流量吸氧
- C、低流量酒精湿化吸氧
- D、高流量吸氧
- E、高流量酒精湿化吸氧

答案：E

41、患者, 男性, 50岁, 无吸烟史和肺部疾病史, 全麻下行肠道手术。术后麻醉未清醒, 呼吸时出现鼾声, 此时首先应该采取的措施是

- A、气管插管
- B、观察病情
- C、环甲膜穿刺
- D、托起患者下颌

E、吸痰,注射阿托品

答案: D

42、王女士,60岁,卧床3周,近日尾骶部皮肤破溃,护士仔细观察后认为是褥疮溃疡期。王女士发生褥疮最主要的原因是?()

- A、局部组织受压过久
- B、病原菌侵入皮肤组织
- C、皮肤受潮湿摩擦刺激
- D、机体营养不良
- E、局部皮肤水肿

答案: A

43、接受青霉素治疗的病人,如果停药几天以上,必须重新做过敏试验(护考真题):

- A、1天
- B、2天
- C、3天
- D、4天
- E、5天

答案: C

44、患者,男性,50岁。急性胰腺炎住院。医嘱:立即插胃管胃肠进行减压。如果在插管过程中,该患者出现恶心呕吐,护士首先应(2012年)

- A、立即拔出胃管以减轻反应
- B、嘱患者头向后仰
- C、加快插管速度以减轻反应
- D、暂停插管并嘱患者深呼吸
- E、继续插管并嘱患者做吞咽动作

答案: D

45、患者男性,78岁,因呼吸道疾病入院,有数颗牙齿缺失,宜采用

- A、半流质饮食
- B、软质饮食
- C、普通饮食
- D、流质饮食
- E、要素饮食

答案: B

46、属于试验饮食的是()

- A、高蛋白饮食

- B、 软质饮食
- C、 胆囊造影饮食
- D、 流质饮食
- E、 糖尿病饮食

答案： C

47、 李 XX, 女, 68 岁, 以开放性尺桡骨折而收住院治疗。 遵医嘱给 P. G80 万 U 肌注, 患者在皮试及第一次肌注青霉素后无任何不良反应, 次晨当给患者第二次肌注 P. G80 万 u 后, 约两分钟后患者即出现面色苍白、 冷汗、 心慌、 胸闷、 口唇青紫、 意识丧失、 大小便失禁等过敏性休克症状。 关于过敏性休克说法正确的是:

- A、 发生的原因是青霉素具有免疫原性, 进入人体后会引发过敏
- B、 患者出现的冷汗、 心慌、 胸闷、 口唇青紫等属于呼吸道梗阻的临床表现
- C、 意识丧失、 大小便失禁是因为患者休克导致脑组织缺氧
- D、 青霉素不易发生过敏反应, 其发生率在抗生素中最低
- E、 该患者自此以后不会再发生青霉素过敏

答案： C

48、 使用冰敷时, 为防止冻伤需要保护的部位是 (2015 年)

- A、 前额
- B、 颞部
- C、 头项
- D、 耳部
- E、 面颊

答案： D

49、 防止溶血反应发生的最重要的措施是: ()

- A、 输血前后用无菌等渗盐水输入
- B、 认真做好血型鉴定及交叉配血试验及核对工作
- C、 严格执行血液保存规则
- D、 输第二个献血者的血液时, 间隔输入无菌等渗盐水
- E、 输入库存血

答案： B

50、 患者女性, 32 岁, 贫血严重。 医嘱为该患者静脉输血, 其治疗目的是 ()

- A、 补充血容量
- B、 增加白蛋白
- C、 补充血红蛋白

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/585224043324011100>