

2023 年陕西省消化专科护士培训班理论

一、单选题

- 1 . 临床学习的目的 () [单选题] *
- A.理论知识的应用、 临床技能的发展、 提升患者满意度
 - B.理论知识的应用、 专业的社会化、 提升患者满意度
 - C.理论知识的应用、 临床技能的发展、 专业的社会化 V
 - D.临床技能的发展、 专业的社会化、 提升患者满意度
- 2 . 教学目标包括 () [单选题] *
- A.知识方面、 思维方面、 态度方面
 - B.知识方面、 思维方面、 技能方面
 - C.思维方面、 态度方面、 技能方面
 - D.知识方面、 态度方面、 技能方面,
- 3 . 解释、分析属于护理评判性思维的: () [单选题] *
- A.认知技能因素 ✓
 - B.心理因素
 - C.生理因素
 - D.态度情感因素
 - E.社会文化因素
- 4 . 专科护士的培养方式为 () [单选题] *
- A.系统化培训 ✓

B.阶段性培训

C.情景模拟培训

D.反向教学培训

5 .常说的六大营养素是指（） [单选题] *

A.益生菌、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质

8 .水、蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、矿物质

C.水、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、微量元素

D.水、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质 ✓

6 .平衡膳食：是指膳食中所含营养素及其比例，以下哪个是正确的？（） [单选题] *

A 膳食中含：蛋白质 15-20%、脂肪 20-25%、碳水化合物 55-60%充足的维生素和矿物质

B、蛋白质供能 15-20、脂肪供能 20-25%,碳水化合物供能 55-60%充足的维生素和矿物质 ✓

C.蛋白质供能 15-20%、脂肪供能 20-25%、碳水化合物供能 55-60%

D、蛋白质供能 15-20%、脂肪供能 20-25%、碳水化合物供能 55-60%,再加蔬菜水果

7 .营养治疗的 5 阶梯原则是（） [单选题] *

A.饮食-饮食+ONS-全肠内 TEN-TEN+PPN（部分肠外）-TPN 全肠外每一层次不能满足目标需要量的 60%

达到 5-7 天上一台阶。

8 .饮食+营养教育-饮食+ONS-全肠内 TEN-TEN+PPN（部分肠外）-TPN 全肠外每一层次不能满足目标

需要量的 60%达到 5-7 天上一台阶。 ✓

C.肠内营养不足（不能满足目标需要量的 60%达到 5-7 天）上一台阶即给肠外营养

D.饮食-饮食+ONS-全肠内 TEN-TEN-TPN 全肠外每一层次不能满足目标需要量的 60%达到 5-7 天上一台

阶。

- A.爬行脑、情绪脑、智慧脑
- B.爬行脑、情绪脑、视觉脑 ✓
- C.爬行脑、智慧脑、视觉脑
- D.智慧脑、情绪脑、视觉脑

9 . 肝衰竭分类，下面哪项错误：() [单选题] *

- A.急性肝衰竭
- B.亚急性肝衰竭
- C.慢加急肝衰竭
- D.慢性肝衰竭
- E.终末期肝衰竭 ✓

10 .()是中心静脉置管最严重的并发症 [单选题] *

- A.血管堵塞
- B.空气栓塞 ✓
- C.血管感染
- D.血管失供

11 . 文献检索时，下面的说法哪一项是错误的：() [单选题] *

- A.检索词选择应立足规范词，兼顾自由词
- B.使用符号作为通配符可以进行截词检索
- G 限定检索是扩大检索结果的方法 ✓
- D.采用字段限制方式检索篇名中有 CH1 的文献，规则为 ce11 [ti]

12 .撰写论文需要注意以下几项内容中，哪一项不合适() [单选题] *

A.数据来源于作者参与的研究项目, 真实可靠

B.有具体的研究过程

C.统计学方法使用正确、描述精准、能科学解释结论问题

D.伦理报告不是必须 ✓

13 .单纯性脂肪肝轻度的分级标准是 () [单选题] *

A.肝内脂质含量占肝脏湿重的 <5%

B.肝内脂质含量占肝脏湿重的 5%-10% ✓

C.肝内脂质含量占肝脏湿重的 10%-15%

D.肝内脂质含量占肝脏湿重的 15%-20%

14 .患者出现黑便, 评估其消化道出血量达到每日 () [单选题] *

A.15~30ml

B.30-50ml

C.50-100ml ✓

D.150~200ml

15 .抢救急性消化道出血患者时, 医嘱要求输血速度为 300~400 滴/分, 此时应将加压输血器的压力调整为

() [单选题] *

A.100-140mmHg

B.140~180mmHg ✓

C.180-220mmHg

D.220~260mmHg

16 . 轻、中型溃疡性结肠炎的治疗首选: () [单选题] *

A. 硫嘌呤

B. 地塞米松

C. 甲硝唑

D. 氨基水杨酸制剂 ✓

17 . 下列关于溃疡性结肠炎的叙述正确的是: () [单选题] *

A. 粪便多为糊状, 无脓血和粘液

B. 慢性病变可见结肠黏膜息肉样增生和管腔狭窄 ✓

C. 可有瘘管形成

D. 病变的好发部位是回盲部

18 . 正常微生物群按关系分可分为: () [单选题] *

A. 寄生菌与致病菌

B. 共生菌与原籍菌

C. 有益菌与致病菌

D. 共生菌与寄生菌 ✓

19 . 粪菌移植以下哪种疾病的治疗作用最确切 () [单选题] *

A. 肥胖

B. 炎症性肠病

C. 肿瘤

D. 难治性艰难梭菌感染 ✓

20 . 肝硬化病人一次放腹水一般不超过 () ml? () [单选题] *

A.1000

B.2000

C.3000√

D.5000

21 .PTCD 的引流袋要保持低于引流口至少 () cm () [单选题] *

A.20

B.30√

C.40

D.50

22 .PTCD 的引流管护理要点错误的是 () [单选题] *

A.选择合适引流管的固定方式以及引流管与引流袋的连接方式;

B.进行管道护理或者冲洗时,注意无菌操作,防止发生逆行感染。

C.每月更换抗反流引流袋,保持引流管通畅;√

D.尽量采取半卧位或斜卧位以利于引流;

23 .食管胃底静脉曲张内镜下治疗后多长时间禁饮食 () [单选题] *

A.24 小时√

B.48 小时

C.72 小时

D.7 天

24 .ERCP 术后常见的并发症不包括 () [单选题] *

A.出血

B.急性胰腺炎

C.黄回口重 ✓

D.胆囊炎

25 . 肝纤维化诊断的"金标准"是 () [单选题] *

A.影像学诊断

B.病理学诊断 (肝活检) ✓

C.血清学诊断

26 . 肝硬化患者最严重的并发症是 () [单选题] *

A.食管胃底静脉曲张破裂出血

B.肝性脑病 ✓

C.低血症

D.原发性肝癌

27 . 肝性脑病最早出现的临床表现是 () [单选题] *

A.昏睡,呼之不应

B.锥体束征阳性

C.视物模糊

D.角弓反张

E.性格行为改变 ✓

28 . 哪一项不是食管狭窄扩张术的并发症 () [单选题] *

A.穿孔

B.感染

C.出血

D.癌变 ✓

E.食管气管瘘

29 . 胃溃疡疼痛规律的特点是（） [单选题] *

A 餐后 2-3h 出现，下餐前缓解

B.餐后 2-3h 出现，进餐缓解

33. 常餐量40感腹胀,食后发腹部饱胀血年黑每次进套

C. 餐后 1/2-1h 出现, 下餐前缓解 V

D. 夜间痛、饥饿痛

30. 超声内镜禁忌症不包括以下哪种情况:) [单选题]

A. 心肺功能不全者

B. 胃肠穿孔者

C. 精神异常不能配合者

D. 妊娠者 ✓

E. 脊柱畸形患者;

F. 消化道大出血患者。

31. 以下哪个是小肠镜检查的绝对禁忌症() [单选题]

A. 多次手术史

B. 孕妇

C. 年龄小于 12 岁

D. 小肠梗阻

E. 严重心肺等器官功能障碍者 ✓

32. 肠易激综合征特征性的临床表现是() [单选题]

A. 腹痛或腹部不适伴排便习惯改变 ✓

B. 腹痛及便血

C. 腹胀及里急后重

D. 大便变细

E. 便秘及排便困难

纳差，精神可，查体：腹软，无压痛、反跳痛、肌紧张，肝脾未触及，血常规、肝肾功未见异常，该患者的诊断

是（） [单选题] *

A.溃疡性结肠炎

B.功能性消化不良 ✓

C.肠易激综合征

D.胃癌

E.胃食管反流病

34. 女性患者，上腹部腹胀4个月，上消化道造影未见异常，此时缓解腹胀最有效的药物是（） [单选题] *

A.抑酸药

B.抗幽门螺旋杆菌药

C.阿司匹林

D.促胃动力药 ✓

E.硝酸甘油

35. 患者女性，41岁，诊断为“溃疡性结肠炎”收住入院，对此类患者饮食护理应注意（） [单选题] *

A.高热量、高脂肪、高盐

B.高热量、富含营养、少纤维素 ✓

C.高热量、高维生素、高盐

D.低热量、低蛋白、多渣

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/586011154240010043>