

肩凝症的护理查房



| CATALOGUE |

目录

- 肩凝症概述
- 肩凝症的护理评估
- 肩凝症的护理措施
- 肩凝症的康复训练
- 肩凝症的预防与保健
- 肩凝症的病例分享与讨论



01

肩凝症概述

定义与症状



定义


肩凝症，也称为肩周炎，是一种常见的肩关节疾病，主要表现为肩关节周围疼痛和僵硬，影响患者的日常生活和工作。



症状

肩凝症的症状包括肩部疼痛、僵硬、活动受限等，疼痛可放射至颈部、上肢等部位，夜间疼痛加重，影响睡眠。

病因与病理



病因

肩凝症的病因较为复杂，可能与年龄、慢性劳损、外伤、风湿病等因素有关。其中，年龄是最常见的病因之一，随着年龄的增长，肩关节周围的软组织发生退行性变，容易引起肩凝症。

病理

肩凝症的病理过程主要包括肩关节周围软组织的炎症、粘连和挛缩，导致肩关节僵硬和疼痛。随着病情的发展，关节囊和肩袖组织可能发生纤维化，进一步加重病情。

诊断与鉴别诊断

诊断

根据患者的症状、体征和影像学检查结果，可以诊断肩凝症。影像学检查包括X线、CT和MRI等，可以帮助医生了解患者的肩关节结构和软组织情况。

鉴别诊断

医生需要与其他可能导致肩部疼痛的疾病进行鉴别诊断，如肩袖损伤、颈椎病、胸廓出口综合征等。这些疾病的治疗方法和预后各不相同，因此准确的鉴别诊断至关重要。





02

肩凝症的护理评估



疼痛评估

疼痛部位

评估患者疼痛的具体位置，是肩部前方、后方还是侧方，以及疼痛是否放射至其他部位。



疼痛程度

使用疼痛评分量表（如VAS评分）评估患者的疼痛程度，以便了解疼痛对患者的日常生活和工作的影响。



疼痛性质

了解疼痛是钝痛、锐痛还是牵拉痛，以及疼痛的发作频率和持续时间。



功能评估

活动范围

评估患者肩关节的活动范围，包括前屈、后伸、外展、内收、外旋和内旋等动作，以了解肩关节的活动受限程度。



肌肉力量

评估患者肩部肌肉的力量，如冈上肌、冈下肌和小圆肌等，以了解肌肉力量的减弱程度。



日常生活能力

了解患者完成日常生活活动的的能力，如穿衣、洗澡、梳头等，以便评估肩凝症对患者生活的影响。

心理评估


焦虑和抑郁程度

使用焦虑和抑郁评分量表评估患者的心理状态，以了解疼痛和功能障碍对患者心理健康的影响。

应对方式

了解患者面对肩凝症时的应对方式，如积极治疗、寻求支持、调整生活方式等，以便为患者提供针对性的护理措施。



The background features a soft gradient from light purple to light blue. Several 3D-style rings with a rainbow-like color gradient are scattered across the scene. In the center, the number '03' is displayed in a large, bold, black font, enclosed within a thin black square border. Two thin black lines extend from the top-left and top-right corners of this square towards the left and right edges of the frame, respectively.

03

肩凝症的护理措施

疼痛护理

01



疼痛评估



对患者的疼痛程度进行评估，了解疼痛的性质、部位和持续时间，为后续护理提供依据。

02



疼痛缓解



采取适当的疼痛缓解措施，如冷敷、热敷、按摩等，以减轻患者的疼痛感。

03



药物管理



遵医嘱给予患者适当的止痛药或抗炎药，并注意观察药物的疗效和不良反应。



功能锻炼指导



肩关节活动度训练

指导患者进行肩关节的前屈、后伸、内收、外展等动作，以增加关节的活动范围和灵活性。



肌力训练

鼓励患者进行肩部肌肉的等长收缩和等张收缩训练，以增强肌肉力量和耐力。



日常活动指导

指导患者进行日常生活活动，如穿衣、梳头、洗脸等，以促进肩关节的功能恢复。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/586133114131010053>