

2022-2023年副主任医师(副高)-普通外科学(副高)考试题库全真模拟卷3套(含答案)

(图片大小可自由调整)

全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买!

第1卷

一、综合考核题库(共30题)

1. 移动性浊音阳性见于腹腔内

- A、积液
- B、积血
- C、积气
- D、粘连
- E、积脓

正确答案: A,B,E

2. 股骨颈骨折三刃钉内固定术后可能引起股骨头坏死的最可能原因是()

- A、股骨颈头下型骨折
- B、术式选择不当
- C、X线表现 Pauwels 角大于 70°

- D、破坏髓腔内的血液供应
- E、X线表现颈干角大于 127°

正确答案: D

3. 男23岁。肛周肿痛3天伴发热，有里急后重感。肛周红肿有波动感进一步确诊的方法是

- A、直肠镜检查
- B、穿刺

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

住在富人区的她

C、纤维结肠镜检查

- D、肛诊
- E、钡灌肠

正确答案: B

诊断考虑

- A、痔疮
- B、肛瘘
- C、肛周脓肿
- D、肛裂
- E、直肠癌

正确答案: C

主要治疗方案

- A、抗生素
- B、温水坐浴
- C、理疗
- D、口服缓泻剂
- E、脓肿切开引流

正确答案: E

4. 属于骨折早期并发症的是()

- A、感染
- B、损伤性骨化
- C、创伤性关节炎
- D、骨筋膜室综合征
- E、关节僵硬

正确答案: D

5. 患者男，33岁，因“下腹部外伤后腹痛，不能排尿30 min”来诊。30 min前患者被人踢伤下腹部，当时膀胱处于憋尿状态，感下腹剧痛，不能自行排尿。查体：上腹部无明显压痛，移动性浊音(一)，耻骨上区皮下波动感，阴囊无明显肿胀。

最可能的诊断是

- A、输尿管损伤
- B、腹膜内型膀胱破裂
- C、腹膜外型膀胱破裂
- D、前尿道损伤
- E、后尿道损伤

正确答案: C

为明确诊断最有价值的诊断方法是

- A、导尿试验

- B、膀胱造影
- C、泌尿系统 CT
- D、泌尿系统 MRI
- E、静脉尿路造影

正确答案: B

6. 女，25岁，右肾结核行右肾切除抗结核治疗半年多，尿痛缓解，但尿频加重，每晚7~8次，静脉尿路造影见左肾显影尚好，仅伴轻度肾积水及膀胱挛缩，尿常规白细胞0~2/HP，现治疗应选择

- A、左肾造瘘术
- B、继续抗结核治疗
- C、左输尿管皮肤造瘘术
- D、膀胱扩大术
- E、膀胱造瘘术

正确答案: D

7. 煮沸法，杀灭带芽胞的细菌所需时间为()

- A、10 分钟
- B、20 分钟
- C、30 分钟
- D、60 分钟
- E、120 分钟

正确答案: D

8. 要确诊上述患者的病因，最简便的影像学检查是

- A、CT
- B、MRI
- C、B超
- D、KUB
- E、膀胱造影检查

正确答案: C

9. 骨折急救处理时，下列哪项是最重要的

- A、立即复位固定
- B、清洁裸露骨折端
- C、简单妥善固定患肢
- D、都需使用止血带
- E、清洁伤口后固定患肢

正确答案: C

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

住在富人区的她

10. 女，29岁，产后半年，母乳喂养，右腕关节桡侧疼痛，桡骨茎突表面局限性压痛，可触及痛性结节，Finkel-stem 征(+)，诊断为()

- A、风湿性关节炎
- B、类风湿性关节炎
- C、腕关节结核
- D、桡骨茎突狭窄性腱鞘炎
- E、痛风

正确答案: D

11. 右髌外伤后患肢呈55° 外旋畸形，最可能的诊断是

- A、股骨上段骨折
- B、股骨颈骨折
- C、髌关节前脱位
- D、股骨转子间骨折
- E、髌臼骨折

正确答案: D

12. 骨盆骨折合并尿道完全断裂，最好的处理是()

- A、采用橡皮筋尿管导尿
- B、采用金属导尿管导尿
- C、尿道吻合术
- D、膀胱造瘘
- E、固定骨盆避免加重尿道损伤

正确答案: C

13. 患者男，38岁，反复呕血，黑便2d 急诊入院。5年前患“乙肝”。脉搏120次/min，血压11.7/9.1kPa(90/70mmHg)，意识淡漠，巩膜中度黄染。腹膨隆，移动性浊音阳性，血清胆红素42.75 μ mol/L(2.5mg/dl)，白蛋白25g/L(2.5g/dl)，球蛋白35g/L(3.5g/dl)，合理的处理包括

- A、三腔两囊管压迫
- B、快速补液、输血
- C、急诊行门腔静脉分流术
- D、静脉滴注垂体加压素
- E、纤维内镜下注射硬化剂

正确答案: A, B, D, E

14. 病理改变在肾脏，临床表现为膀胱刺激症状，最常发生此种情况的泌尿系疾病是

- A、肾肿瘤
- B、鹿角型肾结石
- C、肾损伤
- D、泌尿系结核
- E、急性肾炎

正确答案：D

15. 腹股沟管的走行方向应向

- A、外、下、浅
- B、外、上、浅
- C、内、上、浅
- D、内、下、浅
- E、以上都不对

正确答案：D

16. 目前治疗膀胱结石的方法有

- A、开放取石术
- B、体外冲击波碎石术
- C、经膀胱镜碎石术
- D、药物排石
- E、经皮穿刺取石术

正确答案：A, B, C

17. Peutz-Jegher 综合征指的是

- A、口腔黏膜、口唇、双侧手掌和足趾色素沉着
- B、胃肠道多发息肉
- C、慢性腹泻
- D、肠套叠
- E、以上都是

正确答案：A, B

18. 男，65岁，因右上肢放射痛伴手指麻木，动作不灵活两年就诊，检查发现颈肩部压痛。神经牵拉试验及压头试验阳性，右上肢桡侧皮肤感觉减退，握力减弱，肌张力减低，最可能的诊断是

- A、交感神经型颈椎病
- B、脊髓型颈椎病
- C、椎动脉型颈椎病
- D、神经根型颈椎病

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

住在富人区的她

E、混合型颈椎病

正确答案：D

19. 患者男，44岁，来院体检。膀胱B型超声：膀胱右壁乳头状新生物，直径2 cm。

下一步最佳的处理方案是

- A、膀胱镜
- B、尿脱落细胞学检查
- C、定期多次表阿霉素膀胱灌注治疗
- D、诊断性TURBT术
- E、光动力学治疗

正确答案：D

患者诊断为膀胱肿瘤，在连续硬膜外麻醉下行TURBT术，最好的手术切除方法为

- A、顺行切除法逐块切除肿瘤
- B、逆行切除法逐块切除肿瘤
- C、垂直点切法逐块切除肿瘤
- D、直接将肿瘤进行气化
- E、直接从肿瘤基底部切除肿瘤

正确答案：A

术中出现严重的闭孔神经反射，不适宜的处理措施是

- A、降低电切电流强度，完成手术
- B、改用等离子双极电切术
- C、留取组织活检标本后，改用气化电极行肿瘤气化术
- D、留取组织活检标本后，改用激光切除肿瘤
- E、尝试闭孔神经封闭后再手术

正确答案：C

关于闭孔神经反射的发生，叙述正确的是

- A、尿道及膀胱腔内局部麻醉可以避免闭孔神经反射的发生
- B、蛛网膜下腔麻醉可以避免闭孔神经反射的发生
- C、连续硬膜外麻醉可以避免闭孔神经反射的发生
- D、骶丛阻滞麻醉可以避免闭孔神经反射的发生
- E、局部麻醉、蛛网膜下腔麻醉、连续硬膜外麻醉和骶丛阻滞麻醉都不能避免闭孔神经反射的发生

正确答案：E

患者在TURBT手术进行过程发生闭孔神经反射，并导致膀胱壁全层穿孔，下一步最合理的处理方法为

- A、立即终止手术，留置导尿管持续引流，创面愈合后行二期手术
- B、控制膀胱容量，降低电流强度，尝试完成手术
- C、立即改开放性手术探查
- D、术野进行彻底止血后，回病房即刻行丝裂霉素C膀胱灌注
- E、立即终止手术，改用光动力治疗

正确答案：B

经积极处理，患者安全度过手术期，术后除长期定期随访外，下一步最佳的治疗方案是

- A、单纯定期随访
- B、术后24 h内即刻膀胱灌注1次丝裂霉素C
- C、术后定期多次行丝裂霉素C膀胱灌注治疗
- D、再次TURBT术
- E、光动力学治疗

正确答案：C

- C、压力性尿失禁
 - D、完全性尿失禁
 - E、急迫性尿失禁
 - F、OAB
 - G、小膀胱
 - H、膀胱出口梗阻
- 正确答案：C,F

为明确诊断可建议的检查包括

20. 异位肾出现肾积水的原因有

- A、肾盂输尿管连接部梗阻
- B、尿液反流
- C、肾旋转不良
- D、一般较正常肾小
- E、输尿管膀胱连接处梗阻

正确答案：A, B, C, E

21. 患者男，34岁，因ED做血管活性药物试验，阴茎海绵体注射前列第尔 $10\ \mu\text{g}$ ，5 min后阴茎勃起坚硬，持续35 min，结果说明患者为

- A、心理性ED
- B、动脉性ED
- C、静脉性ED
- D、神经性ED
- E、需要进一步超声多普勒检查

正确答案：A,D

22. 患者女，48岁，因“绝经后腹压增加及起立活动时频繁尿失禁2年”来诊。需要携带尿垫生活，且伴有尿频、尿急等症状，无排尿困难、尿不尽感、血尿等。无神经系统疾病病史，无盆腔手术史。

考虑的诊断有

- A、膀胱阴道瘘
- B、输尿管阴道瘘

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

住在富人区的她

- A、妇科盆底检查
- B、压力诱发试验
- C、肾、输尿管和膀胱（KUB）X线片
- D、尿道探子检查
- E、尿流率和残余尿
- F、充盈性膀胱测压
- G、膀胱尿道造影
- H、棉签试验

正确答案：A, B, E, F, G, H

- D、ST段抬高
 - E、出现U波
- 正确答案：E

对此电解质紊乱的治疗应

- A、利尿
- B、补钾
- C、补等渗盐水

关于患者的治疗，叙述正确的有（提示 尿动力学：逼尿肌过度活动和尿动力学压力性尿失禁；残余尿为0 ml。）

- A、首选尿道中段吊带术
- B、首选盆底肌训练
- C、可先进行OAB的处理
- D、抗胆碱药治疗逼尿肌过度活动
- E、直接手术处理压力性尿失禁，术后OAB会自动消失
- F、待OAB稳定后重新评估尿失禁情况
- G、膀胱扩大手术
- H、尿流改道

正确答案：B, C, D, F

23. 患者男性，50岁，腹痛呕吐停止排便排气5天，查体：腹胀，肠鸣音亢进，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，血钾

3.1 mmol/L ，血钠 136 mmol/L ，血氯 99 mmol/L

病人存在的电解质紊乱为

- A、低钾血症
- B、高钾血症
- C、低钠血症
- D、高钠血症
- E、低氯血症

正确答案：A

患者的心电图检查可出现

- A、T波高尖
- B、出现QS波
- C、P波消失

- D、补低渗盐水
- E、补高渗盐水

正确答案: B

在纠正电解质紊乱时要保证尿量大于

- A、10ml
- B、20ml
- C、30ml
- D、40ml
- E、50ml

正确答案: D

为明确诊断，应进行的检查是

- A、纤维胃镜
- B、钡灌肠
- C、B超
- D、ERCP
- E、CT

正确答案: A

最可能的诊断是

24. 女性，60岁，直肠癌术后一年复发，广泛转移，盆腔内形成巨大包块。近24小时无尿，寒战，体温39℃。B超发现双肾明显积水。可供选择的合理治疗包括

- A、输液抗感染
- B、利尿
- C、在B超引导下经皮双侧肾穿刺造瘘
- D、经膀胱镜放置双侧输尿管J形导管
- E、手术解除输尿管梗阻

正确答案: A,C,D

25. 尤因肉瘤的临床症状需与下列哪种疾病鉴别()

- A、骨纤维发育不良
- B、慢性骨髓炎
- C、骨结核
- D、骨纤维肉瘤
- E、骨肉瘤

正确答案: B

26. 女性，45岁，食欲减退，剑突下隐痛1年，伴明显消瘦，持续大便隐血阳性2个月，近1周呕吐隔夜食物。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

住在富人区的她

- A、胃溃疡
- B、十二指肠溃疡
- C、应激性溃疡
- D、十二指肠淤积症
- E、胃癌

正确答案: E

该病人最适合的治疗方式是

- A、补液、止血
- B、全胃切除术
- C、十二指肠溃疡旷置+胃空肠吻合
- D、胃大部切除术
- E、胃癌根治术

正确答案: E

27. 关于骨巨细胞瘤的特点，下列哪项是错误的

- A、属于潜在恶性骨肿瘤
- B、多见于成人
- C、病灶多在骨干中段
- D、肿瘤可穿破骨皮质，侵入软组织
- E、局部刮除后容易复发

正确答案: C

28. 关于无菌术的叙述哪项正确()

- A、手术室应两周彻底清扫一次
- B、铜绿假单胞菌感染者术后，用40%甲醛+高锰酸钾熏蒸(每100m用40%甲醛200ml+高锰酸钾100g) C、气性坏疽手术后，应用紫外线消毒
- D、乙肝阳性病人手术后，手术室应喷洒0.05%次氯酸钠溶液，20分钟后擦拭
- E、手术室空气消毒最常用的是40%甲醛

正确答案: B

29. 肾癌CT的征象有

- A、肾形扩大，向肾实质外突出
- B、CT值比肾实质略低，而增强时明显低于肾实质
- C、CT值-10~15 HU
- D、增强扫描时明显高于肾实质
- E、常为双侧病变

正确答案: A, B

30. 患者，男，40岁，1年前右股骨颈骨折行三翼钉内固定术。1个月前拔钉后右髋痛不能负重。摄片示：骨不连，但股骨头外形尚未改变。应首选的治疗方案为()

- A、髋"人"字型石膏固定3个月
- B、闭合复位，加压螺丝钉内固定
- C、人工全髋置换
- D、超关节外固定支架固定
- E、内固定+带血管蒂的骨移植

正确答案: E

第2卷

一. 综合考核题库(共30题)

1. 男，25岁。被汽车撞伤下腹部及会阴部，检查发现骨盆骨折、腹膜后血肿、后尿道损伤，血压

9.33/6.67kPa(70/50mmHg)

首先的处理是：

- A、骨盆牵引固定
- B、清创
- C、抗休克
- D、处理尿道损伤
- E、清除腹膜后血肿

正确答案: C

其次的处理是：

- A、骨盆牵引固定
- B、清创
- C、抗休克
- D、处理尿道损伤
- E、清除腹膜后血肿

正确答案: A

假设信息)如合并直肠损伤，应采取的措施是：

- A、直肠修补
- B、清创
- C、乙状结肠造瘘
- D、直肠造瘘
- E、引流

正确答案: C

2. 56岁，男性患者，自述间歇、无痛性肉眼血尿3个月来门诊就诊。查体：一般状态好，轻度贫血貌，双肾未触及，膀胱区叩诊清音。该病例临床诊断首先考虑

- A、尿路感染
- B、前列腺增生症
- C、泌尿系结核
- D、膀胱结石
- E、泌尿系肿瘤，以膀胱肿瘤可能性大

正确答案: E

3. 胃、十二指肠溃疡急性穿孔，不常见于()

- A、胃或十二指肠后壁的穿透性溃疡
- B、幽门附近的胃或十二指肠前壁溃疡
- C、胃小弯前壁或十二指肠球部外侧壁溃疡
- D、胃窦部或十二指肠球部内侧壁溃疡
- E、高位胃溃疡或球后壁溃疡

正确答案: A, C, D, E

4. 女性，53岁。主诉查体发现肝脏占位1个月入院。无恶心、发热，有时觉上腹痛、腹胀，无皮肤、巩膜黄染，无消瘦。否认肝炎和结核病史。

为进一步明确诊断，首选检查是()

- A、腹部增强CT
- B、腹部MRI 平扫+增强

正确答案: D

最后的处理是:

- A、骨盆牵引固定
- B、清创
- C、抗休克
- D、处理尿道损伤
- E、清除阻膜后血肿

C、肝脏超声造影检查

D、介入下选择性动脉造影

E、肝脏 ECT 核素扫描

F、PET-CT 检查

正确答案: A,B

[提示] 该患者增强 CT 和 MRI 检查提示肝脏有多发病变, 其中右后叶的占位病灶约 9.8cm×6.2cm×5cm 大小; 结果见图101~图108。

请问该患者的临床诊断应考虑()

- A、右后叶肝恶性淋巴瘤
- B、右后叶肝海绵状血管瘤
- C、胆囊结石
- D、肝囊肿
- E、右后叶血管瘤
- F、肝血管内皮细胞瘤
- G、右后叶FNH

正确答案: B,C,D

[提示] 该患者入院化验结果
ALT17.6U/L, AST13.7U/L, Alb45.7g/L, TB10.4 μ mol/L, DB4.5 μ mol/L, GGT72.9U/L ;
Hb153g/L,WBC7.28 \times 10/L,PLT169 \times 10/L;PT16.6s,APTT37.5s,INR1.09PTA101.3%,Fib1.9 μ g/ml;
AFP2.4ng/ml;CA19-97.8U/ml;CEA0.8U/ml;CA12510.2U/ml。该患者的合理处理方式为()

- A、开腹右肝肿瘤切除+胆囊切除
- B、腹腔镜下右肝肿瘤RFA+胆囊切除
- C、肝囊肿去顶开窗术
- D、超声引导下经皮射频消融右肝肿瘤
- E、肝右后叶切除术
- F、介入栓塞治疗
- G、三维适形放疗
- H、观察随访

正确答案: A,C

[提示] 该患者术后病理报"肝海绵状血管瘤;慢性胆囊炎、胆囊结石,胆囊底部腺肌瘤病"。关于胆囊腺肌瘤的描述,下列错误的是()

- A、胆囊底部最多见
- B、若无症状时可观察
- C、常合并胆囊炎
- D、常合并胆囊结石
- E、罗-阿窦是诊断的重要依据
- F、是一种癌前病变

正确答案: B

5. 诊断肾结核最可靠的依据是()

- A、尿中找到抗酸杆菌
- B、尿液中大量脓细胞,尿呈酸性
- C、附睾扪及结节
- D、尿培养结核分枝杆菌阳性
- E、慢性膀胱刺激症状

正确答案: D

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

住在富人区的她

6. 胆总管结石梗阻的典型临床表现包括

- A、胆囊肿大
- B、寒战、发热
- C、里急后重
- D、黄疸
- E、上腹绞痛

正确答案：A, B, D, E

E、硬化性胆管炎致胆法淤滞

正确答案：B

以下哪项检查对诊断最有帮助

- A、肝功能检查
- B、上腹部CT检查
- C、甲胎蛋白检查**

7. 患者左侧肾盂输尿管交界处狭窄，肾功能中度受损，最好的治疗方法是（ ）

- A、肾造瘘术
- B、肾切除术
- C、肾盂成型术
- D、经尿道置入双"J"导管内引流
- E、应用扩张肾血管药保护肾功能

正确答案：C

8. 低血容量性休克的特点是

- A、低心排出量
- B、低中心静脉压
- C、低血压
- D、外围血管阻力降低
- E、全血或血浆丢失

正确答案：A, B, C, E

9. 男性，45岁，出现皮肤、巩膜黄染1个月余，并进行性加重。无发热、腹痛。粪便呈陶土色，成形，尿外观呈"浓茶"样。

最可能的诊断是

- A、胆囊颈结石压迫胆总管
- B、壶腹周围癌
- C、胆总管下端结石嵌顿
- D、癌肿压迫肝总管

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/587151065031006063>