

内科学基础知识试题（附答案）

1. 关于体温的描述，不正确的是
 - A. 一般腋窝温度比直肠高
 - B. 女性排卵时体温略降低，排卵后体温平均升高 0.3°C 以上
 - C. 女性在月经前和妊娠期体温略高于正常
 - D. 低体温患者也会有危险
 - E. 每天 24 小时体温波动一般不超过 1°C
2. 出现皮肤、巩膜发黄时，首先应考虑的检查是
 - A. 肝胆 B 超
 - B. 血清胆红素检测
 - C. ALT、AST、ALP、GGT 等与肝功能有关的血清酶检测
 - D. 血浆蛋白检测
 - E. 尿胆红素、尿胆原检测
3. 患者处于持续熟睡状态，不易唤醒，强烈刺激后可以唤醒，醒后不能正确回答问题或答非所问，之后很快又入睡。此种意识障碍程度属于
 - A. 嗜睡
 - B. 意识模糊
 - C. 昏睡
 - D. 浅昏迷
 - E. 深昏迷
4. 关于眼部体征的描述，错误的是
 - A. 急性结膜炎多有结膜充血
 - B. 斜视可能是先天性的
 - C. 浸润性突眼是甲状腺功能减退的特殊临床类型
 - D. 脑疝常有双侧瞳孔不等大
 - E. 虹膜炎可以有瞳孔不规则体征
5. 关于体位对心脏杂音的影响，正确的是
 - A. 从卧位迅速站立可使梗阻性肥厚型心肌病的杂音减弱
 - B. 前倾坐位易于闻及主动脉瓣关闭不全的叹气样杂音

- C. 仰卧位可使二尖瓣、三尖瓣、肺动脉瓣关闭不全的杂音减弱
- D. 下蹲位迅速站立可使二尖瓣狭窄的心脏杂音增强
- E. 左侧卧位可使二尖瓣关闭狭窄杂音减弱
6. 下列有关脾大的描述，不正确的是
- A. 触诊时脾缘不超过肋下 2cm 为轻度肿大
- B. 超过 2cm 并在脐水平线以上，不论有无过前正中线，均为中度肿大
- C. 超过脐水平线或前正中线为高度肿大
- D. 第 I 线为左锁骨中线与肋缘交点至 脾下缘的距离
- E. 第 m 线为脾大超出正中线时，脾右缘与前正中线的距离
7. 某患者脊柱侧弯，以下病因可能性最小的是
- A. 儿童发育期坐、立姿势不良
- B. 椎间盘突出
- C. 脊髓灰质炎后遗症
- D. 先天性脊柱发育不全
- E. 佝偻病
8. 下列选项中，病变可导致左侧瞳孔直接对光反射消失， 间接对光反射存在的是
- A. 左侧视神经
- B. 右侧视神经
- C. 视觉中枢
- D. 右侧动眼神经
- E. 左侧动眼神经
9. 下列选项中属于浅反射的是
- A. 肱二头肌反射
- B. 肱三头肌反射
- C. 跟腱反射
- D. 跖反射
- E. 膝反射
10. 关于糖皮质激素的作用机制，不正确的是
- A. 抑制免疫应答，抗变态反应

- B. 抑制葡萄糖摄取和利用，增加糖异生，使血糖升高
 - C. 抑制蛋白质合成，促进蛋白质分解
 - D. 促进脂肪分解，抑制脂肪合成，使脂肪重新分布，集中于面、颈、躯干部
 - E. 保钾排钠，升高血钙
11. 胃的溃疡与糜烂的根本区别，主要是指
- A. 溃疡缺损超过黏膜肌层
 - B. 溃疡的直径比糜烂大
 - C. 溃疡 HP 感染率比糜烂高
 - D. 溃疡愈合时间比糜烂长
 - E. 溃疡比糜烂更容易复发
12. 慢性阻塞性肺疾病最常见并发症是
- A. 慢性支气管炎
 - B. 支气管扩张
 - C. 肺癌
 - D. 慢性肺源性心脏病
 - E. 肺纤维化
13. 以下选项中，引起 II 型呼吸衰竭的最常见的疾病是
- A. 重症肌无力
 - B. 脊柱侧弯
 - C. 气胸
 - D. 慢性阻塞性肺疾病
 - E. 大量胸腔积液
14. 有关肺动脉高压的叙述，不正确的是
- A. 可导致慢性肺源性心脏病
 - B. 肺动脉瓣区第二心音亢进
 - C. 与主动脉瓣区第二心音亢进无关
 - D. Austin-Flint 杂音的病理生理基础
 - E. 发生右向左分流的先天性心脏病是导致艾森曼格综合征的病理生理基础
15. 肺功能可表现为阻塞性通气功能障碍的疾病是

- A. 胸廓畸形
 - B. 重症肌无力
 - C. 严重鸡胸
 - D. 支气管哮喘
 - E. 特发性肺间质性纤维化
16. 确诊肺结核病的主要依据是
- A. PPD 试验呈强阳性
 - B. 有结核病的密切接触史
 - C. 痰结核分枝杆菌检查阳性
 - D. 有典型的结核中毒症状
 - E. 肺部 X 线的浸润阴影
17. 按照阻塞性肺气肿累及肺小叶的部位，将阻塞性肺气肿分为三类，其中最常见的类型是
- A. 假小叶型
 - B. 小叶中央型
 - C. 全小叶型
 - D. 混合型
 - E. 结节型
18. 为防止氨茶碱中毒，支气管哮喘患者的氨茶碱与下列药物合用，应减少氨茶碱用量的是
- A. 氨溴索
 - B. 色苷酸钠
 - C. 喹诺酮类
 - D. 糖皮质激素
 - E. 白三烯调节剂
19. 慢性肺源性心脏病患者，以下选项不引起肺动脉高压的常见因素是
- A. CO_2 潴留
 - B. 吸气障碍
 - C. 肺泡减少

D. 电解质紊乱

E. 肺血管减少

20. 典型结核结节是肺结核特征性病理改变，下列说法正确的是

A. 结核结节出现在机体抵抗力较低、病变初期

B. 属于炎性渗出性病变

C. 属于化脓性病变

D. 属于肉芽肿病变

E. 由上皮样细胞、淋巴细胞、郎汉斯细胞和成纤维细胞组成，中间是干酪样坏死

21. 下列不是舒张性心力衰竭的临床特点的是

A. 单纯性舒张性心力衰竭可见于冠心病和高血压心脏病心功能不全早期

B. 可有左心房扩大、左心室壁肥厚

C. $E/A < 1$

D. 左心室射血分数 (LVEF) < 0.40

E. 严重舒张性心力衰竭见于限制性心脏病、肥厚型心肌病

22. 急性心肌梗死的主要发病机制是

A. 冠状动脉炎症

B. 冠状动脉痉挛

C. 冠状动脉粥样硬化基础上血栓形成

D. 冠状动脉栓塞

E. 冠状动脉先天畸形

23. 心肌梗死的发病与预后的相关说法，下列选项正确的是

A. 女性预后都比男性好

B. 死亡多发生于发病 1 个月后

C. 非 ST 段抬高型一定比 ST 段抬高型预后好

D. 老年人梗死面积一定大于青壮年，预后差

E. 预后与梗死范围的大小、侧支循环产生的情况以及治疗是否及时并且合理无关

24. 慢性主动脉瓣关闭不全最常见的病因是

A. 风湿性心脏病

B. 高血压

C. 糖尿病

D. 感染性心内膜炎

E. Marfan 综合征

25. 有关右心衰竭水肿，下列选项不正确的是

A. 慢性肺源性心脏病是常见原因之一

B. 多见于急性心肌梗死

C. 是对称性凹陷性水肿

D. 自下而上发展

E. 高血压一般不会引起右心衰竭水肿

26. 胃食管反流病的发病机制最主要是

A. 食管痉挛

B. 食管黏膜糜烂

C. 食管先天性狭窄

D. 食管下段括约肌功能障碍

E. 肥胖

27. 下列选项不是胃癌的癌前病变的是

A. 肠上皮化生

B. 慢性萎缩性炎症

C. 异型增生

D. 慢性浅表性炎症

E. 假幽门腺化生

28. 下列最易发生幽门梗阻的是

A. 贲门溃疡

B. 胃底溃疡

C. 胃体溃疡

D. 幽门管溃疡

E. 胃大弯溃疡

29. Crohn 病患者突发剧烈腹痛，并有全腹部压痛、反跳痛、腹肌紧张（板状腹），考虑其最大的可能是

- A. 并发急性胃炎
- B. 并发胃溃疡
- C. 并发急性胆囊炎
- D. 急性肠穿孔
- E. 并发十二指肠溃疡

30. 肝肾综合征的主要病理生理机制是

- A. 肾实质器质性病变
- B. 肾小管狭窄
- C. 肾皮质血流量减少
- D. 肾小球硬化
- E. 肾动脉狭窄

31. 门静脉高压症形成后，在门-腔静脉侧支循环中最有临床意义的是

- A. 脐静脉、脐旁静脉与腹壁静脉交通支
- B. 腹膜后静脉与下腔静脉之间的 Retzius 静脉交通支
- C. 脾静脉与左肾静脉交通支
- D. 食管下段与胃底静脉交通支
- E. 直肠上静脉在直肠下端与直肠中、下静脉的痔静脉交通支

32. 原发胆汁性肝硬化导致假小叶与再生结节形成的起始基础病变是

- A. 汇管区大量炎性细胞浸润
- B. 广泛的肝细胞坏死
- C. 肝内细小胆管慢性非化脓性炎症
- D. 汇管区纤维结缔组织增生
- E. 肝内血循环紊乱，血流淤滞

33. 肝癌终末期最严重的并发症是

- A. 上消化道出血
- B. 肝癌结节破裂出血
- C. 肝性脑病
- D. 继发感染
- E. 胆囊结石

34. 影响慢性肾炎预后最主要的临床因素是

- A. 腰痛的程度
- B. 血尿量
- C. 尿蛋白量
- D. 氯化钠摄入量
- E. 饮食中糖类的摄入比例

35. 好发于中老年人的原发性肾病综合征的病理类型是

- A. 微小病变肾病
- B. 系膜增生性肾小球肾炎
- C. 系膜毛细血管性肾小球肾炎
- D. 膜性肾病
- E. 局灶性节段性肾小球硬化

36. 中老年人继发性肾病综合征最少见的病因是

- A. 糖尿病肾病
- B. 淀粉样变肾病
- C. 多发骨髓瘤性肾病
- D. 淋巴瘤性及实体肿瘤性肾病
- E. 过敏性紫癜肾炎

37. 肾病综合征患者高脂血症的原因是

- A. 肝合成脂蛋白增加和脂蛋白分解减少
- B. 高脂饮食
- C. 锻炼过少
- D. 低白蛋白血症
- E. 脂蛋白分解增加

38. 多囊肾的主要表现除外

- A. 继发性高血压
- B. 蛋白尿
- C. 血尿
- D. 巨大肾

E. 结石与腰痛

39. 关于成年人肾盂肾炎的发病与诊断，下列说法不正确的是

A. 尿路器械检查也可以导致肾盂肾炎

B. 多为上行性感染

C. 大肠埃希菌是最常见的病因

D. 尿培养大肠埃希菌菌落计数一定 $< 1 \times 10^4/\text{ml}$

E. 清洁中段尿细菌培养，菌落计数 $\geq 1 \times 10^4/\text{ml}$ 可以确诊

40. 尿毒症患者的心血管并发症中较少见的是

A. 尿毒症心力衰竭

B. 尿毒症动脉粥样硬化

C. 尿毒症心包炎

D. 尿毒症心内膜炎

E. 尿毒症心肌病

41. 肾上腺糖皮质激素最适用于

A. 急性肾盂肾炎

B. 肾肿瘤

C. 慢性肾盂肾炎

D. 原发性肾病综合征

E. 急性肾小球肾炎

42. 微量白蛋白尿的定义是：24 小时尿白蛋白排泄量是

A. 20-30mg

B. 15-20mg

C. 30-300mg

D. 100-500mg

E. 200-800mg

43. 活动后血尿和腰腹疼痛，首先应考虑的疾病是

A. 膀胱结石

B. 肾盂肾炎

C. 上尿路结石

D. 尿道结石

E. 肾囊肿

44. 最准确评价肾功能的指标是

A. 尿糖

B. 血肌酐水平

C. 血尿

D. 血清肌酐清除率

E. 血清菊粉清除率

45. 依据骨髓穿刺检查不一定可以排除诊断的疾病是

A. 巨幼细胞贫血

B. 白血病

C. 缺铁性贫血

D. 淋巴瘤

E. 再生障碍性贫血

46. 特发性血小板减少性紫癜最有诊断意义的改变是

A. 双下肢紫癜

B. 出血时间延长

C. 凝血时间延长

D. 骨髓巨核细胞成熟障碍

E. 毛细血管脆性试验阳性

47. 以下疾病不导致血管内溶血的是

A. 阵发性睡眠性血红蛋白尿

B. 温抗体型自身免疫性溶血性贫血

C. 冷抗体型自身免疫性溶血性贫血

D. 异常血红蛋白病

E. 蚕豆病

48. 以下对甲状腺球蛋白抗体的是

A. 素、糖皮质激素

B. 雌激素、糖皮质激素

- C. 肝炎、重症肝病
- D. 肾病综合征、低蛋白血症
- E. 肺部感染

49. 与 TSAb 阳性不相关的情况是

- A. 浸润性突眼
- B. 甲状腺危象
- C. 黏液性水肿
- D. 甲状腺毒性周期性瘫痪
- E. 高代谢症候群

50. 关于酮症酸中毒发生机制的描述，正确的是

- A. 胰岛素缺乏和胰高血糖素升高在其发生中起重要作用
- B. 主要是胰岛素抵抗引起
- C. 是呼吸性酸中毒
- D. 进食酮体过多所致
- E. 2 型糖尿病患者不会发生

51. Somogyi 效应是指

- A. 夜间曾发生过低血糖，导致低血糖之后反应性的高血糖
- B. 晚餐糖类摄入过多，导致清晨高血糖
- C. 夜间肝葡萄糖产生过多，导致清晨高血糖
- D. 清晨胰岛素作用不足，导致高血糖
- E. 清晨胰岛素拮抗激素增多，从而升高血糖

52. 抢救糖尿病酮症酸中毒患者，在第 1 个 24 小时内补液总量应为

- A. 800-1000ml
- B. 1000-2000ml
- C. 2000-3000ml
- D. 3000-4000ml
- E. 4000-5000ml

53. 引起糖尿病糖类、脂肪、蛋白质紊乱的中心环节是

- A. 糖异生增多

- B. 胰高血糖素灭活减少
 - C. 酮体产生增多
 - D. 胰岛素缺乏和（或）生物作用不足
 - E. 葡萄糖的氧化困难
54. 下列均为糖尿病微血管病变的表现，除了
- A. 视网膜病变
 - B. 24 小时尿蛋白 1.03g
 - C. 腹泻、便秘交替
 - D. 心绞痛
 - E. 心律失常
55. 风湿热最常见的致病菌是
- A. 肺炎链球菌
 - B. A 组乙型溶血性链球菌
 - C. 金黄色葡萄球菌
 - D. 克雷伯杆菌
 - E. 大肠埃希菌
56. 类风湿关节炎关节的最基本病理特点是
- A. 滑膜炎
 - B. 血管炎
 - C. 骨化性肌炎
 - D. 软骨变性
 - E. 骨质增生
57. 类风湿关节炎关节外的基本病理特点是
- A. 狼疮性肾炎
 - B. 血管炎
 - C. 骨质增生
 - D. 软骨减少
 - E. 肌肉萎缩
58. 下列因素，不属于有害物理因素的是

- A. 高温、低温
- B. 高压、低气压
- C. 噪声、振动
- D. 细菌、病毒
- E. 电离、非电离辐射

59. 理化因素所致疾病的特点是

- A. 临床表现无特异性
- B. 起病急、病程短
- C. 病因明确
- D. 都需要洗胃
- E. 患者意识都清楚

60. 多发性硬化典型临床表现是

- A. 急性起病多见，肢体无力最常见，缓解复发交替
- B. 亚急性多见，肢体无力少见，缓解复发交替
- C. 慢性起病多见，肢体无力少见，缓解复发交替
- D. 急性起病多见，肢体无力少见，缓解复发交替
- E. 慢性起病多见，肢体无力最常见，无缓解复发交替

61. 腰椎穿刺的适应证是

- A. 穿刺部位化脓
- B. 血友病
- C. 脑疝
- D. 严重颅内压增高
- E. 高度怀疑蛛网膜下腔出血

62. 心源性脑栓塞时，栓塞最易发生的血管是

- A. 大脑前动脉
- B. 大脑中动脉
- C. 大脑后下动脉
- D. 前交通动脉
- E. 后交通动脉

63. 诊断癫痫的首要依据是

- A. 头颅 MRI
- B. 脑脊液检查
- C. 头颅 CT
- D. 心电图
- E. 病史、临床表现和脑电图

64. 伤寒患者解除隔离的指征是

- A. 体温下降
- B. 出汗增多
- C. 临床症状减轻
- D. 血常规正常
- E. 症状消失，大便培养连续 2 次阴性（间隔 5 日）

65. 下列与流行性脑脊髓膜炎发病无关的是

- A. 机体免疫力低下
- B. 性别的影响
- C. 细菌毒力强
- D. 血脑屏障破坏
- E. 年龄

66. 患者，男性，45 岁。1 个多月前因受凉后反复出现发热（体温 38-38.8° C），伴咽痛、咳嗽、乏力、食欲减退等。既往有慢性萎缩性胃炎病史 10 余年。查体：咽部充血，扁桃体 I-II 度肿大，可触及双颌下、左腋下及 Virchow 淋巴结肿大。余（-）。目前此患者主要诊断可能性最大的是

- A. 左乳腺癌
- B. 胃癌
- C. 呼吸道感染
- D. 肺癌
- E. 口腔肿瘤

67. 患者，男性，70岁。慢性阻塞性肺疾病、肺源性心脏病，咳嗽、喘息加重并痰量增多5天。查体：口唇发绀，双肺散在少量干鸣音。心率80次/分，心律失常，期前收缩2-3次/分。下列选项中错误的治疗措施是

- A. 口服普萘洛尔
- B. 持续低流量吸氧
- C. 根据痰培养及药敏试验结果使用抗生素
- D. 静脉注射氨茶碱
- E. 盐酸氨溴索祛痰

68. 患者，男性，46岁。间断咳嗽、咳痰8年，伴气促1年。为确定是否为慢性阻塞性肺疾病，下列检查最有意义的是

- A. 动脉血气分析
- B. 胸部X线摄片
- C. 肺功能
- D. 胸部CT
- E. 纤维支气管镜

69. 患者，男性，70岁。间断咳嗽、咳痰30年，伴气促10年。动脉血气分析示 PaO_2 45mmHg, PaCO_2 30mmHg, 最有效的治疗措施是

- A. 长期吸入糖皮质激素
- B. 使用广谱抗生素
- C. 长期服用氨节西林
- D. 长期家庭氧疗
- E. 长期吸入支气管扩张药

70. 患者，男性，18岁。咳嗽、气促半天，此前曾到公园游玩。既往有类似发作史。查体：呼吸急促，双肺布满哮鸣音。最可能的诊断是

- A. 急性喉炎
- B. 急性支气管炎
- C. 支气管哮喘
- D. 心源性哮喘
- E. 癔症

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/595123233143011104>