

医师定期考核临床类别测评试卷（带答案）

第五套

1.检查强直性脊柱炎病人的腰椎活动度应采用的检查方法是： A

A.Schober 试验

B.4 字试验

C.浮髌试验

D.直腿抬高试验

E.测量握力

2.压力型手控定量气雾剂（MDI）给药后，药物在下呼吸道和肺泡的沉积率为： E

A.30%

B.5%

C.20%

D.40%

E.9%-11%

3.女性，39 岁。闭经半年。检查发现垂体 PRL 瘤，血生化检查显示血清钙 2.9mmol/L，血糖 2.67mmol/L，以下何种疾病可能性最大： A

A.MEN1Syndrome

B.MEN2ASyndrome

C.MEN2BSyndrome

D.SippleSyndrome

E.TurnerSyndrome

4. 20岁女患者，发作性头痛1年，在头痛前有短暂而轻微的视力模糊和闪光，继之偏侧搏动性头痛，常伴恶心和呕吐，持续3-6小时后缓解。应当诊断为： A

- A. 典型偏头痛
- B. 紧张型头疼
- C. 普通型偏头疼
- D. 丛集性头疼
- E. 基底动脉型偏头痛

5. 男性，67岁，高血压20年。近2周自觉头晕、头痛症状明显，血压明显增高，降压药物治疗疗效差。血压170/120mmHg，血Cr316umol/L，尿常规蛋白(++)。超声检查左肾长径8.6cm，右肾长径10.95cm。最可能的诊断： D

- A. 高血压并高血压性肾损害
- B. 高血压并慢性肾小球肾炎
- C. 高血压并急进性肾小球肾炎
- D. 高血压并肾动脉粥样硬化
- E. 高血压并急性肾小球肾炎

6. 对急性爆发型溃疡性结肠炎患者，经治医师首先应做的是： D

- A. 仔细地做钡剂灌肠检查
- B. 立即做大便细菌检查
- C. 立即做结肠镜检查
- D. 开始经静脉给予肾上腺皮质激素

E.在 24 小时内作肠系膜动脉造影

7.垂体腺癌最重要的诊断依据是： E

A.无包膜

B.肿瘤较大

C.瘤细胞异型性明显

D.无分泌激素功能

E.明显侵犯周围脑组织并发生转移者

8.硝酸甘油为临床常用抗心绞痛药物，常与  $\beta$  受体阻断剂合用，其重要理由为： E

A.二者均可使心率减慢

B.在心室压力改变方面可相互拮抗

C.二者均可使心室容积减少

D.二者均可使心肌收缩减弱

E.二者均可使心肌耗氧量下降，有协同作用

9.女，肝硬化 6 年，近日尿少，色发黄，食欲差，皮肤黏膜反复出现瘀斑及牙龈出血。化验：血小板  $50 \times 10^9/L$ ，ALB30g/L，PLT18 秒。

患者出血倾向的最主要原因是： D

A.维生素 K 缺乏

B.毛细血管脆性增加

C.血小板功能不良

D.凝血因子合成障碍

E.内毒素作用

10.男性，60岁，全身水肿伴有腹腔积液。尿蛋白定量4.5g/d，血脂增高。诊为肾病综合征的主要依据是： A

A.尿蛋白定量4.5g/d，血浆白蛋白25g/L

B.血浆白蛋白25g/L

C.高度水肿

D.高脂血症

E.蛋白尿+水肿+高脂血症

11.60岁男性，进食后呕吐，伴腹泻、抽搐、昏迷入院。既往有肝肿大和谷丙转氨酶偏高病史。查体：心率90次/分，BP152/88mmHg，肝右肋下3厘米，质中度硬，表面平滑，脾未触及。化验：血糖900mg/dl，血钠158mmol/L，血CO<sub>2</sub>结合力46容积%，血尿素氮25mg/dl，尿糖(+++)，尿酮体阴性。下列哪项诊断可能性最大： C

A.脑血管意外

B.糖尿病酮症酸中毒

C.高渗性非酮症糖尿病昏迷

D.肝性昏迷

E.尿毒症

12.患者，女，60岁。慢性咳喘20年，剧烈咳嗽3天，无咳痰、咯血及发热，半小时前突发胸痛，呼吸困难，不能平卧，伴发绀。体检：血压150/100mmHg，呼吸40次/分，右胸语颤减弱，呼吸音减低，心率110次/分。以上表现符合哪项诊断： E

A.肺梗死

B.急性心肌梗死

C.急性左心衰竭

D.阻塞性肺气肿

E.自发性气胸

13.发生脑梗塞的初期 CT 不能发现异常,一般在几小时后才出现明显的低密度区: C

A.8-12 小时

B.12-24 小时

C.24-48

D.48-72 小时

14.关于腹裂的叙述,下列错误的是: A

A.常位于脐的左侧

B.常位于脐的右侧

C.腹腔大小正常

D.脱出物中肝脏罕见

E.无外膜肠管裸露

15.确定胃癌晚期的最特异性临床表现为: E

A.贫血

B.腹水

C.上腹部触及肿块

D.消瘦

E.直肠指诊触及盆腔肿块

16.关于麻痹性肠梗阻的临床表现，下列哪项是错误的？ A

- A.肠蠕动往往亢进
- B.无阵发性绞痛和肠蠕动亢进的表现
- C.腹胀往往显著
- D.腹痛为持续性钝痛
- E.X线检查显示大、小肠全部充气扩张

17.关于颅内动脉瘤，下述哪项是正确的？ C

- A.创伤是动脉瘤破裂的原因
- B.动脉瘤破裂均有一定的诱因
- C.动脉瘤破裂出血后，应嘱病人绝对卧床
- D.颅内动脉瘤均位于 Willis 动脉环附近
- E.脑血管造影正常，可除外颅内动脉瘤

18.颞叶钩回疝早期的临床表现是： E

- A.意识丧失，呼吸次数减少
- B.双侧瞳孔扩大
- C.一侧瞳孔扩大，对侧肢体瘫痪
- D.双侧瞳孔散大，意识丧失
- E.意识丧失，一侧瞳孔散大，对侧肢体瘫痪

19.男性，57岁。上睑肿瘤切除造成眼睑全层缺损，缺损长度占睑缘长度近 1/2。目前宜采用下列哪种手术方法修复： B

- A.睑缘直接拉拢缝合
- B.用下睑全层复合组织瓣转移修复

C.用耳廓复合组织游离移植修复

D.单纯用局部皮瓣修复

E.鼻中隔黏膜软骨复合组织游离移植加皮肤游离移植术

20.女性，35岁，发现心脏杂音6年，近年活动后心慌、气促，时有夜间端坐呼吸。听诊：心尖2级收缩期杂音，3级舒张期雷鸣样杂音。超声心动图示二尖瓣瓣口 $1.75\text{cm}^2$ ，伴中度反流。最正确的处理应是：

E

A.休息，低盐饮食

B.抗风湿治疗并观察

C.强心、利尿剂治疗，不考虑手术

D.气囊扩张术或闭式二尖瓣交界分离术

E.直视下行二尖瓣分离、瓣膜成形术或瓣膜置换术

21.一患者首先出现左上肢放射性疼痛、感觉障碍级弛缓性瘫痪，而后顺序出现左下肢痉挛性瘫痪、右下肢痉挛性瘫痪、右上肢弛缓性瘫痪。病变可能位于： C

A.上颈段髓外硬脊膜内

B.上颈段脊髓内

C.下颈段髓外硬脊膜内

D.下颈段脊髓内

E.胸段脊髓内

22.关于大面积烧伤的补液，以下哪项是错误的： E

A.伤后第1个24小时，每1%烧伤面积（II°、III°）每公斤体重应

补胶体和电解质共 1.5ml (小儿 2.0ml)

B.胶体和电解质的比例是 0.5:1 广泛深度烧伤其比例可改为 0.75:0.75

C.另加 5% 葡萄糖补充水分，成人为 2000ml

D.第 2 个 24 小时，胶体和电解质为第 1 个 24 小时的一半

E.第 3 个 24 小时，烧伤面积在 50% 以下者，可不给胶体和晶体

23.机械性肠梗阻患者腹部平片显示下列何种变化时，应考虑绞窄性肠梗阻的可能： D

A.扩张肠段黏膜呈鱼刺状

B.扩张肠段呈梯形排列

C.近端肠段扩张，远端肠段未见气体

D.孤立肠段扩张且较固定

E.以上都不是

24.患者，男，35 岁。车祸伤致右髌关节疼痛，活动不能 3 天就诊，经检查诊断为右髌关节后脱位。在硬膜外麻醉下行手法复位治疗。伤后 1 年开始出现右髌关节疼痛，行走跛行。此时最可能的诊断是： B

A.右髌关节创伤性关节炎

B.右股骨头缺血坏死

C.右坐骨神经损伤

D.右髌关节僵硬

E.右髌关节感染

25.下列哪项不是孕激素的生理作用： E

A.使子宫内膜由增生期转变为分泌期

- B.使宫颈黏液黏稠，拉丝度降低
- C.排卵后使基础体温上升 0.3-0.5℃
- D.对下丘脑有负反馈作用
- E.促进钠、水潴留

26.初产妇进入第二产程后，开始保护会阴的时机为？ B

- A.宫口开全时
- B.胎头拨露使阴唇后连合紧张时
- C.胎头着冠时
- D.胎头仰伸时
- E.阴道口见胎头时

27.正常恶露一般持续时间为： D

- A.1-3 周
- B.2-4 周
- C.3-5 周
- D.4-6 周
- E.5-7 周

28.子宫内膜异位症的激素治疗不可以选用： A

- A.雌激素
- B.GnRH-a
- C.达那唑
- D.孕三烯酮等
- E.孕激素

29.

C

- A.癌前病变
- B.非典型增生
- C.炎症愈合过程
- D.雌激素水平过高
- E.宫颈原位癌

30.青春期原发性闭经是指： A

- A.年满 18 岁的女性尚未月经初潮
- B.已建立月经周期，非生理性超过 6 个月停经
- C.处女膜闭锁
- D.阴道完全横膈
- E.原发无阴道

31.关于孕妇支原体感染，下列描述错误的是： D

- A.支原体是介于细菌和病毒间的微生物
- B.以人型支原体及解脲支原体最常见
- C.可引起母婴垂直传播
- D.有明显的临床症状
- E.首选药物为红霉素

32.关于晚期产后出血的治疗，以下哪项是错误的： A

- A.阴道大量出血，立即行子宫全切术
- B.少量或中等量子宫出血给予足量广谱抗生素、宫缩素等治疗
- C.疑有胎盘、胎膜、蜕膜残留行刮宫术

D.

E.大量出血应备血

33.关于胎盘的功能，下列哪项是错误的： B

A.防御功能

B.产生羊水

C.合成激素和酶

D.排除胎儿代谢产物

E.胎儿营养物质的供应及母儿气体交换

34.患儿，6岁。出生后反复呼吸道感染。平时较少活动。体检：无发绀，心前区隆起，于胸骨左缘第3、4肋间闻及III级粗糙全收缩期杂音，有震颤，肺动脉第二音亢进，最可能的诊断是： B

A.房间隔缺损

B.室间隔缺损

C.法洛四联症

D.动脉导管未闭

E.艾森曼格综合征

35.引起婴幼儿腹泻的主要原因是： A

A.轮状病毒感染

B.受凉

C.EB病毒感染

D.细菌感染

E.饮食不当

36.

下列哪种物质含量最多： A

A.卵磷脂

B.鞘磷脂

C.中性脂肪

D.蛋白质

E.磷脂酰甘油

37.生后2周以内，新生儿贫血的诊断标准是： A

A.静脉血红蛋白 $\leq 130\text{g/L}$

B.毛细血管血红蛋白 $\leq 130\text{g/L}$

C.静脉血红蛋白 $\leq 140\text{g/L}$

D.静脉血红蛋白 $\leq 145\text{g/L}$

E.毛细血管血红蛋白 $\leq 90\text{g/L}$

38.新生儿患严重的呼吸窘迫综合征而未经治疗时，常发生： C

A.呼吸性碱中毒

B.代谢性酸中毒

C.呼吸性酸中毒和代谢性酸中毒

D.呼吸性酸中毒和代谢性碱中毒

E.呼吸性碱中毒和代谢性酸中毒

39.小儿支气管肺炎时常用鼻前庭导管持续吸氧，氧浓度一般不超过：

C

A.0.1

B.0.2

C.0.4

D.0.5

E.0.6

40.

**B**

A.血清铁蛋白降低

B.红细胞游离原卟啉增高

C.血清铁减少

D.血清总铁结合力增高

E.以上都不是

41.学龄前儿童重症菌痢特点有：**E**

A.腹痛不明显

B.呕吐不明显

C.腹泻不明显

D.脱水不明显

E.肠道症状不明显

42.腹主动脉径的正确测量方法是：**B**

A.在舒张期测量一侧管壁的外缘到对侧管壁的外缘

B.在收缩期测量一侧管壁的外缘到对侧管壁的外缘

C.在收缩期测量一侧管壁的外缘到对侧壁管的内缘

D.在舒张期测量一侧管壁的内缘到对侧壁管的内缘

E.不需要考虑心动周期

43.下列关于关节结核的描述，错误的是：**D**

- A.
- B.儿童及青少年多见
- C.多累及持重大关节
- D.关节破坏起始于关节持重面
- E.起病比较缓慢，有局部疼痛肿胀，关节活动受限

43.下列关于关节结核的描述，错误的是： D

- A.滑膜型结核较骨型结合常见
- B.儿童及青少年多见
- C.多累及持重大关节
- D.关节破坏起始于关节持重面
- E.起病比较缓慢，有局部疼痛肿胀，关节活动受限。

44.下列哪个系统对缺血耐受力极差，栓塞后易出现严重后果： A

- A.神经系统
- B.呼吸系统
- C.内分泌系统
- D.骨、肌肉系统
- E.泌尿系统

45.关于周围型肺癌的 CT 表现，以下哪项描述是错误的： D

- A.边缘有分叶的软组织肿块
- B.肿块内见小泡征或含气支气管征
- C.肿块周围可见胸膜凹陷征
- D.增强扫描多数表现为轻度强化

E.

46.彩色多普勒血流显像与伪彩（B超）的却别是： D

- A.伪彩与彩色多普勒是同一概念
- B.彩色多普勒血流显像由灰阶转换而来
- C.伪彩是由血流转换而来
- D.彩色多普勒与伪彩不是同一概念
- E.伪彩可显示瓣膜反流

47.与违法犯罪关系最为密切的人格障碍类型是： C

- A.偏执型人格障碍
- B.分裂样人格障碍
- C.反社会型人格障碍
- D.表演型人格障碍
- E.强迫型人格障碍

48.癫痫发作间歇期精神障碍可出现： A

- A.人格障碍、记忆及智能障碍
- B.脑电图无异常
- C.先兆和前驱症状
- D.一般无意识和智能障碍
- E.癫痫自动症

49.咳嗽临床检查不包括下列哪一项： E

- A.胸部 X 线
- B.血液学检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/605121024303011034>