

中华护理学会团体标准测试题库含答案

1. 若患者出现红斑或色素沉着，应尽早使用传统烤灯对高位部位皮肤进行照射。

[判断题] *

对

错(正确答案)

2. 护士对不能自主活动的卧床患者进行护理时，应确保患者足跟不与床面接触。

[判断题] *

对(正确答案)

错

3.

高危患者手术时，应选择相应的体位摆放装置和减压装置预防压力性损伤的发生。

[判断题] *

对(正确答案)

错

4. 对于压力性损伤的高危患者应进行营养筛查。 [判断题] *

对(正确答案)

错

5. 将疼痛程度分为四级的疼痛评估工具是VRS。 [判断题] *

对

错(正确答案)

6. 《成人癌性疼痛护理》疼痛评估应以患者主诉为依据，遵循哪四项原则？（）

[单选题] *

A.及时、准确、规范、全面

- B.常规、准确、量化、动态
- C.常规、量化、全面、动态(正确答案)
- D.常规、量化、及时、准确

7. 入院（ ）内应对患者疼痛进行常规评估，（ ）内进行全面评估。（ ） [单选题] *

- A.1小时， 8小时
- B.8小时， 12小时
- C.8小时， 24小时(正确答案)
- D.12小时，

8. 皮下注射用药后应评价镇痛效果时间是（ ） [单选题] *

- A.10min
- B.20min
- C.30min(正确答案)
- D.40min

9. 静脉用药后应评价镇痛效果时间是（ ） [单选题] *

- A.5min
- B.10min
- C.15min(正确答案)
- D.20min

10. 经直肠给镇痛栓剂塞入肛门后，指导患者正确的是（ ）侧卧位60min， [单选题] *

- A.用药后1-2h内不宜排便平卧位30min，
- B.用药后1-2h内不宜排便绝对卧床15min，
- C.用药后30min-1小时内不宜排便保持侧卧位15min，

D.用药后1-2h内不宜排便。(正确答案)

11. 应用阿片类镇痛药物发生肝肾毒性症状的监测高危人群，不包括（） [单选题]

*

A.年龄大于50岁者(正确答案)

B.高血压者

C.糖尿病者

D.体液失衡者

12. 应用阿片类药物发生心脏毒性症状的监测高危人群，不包括（）。 [单选题] *

A.年龄大于60岁者

B.心血管疾病病史者

C.高血压者

D.糖尿病者(正确答案)

13. 进行疼痛相关知识教育的对象是（） [单选题] *

A.住院患者和陪护者

B.出院患者和家族主要成员

C.患者和主要照顾者(正确答案)

D.以上均是

14. 疼痛控制稳定是指疼痛得到有效缓解，并且（） [单选题] *

A.连续12小时基础疼痛强度小于等于3分

B.连续24小时基础疼痛强度小于等于4分。

C.连续2天基础疼痛强度小于等于3分。

D.连续3天基础疼痛强度小于等于3分。(正确答案)

15. 疼痛是一种与实际的组织损伤有关的令人不愉快的感觉和情感体验。 [判断题]

*

对(正确答案)

错

16. 入院12h内应对癌症患者疼痛情况进行常规评估，24h进行全面评估。 [判断题]

*

对

错(正确答案)

17. 应用镇痛药后，应按给药时间进行疼痛程度评估。 [判断题] *

对

错(正确答案)

18.

爆发痛是在基础疼痛控制相对稳定和充分的前提下，自发或有触发因素引起的短暂剧烈疼痛。 [判断题] *

对(正确答案)

错

19. 成人疼痛行为评估量表的评分，数值越大说明疼痛程度越重。 [判断题] *

对(正确答案)

错

20.

疼痛控制不稳定者，如出现爆发痛、疼痛加重，或剂量滴定过程中应及时评估。

[判断题] *

对(正确答案)

错

21.

护理人员应指导癌症患者主动报告疼痛、预防不良反应的方法，根据疼痛程度可在家自行调整药量。 [判断题] *

对

错(正确答案)

22. 口服缓释阿片类镇痛药物，指导吞服困难患者可掰开、碾碎和咀嚼服用。

[判断题] *

对

错(正确答案)

23. 即释吗啡镇痛类药物，口服给药30分钟后评价镇痛效果。 [判断题] *

对

错(正确答案)

24. 癌性疼痛是由肿瘤相关性疾病引起的身体疼痛。 [判断题] *

对

错(正确答案)

25. 给患者实施药物镇痛时，皮下/肌肉注射后多久再评估一次？（） [单选题] *

A.15min

B.30min(正确答案)

C.1小时

D.每班

26.

芬太尼透皮贴剂经皮肤给药，（）更换一次，发热患者不宜使用或应缩短敷贴更换时间。 [单选题] *

A.24H

B.36H

C.48H

D.72H(正确答案)

27. 实施耳穴贴压技术操作的人员为（ ），并经过相关知识及操作技能培训。

[单选题] *

- A. 实习医生
- B. 实习护士
- C. 注册护士、医生(正确答案)
- D. 乡村医生

28. 肠道热结症便秘不正确的是（ ） [单选题] *

- A. 大便硬结难下
- B. 少腹疼痛、按压胀痛
- C. 口干口臭、少津
- D. 胸闷不适(正确答案)

29. 便秘耳穴贴压按压频次每日（ ） [单选题] *

- A. 3-5次/日(正确答案)
- B. 4-6次/日
- C. 2-3次/日
- D. 4-5次/日

30. 便秘贴压得留置时间夏季是（ ） [单选题] *

- A. 1-2天
- B. 2-3天
- C. 1-3天(正确答案)
- D. 2-4天

31. 便秘贴压得留置时间冬季是（ B ） [单选题] *

- A. 3-5天

B.3-7天(正确答案)

C.2-4天

D.5-7天

33. 肠道气滞证便秘证不正确的是（） [单选题] *

A.大便干结

B.腹痛腹胀

C.口干口臭(正确答案)

D.胸闷不舒

34. 脾肾阳虚证便秘不正确的是（） [单选题] *

A.大便干或不干，排出困难

B.腹中冷痛

C.腰膝酸软(正确答案)

D.四肢不温

35. 津亏血少证便秘不正确的是（） [单选题] *

A.大便干结，便如羊粪

B.腹中冷痛(正确答案)

C.口干少津

D.腰膝酸软

36. 肺脾气虚证便秘不正确的是（） [单选题] *

A.大便干结，便如羊粪(正确答案)

B.神疲懒言

C.舌淡苔白

D.脉弱

37. 耳穴贴压每次每穴按压时间（） [单选题] *

A.0.5-2min(正确答案)

B.1-3min

C.2-5min

D.1-2min

38.

大便硬结难下，少腹疼痛，按之胀痛，口干口臭，舌红，苔黄燥，少津，脉数属于下列哪种便秘？（） [单选题] *

A.肠道热结症(正确答案)

B.肠道气滞证

C.脾肾阳虚证

D.津亏血少证

39. 与内脏相应的穴位集中在（） [单选题] *

A.耳垂

B.耳根

C.耳廓(正确答案)

D.耳甲

40. 下列哪项不属于耳穴的诊察方法？（） [单选题] *

A.望诊

B.叩诊(正确答案)

C.压痛法

D.皮肤电测定法

41. 耳穴压豆用75%的酒精消毒，消毒顺序是（） [单选题] *

A.由内到外自上而下(正确答案)

B.由外到内自上而下

C.由内到外自下而上

D.由外到内自下而上

42.

耳穴贴压技术使用药丸、药籽、谷类等物品置于胶布上，贴于耳廓上的哪些部位，用手指按压刺激，通过经络传导，达到防治疾病目的的一种操作方法。（）

[单选题] *

A.动脉

B.静脉

C.穴位(正确答案)

D.反应点

43. 便秘耳穴贴压留置时间（） [单选题] *

A.夏季1-5天

B.夏季1-2天

C.冬季1-3天

D.冬季3-7天(正确答案)

44. 便秘耳穴贴压技术以下患者可适用（） [单选题] *

A.疼痛患者(正确答案)

B.妊娠患者

C.耳部皮肤状况不佳患者（如感染、破溃、瘢痕等）

D.胶布过敏患者

45.

耳穴贴压技术是用药丸、菜籽、谷类等物品置于胶布上，贴于耳廓上的穴位或反应点，用手指按压刺激，通过经络传导，达到防治疾病目的的一种操作方法 [判断题]

*

对(正确答案)

错

46. 便秘耳穴贴压留置时间，夏天3-7天。 [判断题] *

对

错(正确答案)

47. 便秘耳穴贴压应每次选择一侧耳朵，双侧耳穴轮流贴压。 [判断题] *

对(正确答案)

错

48.

实施耳穴贴压技术操作人员应为注册护士、医生，并经过相关知识及操作技能培训且考核合格。 [判断题] *

对(正确答案)

错

49.

人体感受到外邪或疾病过程中阴阳气血失调，体内病理产物蓄积，以邪气盛、正气不虚为基本病理，表现为有余、亢盛、停聚特征的各种证候属于虚症。 [判断题] *

对

错(正确答案)

50. 耳穴贴压得穴位越多越好。 [判断题] *

对

错(正确答案)

51. 耳穴贴压技术说法正确的是（） [单选题] *

A.贴于耳廓上的穴位或反应点

B.用手指按压刺激

C.通过经络传导

D.以上均正确。(正确答案)

52. 不属于耳穴贴压技术的评估要点是（） [单选题] *

A.主要症状

B.饮食(正确答案)

C.是否妊娠

D.既往史

53. 耳穴贴压技术操作流程错误的是（） [单选题] *

A.评估有无胶布过敏、耳部皮肤情况

B.告知耳穴贴压的作用、操作方法及局部感染

C.取合理舒适体位，充分暴露耳部

D.用75%酒精自下而上。由外到内消毒耳部皮肤(正确答案)

54.

根据《中华护理学会团体标准管理办法》的规定和，通过了9项中华护理学会团体标准，其中《便秘的耳穴贴压技术》于何时实施？何时发布？（） [单选题] *

A.2020年1月10日，2019年11月1日

B.2019年11月10日，2020年1月1日

C.2019年11月1日，2020年1月10日

D.2020年1月1日，2019年11月10日(正确答案)

55.

针对《便秘的耳穴贴压技术》，中华护理学会团体标准规定了对便秘患者实施耳穴贴压技术的范围包括（） [单选题] *

A.适应症、评估和操作要点

B.基本要求、评估和操作要点(正确答案)

C.基本要求、评估和操作注意事项

D.症候分型、评估和操作要点

56. 实施耳穴贴压技术操作前评估要点（） [单选题] *

- A.主要症状、过敏史、是否妊娠、对疼痛的耐受程度
- B.主要症状、过敏史、是否心脏病、对疼痛的耐受程度
- C.主要症状、既往史、是否妊娠、对疼痛的耐受程度(正确答案)
- D.主要症状、既往史、是否妊娠、对疼痛的恐惧

57. 下列不属于虚症得是（） [单选题] *

- A.脾肾阳虚证
- B.津亏血少证
- C.肺脾气虚证
- D.肠道气滞证(正确答案)

58. 带气囊的气管套管气囊压力应维持在（）cmH₂O。 [单选题] *

- A.25-30(正确答案)
- B.20-30
- C.20-25
- D.15-25

59.

带气囊的气管套管气囊压力宜（）h监测气囊压力。可每（）h放气1次，每次放气（）左右。（） [单选题] *

- A.4-6,4-6,30(正确答案)
- B.2-4,4-6,30
- C.4-6,2-4,30
- D.2-4,2-4,30

60. 吸引管管径不宜超过气管内套管内径的（），宜选择有侧孔的吸引管。

[单选题] *

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%(正确答案)

61. 每次吸痰时间应在（）s内完成，连续吸引应小于（）次。[单选题]*

A.12,3

B.12,2

C.15,3(正确答案)

D.15,2

62. 气管内套管宜清晰消毒至少每日（）次，清洗消毒应按规程执行。[单选题]*

A.1

B.2(正确答案)

C.3

D.4

63. 进食后（）时间不宜进行气道吸引。[单选题]*

A.15min

B.20min

C.30min(正确答案)

D.35min

64. 气道切开非机械通气患者，每次吸引时成人负压控制在（）[单选题]*

A.60-120mmHg

B.80-120mmHg(正确答案)

C.60-150mmHg

D.80-150mmHg

65.

拔管前宜连续堵管（）h，观察并记录堵管期间患者活动、睡眠、进食时的呼吸情况。[单选题]*

A.12

B.24

C.48

D.24-48(正确答案)

66. 金属气管套管应用2%戊二醛浸泡消毒时，浸泡时间应 \geq （）min。[单选题]*

A.10

B.15

C.20(正确答案)

D.30

67. 金属气管套管应用3%过氧化氢浸泡消毒时，浸泡时间应 \geq （）min [单选题]*

A.10

B.15(正确答案)

C.20

D.30

68. 金属气管套管应用75%乙醇浸泡消毒时，浸泡时间应 \geq （）min [单选题]*

A.10

B.15

C.20

D.30(正确答案)

69. 金属气管套管应用有效含氯2000mg/l消毒剂浸泡消毒时，浸泡时间应 \geq （）min [单选题]*

A.10

B.15

C.20

D.30(正确答案)

70.

耐湿耐热的气管套管煮沸消毒时，洗刷干净的内套管应再次放入干净的水中，煮沸时间 \geq () min [单选题] *

A.10

B.15(正确答案)

C.20

D.30

71. 金属气管套管应用0.2%过氧乙酸浸泡消毒时，浸泡时间应 \geq () min [单选题] *

A.10

B.15

C.20

D.30(正确答案)

72. 金属气管套管应用3%过氧化氢浸泡消毒时，浸泡时间应 \geq () min [单选题] *

A.10

B.15(正确答案)

C.20

D.30

73. 金属气管套管应用75%乙醇浸泡消毒时，浸泡时间应 \geq () min [单选题] *

A.10

B.15

C.20

D.30(正确答案)

74. 金属气管套管应用有效含氯2000mg/l消毒剂浸泡消毒时，浸泡时间应≥（）

[单选题] *

A.10

B.15

C.20

D.30(正确答案)

75.

压力性损伤的发生重，单位面积皮肤的的压力超过（）会使组织受到压迫，导致组织供应的血流量降低。 [单选题] *

A.16mmHg

B.24mmHg

C.32mmHg(正确答案)

D.45mmHg

76. 压力性损伤风险评估应在患者入院（）内进行全面评估。 [单选题] *

A.24小时(正确答案)

B.12小时

C.36小时

D.48小时

77. 成人患者压力性损伤风险评估使用的量表（）。 [单选题] *

A.NSRAS量表

B.Braden-Q量表

C.Braden量表(正确答案)

D. Waterlow量表

78. 评估患者皮肤是否水肿，持续按压患者水中部位（）时间。 [单选题] *

A. 3s(正确答案)

B. 5s

C. 6s

D. 10s

79. 评估患者皮肤是否水肿，皮肤凹陷（）mm且很快恢复，为轻度水肿。 [单选题]

*

A. ≤ 2 mm(正确答案)

B. 2-4mm

C. ≥ 4 mm

D. 4-6mm

80. 评估患者皮肤是否水肿，皮肤凹陷（）mm，几秒后恢复为中度水肿。 [单选题]

*

A. ≤ 2 mm

B. 2-4mm

C. ≥ 4 mm(正确答案)

D. 4-6mm

81. 评估患者皮肤是否水肿，皮肤凹陷（）mm，10-20s恢复为重度水肿。 [单选题]

*

A. ≥ 4 mm

B. 4-6mm

C. ≥ 6 mm(正确答案)

D. ≥ 8 mm

82.

评估患者皮肤是否水肿，皮肤凹陷（）mm且恢复时间大于20秒，为极重度水肿。

[单选题] *

A. ≥4mm

B. 4-6mm

C. ≥6mm

D. ≥8mm(正确答案)

83. 导致压疮发生的最主要原因是（） [单选题] *

A. 局部组织受压过久(正确答案)

B. 皮肤水肿

C. 皮肤潮湿摩擦刺激

D. 皮肤营养不良

84.

皮肤红斑，持续按压患者皮肤红斑区（）及以上，压力解除后若指压部位不变白提示发生1期压力性损伤。 [单选题] *

A. 2s B. 3s C. 5s D. 8s

11. 半卧位时患者最易发生压力性损伤的部位是（A）

A. 骶尾部(正确答案)

B. 枕骨粗隆

C. 肩胛部

D. 肘部

85. 压力性损伤易发生部位不包括（） [单选题] *

A. 坐位—坐骨结节

B. 仰卧—骶尾部

C. 侧卧—髌部

D. 俯卧—腹部(正确答案)

86. 对于压力性损伤高危患者，感觉功能障碍时，不得使用超过（）的热水。

[单选题] *

A.45℃

B.50℃(正确答案)

C.55℃

D.60℃

14.预防压力性损伤的措施，下列不正确的是（B）

87. 预防压力性损伤时，对于卧床患者取半卧位时，床头抬高（） [单选题] *

A.20-30°

B.小于30°(正确答案)

C.小于45°

D.15-30°

88. Braden评分量表中，（）分为低风险。 [单选题] *

A.15-18分(正确答案)

B.13-14分

C.10-12分

D.≤9分

89. Braden评分量表中，（）分为中度风险。 [单选题] *

A.15-18分

B.13-14分(正确答案)

C.10-12分

D.≤9分

90. Braden评分量表中，（）分为重度风险。 [单选题] *

A.15-18分

B.13-14分

C.10-12分(正确答案)

D.≤9分

91. Braden评分量表中，（）分为极高度风险。[单选题]*

A.15-18分

B.13-14分

C.10-12分

D. ≤9分

20.Braden量表评分，低、中度风险患者至少每周评估（A）次。(正确答案)

92. Braden量表评分，极高度风险患者至少（）评估。[单选题]*

A. 每周评估1次。

B.每周评估2次。

C.每天评估1次。(正确答案)

D.每班评估1次。

93. 关于压力性损伤风险预防说法错误的是（）[单选题]*

A.高危部位皮肤在条件允许时宜选用泡沫、水胶体等保护性敷贴。

B.在每班交接时，护士应检查受压部位皮肤和皮肤皱褶处情况。

C.体位变换频率应视患者病情、皮肤耐受情况等决定。

D.保护性敷料若出现松动或者错位等情况但不影响使用，不需立即更换辅料(正确答案)

94. 以下哪项不是帮助压力在分布的减压装置？（）[单选题]*

A.气垫床

B.凝胶垫

C.翻身枕(正确答案)

D.海绵垫

95. 下列属于全身减压装置的是（）[单选题]*

- A. 简易水袋
- B. 减压敷料
- C. 减压垫
- D. 水床(正确答案)

96. 下列哪些不是压力性损伤形成的外源性因素 () [单选题] *

- A. 潮湿
- B. 摩擦力
- C. 剪切力
- D. 营养不良(正确答案)

97. 下列压力性损伤风险评估量表与适用人群匹配正确的是 () [单选题] *

- A. Braden量表—新生儿患者
- B. Braden-Q量表——儿童患者(正确答案)
- C. Waterlow量表—新生儿患者
- D. NSRAS量表—成年患者

98. 患者侧卧时，下列哪项是压力性损伤好伐的高危部位 () [单选题] *

- A. 肘部和肩胛部
- B. 髂前上棘和肩峰(正确答案)
- C. 内外踝和足趾
- D. 耳廓和生殖器官

99. 皮肤评估的过程中，以下哪项描述是错误的 () [单选题] *

- A. 触诊时动作轻柔，使用手心触摸患者皮肤表面评估皮温。(正确答案)
- B. 视诊时需要观察皮肤完整性和皮肤颜
- C. 问诊时需了解患者有无影响皮肤状况及伤口愈合的疾病
- D. 嗅诊时检查患者是否存在失禁情况

100.

若患者体内白蛋白含量小于（）g/L时，表明患者有营养不良的风险，需要营养支持。[单选题]*

A.25

B.30(正确答案)

C.35

D.45

101.

压力性损伤是由于压力或压力联合剪切力导致的皮肤和（或）皮下组织的局部损伤，通常位于骨隆突处，但也可能与医疗器械或其他物体有关。[判断题]*

对(正确答案)

错

102. 风险评估是指仅使用风险评估工具评估患者压力性损伤发生风险的过程。

[判断题]*

对

错(正确答案)

103.

皮肤红斑是指持续按压皮肤红斑区域3s及以上，压力解除后若质押部位不变白提示已发生1期压力性损伤。[判断题]*

对(正确答案)

错

104.

持续按压患者皮肤水肿部位5s，若皮肤凹陷 $\geq 8\text{mm}$ 且恢复时间 $> 20\text{s}$ ，则水肿程度为3+（极中度）。[判断题]*

对

错(正确答案)

105.

耐湿耐热的气管套管煮沸消毒时，洗刷干净的内套管应再次放入干净的水中，煮沸时间 \geq （）min [单选题] *

A.10

B.15(正确答案)

C.20

D.30

106.

气管切开术是指：切开颈段气管前壁，置入气管套管，使患者通过重新建立的通道进行呼吸的一种手术。 [判断题] *

对(正确答案)

错

107.

气管造瘘口：是指气管插管术或喉切除术后形成的临时或永久性的外界相同的气道开口。 [判断题] *

对(正确答案)

错

108.

以所佩戴的气道套管的长度来估计，当吸引管远端能达到气管套管末端时进行的气道吸引为深吸引。 [判断题] *

对

错(正确答案)

109.

吸引管插入人工气道直至遇到阻力时，回退吸引管1cm时进行的气道吸引为浅吸引。 [判断题] *

对

错(正确答案)

110.

声门下分泌物吸引是指利用带有SSD装置的气道套管连接负压吸引装置，对声门下气囊上分泌物进行持续或间断吸引的技术。[判断题] *

对(正确答案)

错

111. 关于体位性低血压患者体位转换时的指导错误的是（） [单选题] *

A.体位转换时速度应缓慢

B.避免弯腰后突然站起

C.减少弯腰的程度

D.可适当增加弯腰的动作(正确答案)

112. 体位性低血压患者有氧耐力训练说法正确的是（） [单选题] *

A.站立时进行间歇掂脚尖活动(正确答案)

B.双上肢交替负重训练

C.站立时进行持续掂脚尖活动

D.站立时进行持续掂脚掌活动

113. morse跌倒风险评估量表中，关于使用助行器方面评分为零的行为是哪项（）

[单选题] *

A.使用手杖

B.使用助行器

C.护士帮助(正确答案)

D.依扶家具

114. morse跌倒风险评估量表中，关于步态方面评分为10分的行为是哪项（）
[单选题] *

- A.步态正常
- B.步态虚弱(正确答案)
- C.步态受损
- D.卧床休息

115. 以下说法错误的是（） [单选题] *

- A.为预防患者跌倒，病房的洗手间、浴室要有提示易滑倒的醒目标志。
- B.为预防患者跌倒，应将病床调至最高位置，并固定好脚刹，必要时加床档。(正确答案)
- C.当老年人跌倒后出现局部疼痛和压痛，并伴有肢体功能障碍畸形时，可能已骨折。
- D.为了降低患者跌倒风险，每月对平车轮椅床栏的安全性进行检查。

116. 患者处于以下哪种状况属于有跌倒风险（） [单选题] *

- A.腹泻(正确答案)
- B.便秘
- C.牙疼
- D.尿路感染

117. 以下哪些不属于跌倒风险因素（） [单选题] *

- A.携带导管(正确答案)
- B.大小便失禁或紧急、频繁排泄
- C.认知功能受损
- D.有跌倒史

118. 对于视力障碍患者预防措施正确的是（） [单选题] *

- A.不同用途的眼镜应做好标识
- B.护理偏盲患者时，应站在盲侧，并通过声音等增强患者对空间、未知的感知(正确答案)

- C. 护理偏盲患者时，应站在健侧，并通过声音等增强患者对空间、未知的感知
- D. 应指导因视力减弱，曾有跌倒史或跌倒风险的患者使用偏光眼镜

119. 以下哪个情景属于跌倒？（ ） [单选题] *

- A. 患者在排队检查时，突然听到有人在背后喊自己，猛地回头导致脖子扭伤
- B. 患者在康复室进行功能锻炼时，突然头晕身体向下倾倒，但最后被陪员扶住 (正确答案)
- C. 老年患者因为家庭琐事和家人置气，故意从楼梯上往下跳，导致小腿骨折
- D. 患者在医院对面购买早餐时，被摩托车撞倒导致头部外伤

120. 以下哪项不属于跌倒风险评估时机（ ） [单选题] *

- A. 患者入院时、转科时
- B. 患者住院期间出现病情变化、使用高跌倒风险药物
- C. 患者术后第一次下床
- D. 跌倒高风险患者出院后 (正确答案)

121. Morse跌倒风险评估量表中，项目不包括下列哪项（ ） [单选题] *

- A. 使用助行器
- B. 管道 (正确答案)
- C. 静脉输液
- D. 步态及精神状态

122. Morse跌倒风险评估量表中，跌倒低风险分值 <（ ） [单选题] *

- A. 20
- B. 25 (正确答案)
- C. 30
- D. 35

123. Morse跌倒风险评估量表中，跌倒高风险分值 >（ ） [单选题] *

A 40

B 45(正确答案)

C 50

55

124. 下列条件哪项不是跌倒的风险因素 () [单选题] *

A.头晕，目眩及视力模糊

B.肌力，平衡及步态异常

C.使用消炎药(正确答案)

D.有跌倒史

125. 跌倒高风险患者应专人 () h看护，保护患者在照护的视线范围内。 [单选题]

*

A.12

B.24(正确答案)

C.12-24

D.除睡眠以外时间

126. 患者卧位转为站位时，遵循“三部曲”即： () [单选题] *

A.平躺30s、坐起30s、站立30s再行走(正确答案)

B.平躺20s、坐起20s、站立20s再行走

C.平躺10s、坐起10s、站立10s再行走

D.平躺25s、坐起30s、站立25s再行走

127. 跌倒中风险存在以下哪些情况 () [单选题] *

A.过去24h内曾有手术镇静史(正确答案)

B.年龄≥80岁

C.使用2种及以上高风险药物

D.昏迷或完全瘫痪

128.

跌倒是指住院患者在（）任何场所，（）的倒于地面，或者倒于比初始位置更低的地方，可伴或不伴有外伤。[单选题]*

A.家庭、未预见性

B.社区、未预见性

C.医疗机构、有预见性

D.医疗机构、未预见性(正确答案)

129. 下面哪类患者跌倒坠床的危险？（）[单选题]*

A.步态不稳者

B.头晕眩晕、血压不稳者

C.使用毒性、麻醉精神类药物者

D.以上都是(正确答案)

130. 下列哪项不属于认知功能受损的患者，防范跌倒的措施？（）[单选题]*

A.根据患者自身的认知功能提供帮助

B.当患者出现精神与行为症状时，应移除周围可能造成伤害的物品

C.对产生幻觉并出现游走，或夜间异常行为的患者，夜间可实施保护性约束

D.指导患者服用高跌倒风险药物时，在药效期内宜限制活动(正确答案)

131. 实施针对头晕眩晕风险因素的预防措施，下列正确的是（）[单选题]*

A.应观察和询问，患者在行走或平衡方面遇到的问题

B.宜鼓励患者参加由康复医师制定的肌力、平衡及步态训练计划，并督促实施

C.应指导患者体位转换时速度缓慢，避免弯腰后突然站起，减少弯腰动作及弯腰程度

D.宜鼓励患者或照护者参加由康复医师实施的前庭疗法(正确答案)

132. 当患者出现精神与行为症状时，应立即移除周围所有一切物品。（） [单选题] *

A 对(正确答案)

B 错

133. 当对产生幻觉并出现游走，或夜间异常行为的患者，可实施保护性约束。（） [单选题] *

A 对(正确答案)

B 错

134.

跌倒是指住院患者在医疗机构任何场所，预见性的倒于地面或倒于比初始位置更低的地方，可伴或不伴有外伤。（） [单选题] *

A 对

B 错(正确答案)

135. 患者使用高跌倒风险药物时，在药效期内应限制活动。（） [单选题] *

A 对(正确答案)

B 错

136. 患者6小时内使用过镇静、镇痛及安眠药物，是存在跌倒中风险。（） [单选题] *

A 对

B 错(正确答案)

137. 当患者外出检查使用轮椅时，可以不使用安全带。（） [单选题] *

A 对

B 错(正确答案)

138. 在患者入院时，转科时及出院前应进行跌倒风险评估。（） [单选题] *

A 对(正确答案)

B 错

139. 在患者服用降压利尿药物时，在药效期内可正常活动。（） [单选题] *

A 对

B 错(正确答案)

140.

为预防跌倒发生应指导，因视力减弱，并曾有跌倒史的患者使用偏光眼镜。（） [单选题] *

A 对

B 错(正确答案)

141.

为了预防因肌力平衡及步态异常患者跌倒，宜协助下肢静脉曲张或静脉回流差的患者穿弹力袜，紧身裤或使用绷带等。（） [单选题] *

A 对

B 错(正确答案)

142. 放化疗期间应每日评估口腔黏膜（）次。 [单选题] *

A.1(正确答案)

B.2

C.3

D.4

143. 口腔黏膜炎可使用哪种溶液漱口（） [单选题] *

A.10%葡萄糖溶液

B.20%甘露醇溶液

C.2%-3%硼酸溶液

D.3%-5%碳酸氢钠溶液(正确答案)

144.

使用半衰期的化疗药物时，指导患者在用药前开始含冰片、冰水等保护口腔低温（
） [单选题] *

A.10min

B.20min

C.30min(正确答案)

D.60min

145. WHO口腔黏膜炎可分为几级？（） [单选题] *

A.3级

B.4级

C.5级(正确答案)

D.6级

146. 白色念珠菌感染病人应选择的漱口液是（） [单选题] *

A.1%-3%过氧乙酸溶液

B.2%-3%硼酸溶液

C.1%醋酸溶液

D.1%-4%碳酸氢钠溶液(正确答案)

147. 义齿取下后应浸泡在哪种溶液中。（） [单选题] *

A.0.5%过氧乙酸溶液

B.温开水

C.冷开水(正确答案)

D.70%乙醇

148. 口腔护理的目的不包括（） [单选题] *

- A.清除口腔内一切细菌
- B.防止口臭、口垢(正确答案)
- C.观察口腔黏膜及护理
- D.预防口腔感染

149.

口腔黏膜炎轻度风险患者进食后和睡前使用软毛牙刷刷牙，宜使用含氟牙膏，至少（）次/天。 [单选题] *

- A.1
- B.2(正确答案)
- C.3
- D.4

150. 口腔黏膜炎分级标准的二级症状是（） [单选题] *

- A.无症状
- B.口腔黏膜出现红斑，伴有疼痛，但不影响进食
- C.口腔黏膜出现红斑、溃疡，但能进固体食物(正确答案)
- D.溃疡融合成片，有坏死，不能进食

151. 放化疗期间出现口腔黏膜炎应每日评估口腔黏膜（）次。 [单选题] *

- A.1(正确答案)
- B.2
- C.3
- D.4

152. 正常口腔黏膜的PH值为（） [单选题] *

- A.5.6-6.6
- B.6.6-7.1(正确答案)

C.7.1-7.5

D.7.5-8.5

153. 对于 I、II 级口腔黏膜炎患者，应指导患者使用生理盐水或 3%-5% 的碳酸氢钠溶液漱口，至少（）次/天。[单选题]*

A.3

B.4

C.5

D.6(正确答案)

154. 放化疗相关口腔黏膜炎的表现不包括（）[单选题]*

A.红斑

B.水肿

C.糜烂、溃疡

D.口臭(正确答案)

155. 轻度风险患者的预防措施不包括（）[单选题]*

A.每两月更换一次牙刷

B.用含酒精的溶液漱口(正确答案)

C.避免进食易损伤或刺激口腔的食物

D.医护人员每日监测口腔情况，患者无需自我监测

156. 中度风险患者的预防措施正确的是（）[单选题]*

A.指导患者增加生理盐水或碳酸氢钠溶液漱口频次，至少 4 次/天(正确答案)

B.所有化疗期间都可口气那个冷疗

C.使用药物漱口液后应用清水漱口，以减少口腔黏膜的刺激

D.以上都对

157. 对于口腔黏膜炎引起继发性感染，应（）[单选题]*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/608006030126006034>