

## 护理理论测试试题及答案解析

1. 实施人工呼吸前首要的护理措施是 (C)
  - A. 将患者安置在空气新鲜的地方
  - B. 密切观察患者胸部的起伏状况
  - C. 清除口鼻内的分泌物、呕吐物
  - D. 取下活动义齿，用开口器打开口腔
  - E. 为患者取侧卧位并松开领口
2. 确诊心搏骤停的最简便依据是 (D)
  - A. 血压测不到
  - B. 瞳孔缩小
  - C. 面色发绀
  - D. 大动脉搏动消失
  - E. 心音消失
3. 患者，男，39岁，搬运工人，右下肢大隐静脉曲张2年，近日踝部皮肤颜色加深，常发生疼痛。入院后为该患者行保守治疗。针对该患者的护理措施，错误的是 (B)
  - A. 穿弹力袜
  - B. 卧床时抬高患肢  $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$
  - C. 双膝勿交叉过久
  - D. 保持大便通畅
  - E. 避免长时间站立
4. 为预防下肢深静脉血栓患者出现栓塞，应禁止 (A)
  - A. 按摩患肢
  - B. 活动健肢
  - C. 抬高患肢
  - D. 患肢热敷
  - E. 患肢制动
5. 急性心包炎早期表现中具有诊断价值的是 (C)
  - A. 发热

B.血压下降、脉压减小

C.心包摩擦音

D.呼吸深大

E.胸痛

6.患者女，72岁。患扩张型心肌病伴慢性右心衰5年，长期卧床，皮肤护理时，应着重预防压疮发生的部位是（C）

A.肩胛部

B.枕部

C.腰骶部

D.胫前部

E.足踝部

7.患者男，46岁。在家中自行修理电路，不慎触电跌倒，此时急救的首要步骤（B）

A.清除呼吸道分泌物

B.胸外心脏按压

C.应用简易呼吸器

D.给予氧气吸入

E.口对口人工呼吸

8.梗阻性肥厚型心肌病患者最常见的死亡原因是（A）

A.猝死

B.脑卒中

C.休克

D.心肌梗死

E.肺栓塞

9.目前医学界对死亡的判断依据是（D）

A.呼吸停止

B.心跳停止

C.各种反射消失

D.脑出现不可逆的死亡

E.瞳孔散大，对光反射消失

10.患者，男，39岁，因胸痛2小时入院，有肥厚型心肌病史。首要的护理措施是（A）

- A.给氧
- B.进行入院评估
- C.体格检查
- D.饮食指导
- E.活动指导

11.关于肺循环的途径，正确的是（A）

- A.右心室-肺动脉-肺毛细血管-肺静脉-左心房
- B.右心室-肺静脉-肺毛细血管-肺动脉-左心房
- C.左心室-肺静脉-肺毛细血管-肺动脉-右心房
- D.左心室-肺动脉-肺毛细血管-肺静脉-右心房
- E.右心室-肺动脉-奇静脉-肺静脉-左心房

12.患者男，46岁。严重外伤抢救无效。患者对任何刺激均无反应，呼吸及心跳停止，脑电波平直，该患者处于（A）

- A.脑死亡期
- B.深昏迷
- C.躯体死亡期
- D.浅昏迷
- E.濒死期

13.护士在给患者做心电图时，V4导联正确的位置是（C）

- A.胸骨左缘第4肋间
- B.左腋窝前线第5肋间
- C.左锁骨中线第5肋间
- D.左腋前线第4肋间
- E.左锁骨中线第4肋间

14.腹部触诊有“揉面感”提示（C）

- A.腹水
- B.急腹症

C.结核性腹膜炎

D.急性胰腺炎

E.急性阑尾炎

15.血钾升高见于 (C)

A.慢性肾衰竭早期

B.剧烈呕吐

C.大量使用螺内酯

D.严重腹泻

E.大量使用呋塞米

16.胸腔积液患者，其心尖搏动位置的改变为 (E)

A.向上移位

B.向下移位

C.向患侧移位

D.向健侧移位

E.不能确定

17.病理反射为 (C)

A.刺激皮肤黏膜引起的反射

B.刺激骨骼肌腱引起的反射

C.锥体束受损的表现

D.脑膜受到激惹后的表现

E.锥体束亢进的表现

18.血小板减少，是指血小板计数低于 (D)

A. $100 \times 10^6/L$

B. $200 \times 10^6/L$

C. $300 \times 10^6/L$

D. $100 \times 10^9 /L$

E. $150 \times 10^9/L$

19.舟状腹最常见于 (C)

A.肝硬化

- B.心功能不全
- C.恶性肿瘤晚期
- D.肾病综合征
- E.结核性腹膜炎

20.下列可引起心室后负荷过重的疾病是 (A)

- A.高血压
- B.瓣膜关闭不全
- C.室间隔缺损
- D.甲状腺功能亢进
- E.贫血

21.心源性呼吸困难最先出现的是 (C)

- A.阵发性夜间呼吸困难
- B.端坐呼吸
- C.劳力性呼吸困难
- D.心源性哮喘
- E.急性肺水肿

22.产生第一心音的主要机制是 (C)

- A.主动脉瓣、肺动脉瓣关闭
- B.主动脉、肺动脉瓣开放
- C.二尖瓣、三尖瓣关闭
- D.二尖瓣、三尖瓣开放
- E.心房、心室肌收缩

23.护理查体：患者腹壁静脉曲张，脐以上静脉血流由下向上，脐以下静脉血流亦由下向上。最可能的原因是 (B)

- A.肝门静脉高压
- B.下腔静脉回流受阻
- C.脾功能亢进
- D.上腔静脉回流受阻
- E.肠麻痹

24.检查发现患者颈静脉怒张,吸气时脉搏明显减弱,考虑其最可能的诊断是(D)

A.主动脉瓣关闭不全

B.右心功能不全

C.肝硬化

D.心包积液

E.心肌梗死

25.患者女,因颜面水肿3日而收治入院。查内生肌酐清除率为65ml/min,可判断其肾功能为(B)

A.正常

B.轻度损害

C.中度损害

D.重度损害

E.肾衰竭

26.患儿男,8岁。未诉特殊不适。查体发现吸气时脉率增快,呼气时脉率减慢,可能的原因是(A)

A.窦性心律不齐

B.早搏

C.房颤

D.心包积液

E.心功能不全

27.提示左心衰的临床表现是(E)

A.奇脉

B.平脉

C.水冲脉

D.脉搏短绌

E.交替脉

28.右心功能不全主要临床症状出现的病理生理基础是(B)

A.肺循环淤血

B.体循环淤血

- C.心肌损害
- D.心室重构
- E.血流动力学改变

29.右心衰患者最早出现的体征是 (A)

- A.下肢水肿
- B.颈静脉充盈
- C.肝颈静脉反流征阳性
- D.肝大
- E.杵状指

30.患者女, 55 岁, 风湿性心脏瓣膜病, 平时一般活动无明显症状, 近两日感冒后, 出现明显心力衰竭的临床表现, 入院治疗, 护士在评估时, 提示患者心衰严重的表现是 (E)

- A.体温 37.5℃
- B.血压 95/65mmHg
- C.心率 95 次/分
- D.听力减弱
- E.端坐体位

31.刺激性呛咳或带金属音的咳嗽应首先考虑 (E)

- A.上呼吸道感染
- B.肺部病变早期
- C.左心功能不全
- D.支气管扩张
- E.支气管肺癌

32.关于结核菌素试验结果的描述, 下列正确的是 (B)

- A.凡是结核菌素试验阴性都可以除外结核
- B.卡介苗接种成功, 结核菌素反应多呈阳性
- C.重症肺结核的结核菌素反应为阳性
- D.结核菌素试验阳性, 肯定有结核病
- E.初次感染结核后 4 周内, 结核菌素试验阳性

33.长期服用利尿剂(呋塞米)的心衰患者，护士应当关注的不良反应是 (B)

- A.低血压
- B.低血钾
- C.低血钠
- D.脱水
- E.发热

34.患者女性，60岁，因心律失常入院，入院后给予心电监护。护士在观察心电监护时，出现下列哪种心律失常可导致猝死 (D)

- A.心房颤动
- B.阵发性室上性心动过速
- C.室性期前收缩
- D.阵发性室性心动过速
- E. II度房室传导阻滞

35.患者男，72岁。因急性前壁心肌梗死收入院。入院后已行面罩吸氧，建立静脉通路，心电监护提示频发、多源性室性早搏。护士在床边准备抢救用品，最重要的是 (B)

- A.呼吸机
- B.除颤仪
- C.吸痰器
- D.气管切开包
- E.吸氧饱和度仪

36.频发早搏的心律失常患者，不可饮用浓茶的目的主要是避免 (C)

- A.过多  $Ca^{2+}$ 的摄入
- B.过多  $K^{+}$ 的摄入
- C.过多咖啡因的摄入
- D.过多液体的摄入
- E.影响铁的摄入

37.心室颤动患者的脉搏特征是 (E)

- A.快而规则



- B.慢而规则
- C.快而不规则
- D.慢而不规则
- E.摸不到

38.目前认为先天性心脏病的主要病因是 (E)

- A.宫内细菌感染
- B.胎盘早剥
- C.母亲妊娠毒血症
- D.宫内支原体感染
- E.宫内病毒感染

39.属于青紫型先天性心脏病的是 (A)

- A.法洛四联症
- B.室间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.房间隔缺损
- E.主动脉缩窄

40.患儿，女，6岁，已确诊为室间隔缺损，需做扁桃体切除术，按医嘱使用抗菌药物，其用药主要的目的是预防 (C)

- A.肺炎
- B.支气管炎
- C.感染性心内膜炎
- D.扁桃体周围脓肿
- E.变态反应性疾病

41. 患者男，8个月，因“体检发现心脏杂音”入院，诊断为“先天性心脏病，室间隔缺损”，患者入院后行室间隔缺损修补术，术后进行监护，给予呼吸机辅助呼吸，护士术后进行健康评估的重点是 (A)

- A.呼吸
- B.血压
- C.心率

D.尿量

E.体温

42.为慢性心力衰竭患者进行输液治疗时，输液速度宜控制在（B）

A.10～20 滴/分

B.20～30 滴/分

C.30～40 滴/分

D.40～50 滴/分

E.50～60 滴/分

43.慢性肺源性心脏病早期可出现（C）

A.主动脉瓣关闭不全

B.左心室肥大

C.右心室肥大

D.左心房肥大

E.二尖瓣关闭不全

44.进行腹式呼吸锻炼时，下列动作中应予以纠正的是（C）

A.吸气时腹部用力挺出

B.呼气时腹部尽力收缩

C.深吸快呼

D.鼻吸口呼

E.深吸慢呼

45.静脉推注氨茶碱速度要慢，否则可出现（B）

A.口干、皮疹

B.心律失常、血压下降等

C.红斑和视物模糊

D.腹绞痛和腹泻

E.耳鸣和高血压

46.不符合心源性水肿的是（A）

A.水肿从眼睑开始

B.水肿呈凹陷性

- C.体循环淤血导致水肿
- D.水肿部位易发生溃烂
- E.摄入钠盐过多可加重水肿

47.心绞痛发作的典型部位在 (D)

- A.心尖部
- B.心前区
- C.剑突附近
- D.胸骨体中上段之后部
- E.胸骨体中下段之后部

48.患者,男,56岁。突然心悸、气促、咳粉红色泡沫痰,血压 26/12kPa(195/90mmHg),心率 136 次/分,你应首先备好下列哪组药物 (B)

- A.毛花苷, 硝酸甘油, 异丙肾上腺素
- B.硝普钠, 毛花苷 C, 呋塞米
- C.毒毛花苷 K, 硝普钠, 普萘洛尔
- D.胍乙啶, 酚妥拉明, 毛花苷 C
- E.硝酸甘油, 毛花苷 C, 多巴胺

49.心绞痛疼痛时典型的心电图表现是 ( B)

- A.S-T 段抬高
- B.高尖 T 波
- C.ST 段压低 $>0.1\text{mV}$ , T 波低平或倒置
- D.病理性 Q 波
- E.P-R 间期延长

50.急性心肌梗死患者发生左心衰竭的主要原因是 (E)

- A.肺部感染
- B.心脏负荷加重
- C.房室传导阻滞
- D.情绪激动
- E.心肌收缩力减弱和不协调

2022 年 6 月护理理论月考 19:00-19:45

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/608007103125006036>