

口腔执业医师模拟题215

A1型选择题

1. 为减轻Kennedy第一、第二类缺损者游离端基牙的负担，除采用RPI卡环以外，还可采用

- A.对半卡环
- B.延伸卡环
- C.圈形卡环
- D.回力卡环
- E.圆环形卡环

答案：D

回力卡环位于基牙远中的卡体和支托部分不直接与游离鞍基相连，而是在其舌侧卡臂尖处通过小连接体与义齿支架相连，具有应力中断作用，可以减小游离端缺失末端基牙所受到的扭力和负担。

2. 龈下刮治放入器械时，工作端平面与牙根面之间的最佳角度是

- A.0度
- B.40度
- C.80度

D.90度

E.110度

答案：A

龈下刮治中，放入器械时，工作端平面与牙根面之间的最佳角度是0度，刮除牙石时的最佳角度是80度。

3. 检查患者的牙齿是否是对刃时，患者的下颌应该处于下列何种位置

A . 正中关系

B . 息止颌位

C . 正中

殆

位

D . 肌接触位

E . 非正中

殆

关系

答案：C

下颌位于正中

𠄎

位。若上下牙齿彼此切缘相对，或颊尖相对，称为对刃。

4. 关于复合固定桥，下列哪一点是错误的

A. 含有两个以上基牙

B. 基牙数目多而分散，获得共同就位道较难

C. 有两种或三种基本类型的固定桥组合

D. 常含有4个或4个以上的牙单位

E. 当承受

𠄎

力时，各个基牙的受力反应基本一致

答案：E

复合固定桥是将两种或两种以上基本类型结合在一起的固定桥组合。常含有4个或4个以上的牙单位，基牙数目多而分散，获得共同就位道较难，当承受

拾

力时，各个基牙的受力反应是不一致的。

5. 工作长度错误的测量方法是

A.患者感觉法

B.根管器械探测法

C.X线片根管测量法

D.根管长度电测量仪

E.X线片诊断丝测量法

答案：A

用患者感觉法来确定工作长度受许多因素影响，很不准确，是错误的。

6. 口腔预防医学的主要研究对象是

A.个体

B.群体

C.儿童

D.残疾人

E.老年人

答案：B

口腔预防医学的主要研究对象是社区群体的口腔保健，口腔临床医学的主要研究对象是个体。

7. 口腔健康调查方法之一是

A.访问调查

B.随机调查

C.抽样调查

D.定点调查

E.入户调查

答案：C

口腔健康调查方法分为普查和抽样调查两大类，还有WHO推荐的试点调查和捷径调查。

8. 牙周病维护期应进行的内容是

A.长期服用抗生素

- B.有问题出现时才需复查
- C.定期牙周检查及洁治
- D.只针对口腔卫生差的人进行宣教
- E.复查时应每2个月拍X线片

答案：C

牙周病维护期应进行的内容包括三部分内容；对病情的评估、必要的治疗、确定复查间隔期。定期牙周检查、洁治、口腔卫生宣教是必不可少的内容。所有牙周治疗患者均应进行维护治疗，并非只针对口腔卫生差的患者，也不能等有问题时才复查。

9. 下面哪项三级预防的概念是不对的

- A.三级预防包括龋齿早期充填
- B.二级预防不包括恢复口腔功能
- C.二级预防是“干预”性治疗
- D.初级预防又称一级预防
- E.窝沟封闭属于初级预防

答案：A

三级预防的主要内容是恢复口腔功能(疾病后期复杂治疗)，而龋齿早期充填是疾病中期“干预”性治疗。

10. 牙周维护期中，保持口腔卫生最重要的因素是

A.牙刷头的设计

B.刷牙所用的时间

C.患者的重视度

D.刷牙的次数

E.是否用含氟牙膏

答案：C

牙周维护期中，保持口腔卫生最重要的因素是患者对保持口腔卫生的重视程度。

11. 影响龋病流行的有关因素包括

A.城乡分布

B.性别因素

C.钙的摄入量

D.地区差异

E.饮食习惯

答案：E

影响龋病流行的有关因素有氟摄入量、饮食习惯和家族影响。

12. 临床窝沟封闭术失败的原因最主要是

A.适应证选择不当

B.酸蚀面积不够大

C.酸蚀后唾液污染

D.光固化时间太短

E.涂布封闭剂有气泡

答案：C

临床窝沟封闭术失败的最主要原因是隔湿不好，造成酸蚀后唾液污染封闭剂脱落。

13. 乳牙患龋的高峰时期是

A.半岁~2.5岁

B.3~4岁

C.5 ~ 6岁

D.7 ~ 8岁

E.9 ~ 10岁

答案：D

乳牙龋病发生早，患病率高，7 ~ 8岁时为86%，达到高峰。

14. 用四环素族类药物可致恒牙发生四环素牙的时期是

A.胚胎4个月

B.胚胎6个月

C.出生以前

D.7岁以前

E.8岁以后

答案：D

用四环素族类药物可致恒牙发生四环素牙的时期是7岁以前，即牙齿的发育矿化期。

15. 龋均(DMFT)指的是受检人群中平均每人

A.患龋牙数

B.患龋牙面数

C.患龋失补牙数

D.患龋失补牙面数

E.患龋拔补牙面数

答案：C

龋均指的是受检人群中平均每人患龋(D)失(M)补(F)的牙数(T)。

16. 较为公认的牙周病致病微生物主要是

A.需氧菌

B.外源性特异致病菌

C.病毒

D.外源性感染的真菌

E.厌氧菌

答案：E

龈下菌斑中的厌氧菌是牙周炎的主要致病菌。

17. 生活在高氟区可导致氟斑牙发生的年龄是

A.7岁以前

B.8 ~ 15岁

C.16 ~ 22岁

D.23 ~ 30岁

E.31岁以后

答案：A

氟斑牙是人体摄入氟量过高所致。氟主要损害釉质发育期牙胚的造釉细胞，因此，过多的氟只有在牙齿发育矿化期进入机体，才能发生氟牙症。7岁之前正是所有牙齿釉质发育完成的时期。

18. WHO制定的2010年口腔健康目标中5 ~ 6岁儿童无龋率应该是

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

E.90%

答案：E

WHO1994年制定的2010年口腔健康目标之一是5~6岁儿童90%无龋。

19. 作为一项公共卫生措施的氟化物防龋方法是

A. 饮水加氟

B. 含氟牙膏

C. 牛奶加氟

D. 口服氟片

E. 氟凝胶

答案：A

可以作为公共卫生措施的氟化物防龋方法只有饮水加氟一项。

20. 口腔流行病学的作用不是用于研究

A. 统计资料的分析

B. 疾病的流行因素

C.疾病预防措施的效果

D.规划保健工作

E.口腔疾病的自然史

答案：A

统计资料的分析属于统计学范畴而不属于口腔流行病学的作用。

21. 龋病的二级预防包括

A.应用氟化物

B.窝沟封闭

C.早期充填

D.合理饮食

E.口腔健康教育

答案：C

早期充填是龋病的二级预防内容，应用氟化物、窝沟封闭、合理饮食和口腔健康教育都是龋病的一级预防内容。

22. WHO用于牙周疾病调查的指数是

A.口腔卫生指数OHI

B.社区牙周指数CPI

C.软垢指数DI

D.菌斑指数PLI

E.牙龈指数GI

答案：B

WHO用于牙周疾病调查的指数原为CPITN指数，在1997年口腔健康调查基本方法第4版时进行了修改，现在是CPI指数。

23. 能够清洁牙齿邻面菌斑的口腔保健晶是

A.漱口水

B.含氟牙膏

C.保健牙刷

D.牙线

E.口香糖

答案：D

在5个选项里只有牙线是能够清洁牙齿邻面菌斑的口腔保健品。

24. 影响牙周疾病流行的因素包括

A.甜食

B.吸烟

C.嚼槟榔

D.饮酒

E.喝茶

答案：B

影响牙周疾病流行的因素包括口腔卫生、吸烟和营养。

25. WHO口腔健康标准中下面哪项是错误的

A.牙无龋洞

B.无疼痛感

C.牙列不齐

D.牙龈颜色正常

E.无出血现象

答案：C

WTO的口腔健康5项标准是：牙齿清洁、无龋洞、无疼痛感、牙龈颜色正常和无出血现象。

26. WHO口腔健康目标2010年65～74岁的老年人保持20颗功能牙为

A.75%

B.65%

C.55%

D.45%

E.35%

答案：A

WT01994年制定的2010年口腔健康目标之一是65～74岁的老年人：无牙颌不超过5%；75%至少保持20颗功能牙；CPI记分为4不超过0.5个区段。

27. 牙周病维护治疗中复查间隔应是

A.每年一次

B.每2年一次

C.根据病人具体情况而定

D.出现症状时复查

E.每月一次

答案：C

牙周病维护治疗中复查间隔应根据病人具体情况而定。

28. 乳牙患龋的最早年龄

A.生后6个月

B.1岁

C.3岁

D.6岁

E.7~8岁

答案：A

乳牙在萌出不久即可患龋，生后6个月乳牙即可萌出，就可患龋。

29. 龋病流行的人群分布因素中包括

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/608065133010006052>