

助理医师考试临床助理(习题卷128)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]男，50岁，突起呼吸困难，咳粉红色泡沫痰，血压25.3/13.3kPa(190/100mmHg)。该患者的最佳治疗药物是
- A) 西地兰
 - B) 氨茶碱
 - C) 硝普钠
 - D) 多巴酚丁胺
 - E) 硝酸甘油
2. [单选题]肺表面活性物质减少将导致
- A) 小肺泡内压小于大肺泡内压
 - B) 肺弹性阻力减小
 - C) 肺难于扩张
 - D) 肺泡内液体表面张力降低
 - E) 肺顺应性增大
3. [单选题]患者女，52岁。12小时前发生腹痛，始在脐周，为隐痛不适，发病后2小时突然腹痛加剧，扩散至全腹，呈持续性胀痛，伴恶心，呕吐1次，为少量胃内容物。轻度发热，体温37.5℃。查体：急性痛苦面容，BP130/80mmHg，P106次/分，心肺无异常，全腹均有压痛，但以右下腹部压痛明显，并有肌紧张和反跳痛。结肠充气试验(+)，WBC 25×10^9
- 9
- /L。此病人应考虑为
- A) 急性胆囊炎合并腹膜炎
 - B) 急性胰腺炎合并腹膜炎
 - C) 急性阑尾炎、穿孔腹膜炎
 - D) 右输卵管妊娠破裂出血
 - E) 溃疡病穿孔腹膜炎
4. [单选题]关于类风湿性关节炎，下列哪项是错误的
- A) 儿童类风湿性关节炎称为Still病，可有高热、贫血、脾大及白细胞增多
 - B) 发病年龄多为45岁以上女性
 - C) 本病可反复发作，间歇期不等，逐渐加重
 - D) 发病缓慢，早期出现乏力，全身肌肉痛，低热和手足麻木、刺痛等全身症状
 - E) 常见的局部症状为隐痛、关节压痛、僵硬，晨起明显，主动活动和被动活动均受限
5. [单选题]女，16岁。服“药水”10ml后出汗，咳白色及粉红色泡沫痰，昏迷，抽搐，肌束震颤。体检：呼吸有蒜味，呼吸30次/分，血压100/70mmHg，双瞳孔针尖大小，两肺湿啰音，心率64次/分，律齐。最可能的诊断是()。
- A) 急性氰化物中毒
 - B) 急性有机磷中毒
 - C) 急性苯中毒
 - D) 急性硫化氢中毒

E) 急性巴比妥中毒

6. [单选题] 男性，30岁，患病4周，以高热为主，曾确诊为伤寒，日前体温开始下降，食欲好转，体力渐增，脾肿大开始回缩，要特别重视

- A) 加强营养
- B) 增加活动
- C) 限制饮食
- D) 继续用足量抗生素
- E) 充足睡眠

7. [单选题] 最早进行胎儿遗传性疾病诊断的方法为关于产前诊断的方法

- A) 绒毛活检术
- B) 超声影像检查
- C) 羊膜腔穿刺术
- D) 脐带血穿刺术
- E) 孕妇外周血分离胎儿细胞

8. [单选题] 前列腺增生最重要的症状是

- A) 尿频
- B) 尿急
- C) 尿痛
- D) 血尿
- E) 排尿困难

9. [单选题] 男，29岁。转移性右下腹痛伴发热36小时入院，诊断为急性阑尾炎。入院后腹痛加重，伴有寒战， $T40^{\circ}\text{C}$ ，巩膜轻度黄染，剑突下压痛，右下腹肌紧张，右下腹明显压痛、反跳痛，最可能的诊断是

- A) 急性阑尾穿孔
- B) 阑尾炎合并胃穿孔
- C) 腹膜炎引起溶血性黄疸
- D) 门静脉炎
- E) 阑尾与结肠形成内瘘

10. [单选题] 阴囊内无痛性包块，透光试验阳性。最可能的诊断是（ ）。

- A) 睾丸肿瘤
- B) 腹股沟斜疝
- C) 附睾结核
- D) 精索静脉曲张
- E) 鞘膜积液

11. [单选题] 增生型肠结核的最常见症状就是

- A) 腹泻
- B) 便秘
- C) 脓血便
- D) 盗汗
- E) 消瘦

12. [单选题] 心交感神经和副交感神经的节前神经元递质（ ）。

- A) 肾上腺素
- B) 乙酰胆碱
- C) 去甲肾上腺素
- D) 甘氨酸

E) 多巴胺

13. [单选题]肝颈静脉回流征阳性可见于

- A) 右心衰竭
- B) 感染性休克
- C) 乙肝后肝硬化
- D) 酒精性肝硬化
- E) 急性重症肝炎

14. [单选题]男性，30岁，因车祸致骨盆骨折，不能自行排尿，膀胱充盈，导尿管不能插入膀胱，多为（ ）。

- A) 膀胱破裂
- B) 后尿道断裂
- C) 尿道球部损伤
- D) 尿道悬垂部损伤
- E) 直肠损伤

15. [单选题]冯医生最近被任命为医务科的科长，其工作中的一个重要方面是处理医疗事故，对于处理医疗事故他有自己的理解，下列他的说法哪项是正确的

- A) 医院为患者复印病历不能向患者收取任何费用
- B) 患者要求复印病历的时候，医疗机构自行将相关内容复印之后交给患者即可
- C) 医院方可以单独委托相关医学会对医疗事故进行鉴定
- D) 医院发生了患者死亡的医疗事故，应该在12小时之内上报所在地卫生行政部门
- E) 如遇抢救危急患者未能及时书写病历时，可以在抢救后6小时内补记

16. [单选题]下列哪项检查对肥厚型梗阻性心肌病最有诊断价值

- A) 胸部X线检查
- B) 心电图
- C) 心音图
- D) 超声心动图
- E) 心功能检查

17. [单选题]11个月男婴，一直母乳喂养，辅食添加不良，近3个月来面色渐苍黄，间断腹泻，原可站立，现坐不稳，手足常颤抖。体检面色苍黄，略水肿，表情呆滞，血红蛋白80g/L，红细胞 $2.0 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ 。[问题

1][题]该患儿首先考虑的诊断是

- A) 大脑发育不全
- B) 维生素D缺乏性佝偻病
- C) 营养性缺铁性贫血
- D) 维生素D缺乏性手足搐搦症
- E) 营养性巨幼红细胞性贫血

18. [单选题]苯丙酮尿症患儿应采取的措施是

- A) 观察，抽搐时给予止抽搐药物
- B) 口服甲状腺素片
- C) 静脉推注10%葡萄糖酸钙，同时口服维生素D
- D) 限制苯丙氨酸摄入量
- E) 口服碘化钾

19. [单选题]女，32岁，药物流产后3天，左下腹痛伴发热2天。妇科检查：阴道脓性分泌物，宫颈举痛，子宫饱满，压痛（+），右附件区明显压痛。最可能的诊断是（ ）。

- A) 卵巢巧克力囊肿破裂
- B) 急性阑尾炎

- C) 卵巢黄体破裂
- D) 异位妊娠破裂
- E) 急性盆腔炎

20. [单选题]女，32岁，因气候突变，感到头痛，鼻塞，体温37.2℃，自认为感冒，便服阿司匹林一片，30分钟后突感不适，呼吸困难，大汗。产生这些症状的原因是

- A) 阿司匹林过量
- B) 冷空气对呼吸道的刺激
- C) 阿司匹林增加TXA₂生成
- D) 阿司匹林抑制PGI₂的合成
- E) 阿司匹林抑制PG合成，使白三烯增多

21. [单选题]5岁男孩，自幼口唇、甲床青紫，活动后气促，乏力，体格发育落后，胸骨左缘第2~3肋间可闻及Ⅲ级收缩期杂音，经超声心动图证实为先天性心脏病，法洛三联症。[问题2][题]若患儿突然发生昏厥、抽搐可能是出现了下列哪种并发症

- A) 支气管肺炎
- B) 肺动脉梗阻
- C) 充血性心力衰竭
- D) 癫痫
- E) 低钙惊厥

22. [单选题]肝硬化门静脉高压症最具诊断价值的表现是

- A) 腹腔积液
- B) 脾肿大，脾功能亢进
- C) 腹壁静脉曲张
- D) 食管下段、胃底静脉曲张
- E) 黄疸

23. [单选题]男性患者，25岁，外伤致左侧股骨干闭合性骨折，骨折无明显移位，X线：左股骨干横行骨折，治疗首选

- A) 切开复位内固定
- B) 外固定架固定
- C) 卧床休息，严格制动
- D) 手法复位，小夹板固定外加重量牵引
- E) 手法复位，石膏固定

24. [单选题]下述肺癌症状中最常见的早期症状是

- A) 胸闷、气急
- B) 持续性胸痛
- C) 发热
- D) 咯血
- E) 咳嗽

25. [单选题]关于肺炎的描述哪项不准确？

- A) 指终末气道的炎症
- B) 肺泡的炎症
- C) 肺间质的炎症
- D) 肺血管的炎症
- E) 可由药物所致

26. [单选题]女，28岁。因左肾结核1年前行左肾切除术，术后应用抗结核药物，尿频不见好转，现每次尿量40ml左右。化验：血沉正常，尿镜检白细胞2~3/HP，红细胞0~1/HP，尿抗酸菌2次阳性；IVU:右肾盂肾盏显示有轻度积水，膀胱小

而圆形。其治疗是

- A) 继续抗结核治疗
- B) 右肾造瘘术
- C) 右输尿管皮肤造口术
- D) 肠膀胱扩大术
- E) 中药治疗

27. [单选题] 上消化道出血范围是

- A) 贲门以上出血
- B) 幽门以上出血
- C) Treitz韧带以上出血
- D) 空回肠交界处以上出血
- E) 回盲部以上出血

28. [单选题] 下列有关琥珀酰胆碱哪个叙述是错误的

- A) 属于非除极化型肌松药
- B) 与抗胆碱酯酶药有加强作用
- C) 可使血钾升高
- D) 肌松作用极短，并伴有骨骼肌的短期纤颤
- E) 主要被血浆胆碱酯酶水解

29. [单选题] 急性起病的神经系统疾病有

- A) 肿瘤
- B) 老年性痴呆
- C) 神经系统变性
- D) 遗传疾病
- E) 血管疾病

30. [单选题] 男，44岁。因急性继发性腹膜炎入院，行非手术治疗。观察10小时，如决定手术治疗，不属于其手术适应证的是（ ）。

- A) 呼吸性碱中毒
- B) 出现休克
- C) 腹痛进行性加重
- D) 腹腔积液增多
- E) 病因诊断明确

31. [单选题] 男性，66岁，劳累时胸骨后疼痛1年"余，每周2~3次，含服硝酸甘油后迅速缓解。4小时前剧烈胸痛伴大汗，含服硝酸甘油20分钟不缓解。下列心电图改变对此患者诊断心肌梗死最有帮助的是

- A) Q波
- B) 高耸T波
- C) 第一度房室传导阻滞
- D) ST段压低
- E) 频发室性早搏

32. [单选题] 呼吸衰竭患者缺氧的典型表现是

- A) 呼吸困难
- B) 呼吸急促
- C) 发绀
- D) 心率增快
- E) 神经精神症状

33. [单选题]呼吸性酸中毒

- A) pH: 7.35; PaO₂: 95mmHg; PaCO₂: 40mmHg; HCO₃⁻: 27mmol/L; BE: +2mmol/L
- B) pH: 7.25; PaO₂: 80mmHg; PaCO₂: 70mmHg; HCO₃⁻: 23mmol/L; BE: +1mmol/L
- C) pH: 7.20; PaO₂: 96mmHg; PaCO₂: 55mmHg; HCO₃⁻: 18mmol/L; BE: -3mmol/L
- D) pH: 7.40; PaO₂: 98mmHg; PaCO₂: 45mmHg; HCO₃⁻: 23mmol/L; BE: +2.3mmol/L
- E) pH: 7.45; PaO₂: 100mmHg; PaCO₂: 40mmHg; HCO₃⁻: 22mmol/L; BE: -2.3mmol/L

34. [单选题]女性, 38岁。1年来面色苍白伴倦怠、耳鸣就诊。化验: RBC 2.5×10

12

/L, Hb55g/L, MCV75fl(75um³), MCH22pg, MCHC0.29(29%), 红细胞中央淡染区扩大, 网织红细胞0.02(2%), 拟诊缺铁性贫血。在问诊时哪项与本病发病无关

- A) 家族中有无同样疾病史
- B) 有无月经过多史
- C) 有无易兴奋、易激动、烦躁等症状
- D) 有无中上腹疼痛及黑便史
- E) 有无嗜食泥土、煤屑、生米等异食癖

35. [单选题]患者女, 33岁。健康体检时ECG发现偶发房性期前收缩。既往体健。查体: 心界不大, 心率80次/分, 心脏各瓣膜区未闻及杂音。该患者最恰当的处理措施是

- A) 寻找病因, 定期随访
- B) 口服普罗帕酮
- C) 口服美西律
- D) 口服胺碘酮
- E) 静脉注射利多卡因

36. [单选题]成人, 体重60kg。烧伤, 于下午4时, 送入医院急诊室, 检查: 意识清楚, 能合作, 心率100次/分, 血压120/84mmHg, 面部、胸、腹部, 两前臂、两手及两小腿和足部II°、III°烧伤, 下午5时开始静脉输液, 6时入手术室、清创, 晚上8时送病房。烧伤后第一个24小时应补给胶、晶体液计算量为()。

- A) 5000ml
- B) 5400ml
- C) 6000ml
- D) 6200ml
- E) 6800ml

37. [单选题]社区获得性肺炎中最常见的革兰阴性菌是

- A) 大肠杆菌
- B) 不动杆菌
- C) 铜绿假单胞菌
- D) 流感嗜血杆菌
- E) 肺炎克雷白菌

38. [单选题]当PaO

2

为何值时, 血氧饱和度才能较好地反映缺氧状态

- A) PaO

2

必须大于90mmHg

- B) PaO

2

<60mmHg

C) PaO

2

等于70mmHg

D) Pao

2

可为任何值

E) Pao

2

需大于60mmHg

39. [单选题]室性心动过速伴严重血流动力学障碍时，终止发作的首选方法是（ ）。

A) 利多卡因

B) 胺碘酮

C) 同步电复律

D) 人工起搏超速抑制

E) 压迫颈动脉窦

40. [单选题]16岁女性，患感冒后出现眼睑下垂9天。无多汗、震颤等表现。检查：血压正常。瞳孔正圆、等大，对光反射存在。右眼外展、内收有中等度障碍，向上、向下视也有轻度障碍。左眼只有轻度内收障碍。眼轮匝肌、咬肌、口轮匝肌有轻度肌力减退。四肢肌力正常。无肌萎缩，无反射异常和感觉异常。甲状腺轻度肿大。经做某一试验，神经症状得以一过性完全消失。该病的诊断首先考虑下列哪个病

A) 眼咽型肌营养不良症

B) 多发性肌炎

C) 皮肌炎

D) Fisher综合征

E) 重症肌无力症

41. [单选题]男性，67岁，患高血压心脏病10年，因劳累突然出现呼吸困难，不能平卧，急查血压80 / 60mmHg，心率130次 / 分。最可能的诊断

A) 肺栓塞

B) 支气管哮喘

C) 急性左心衰

D) 急性心包炎

E) 自发性气胸

42. [单选题]25岁初孕妇，孕36周，未经产前检查，诉下肢水肿半月，近3日头痛，今晨出现视物不清及头痛加重，且呕吐2次，查尿蛋白2.5g / 24h。决定是否应用扩容剂，最简单且有价值的检查项目是

A) 血细胞比容

B) 血红蛋白

C) 尿比重

D) 血清铁

E) 24小时尿蛋白定量

43. [单选题]医师的特殊干涉权不应行使和行使无效的情况是

A) 危重患者要求了解自己疾病的真相，了解可能产生不良影响

B) 对需要进行隔离治疗的传染病患者的隔离

C) 病情紧急，而患者与家属拒绝接受手术时

D) 精神病患者或自杀未遂等拒绝治疗时，甚至患者想要或正在自杀时

E) 在进行试验性治疗时，虽然患者已知情同意，一旦出现高度危险情况时，医师必须中止试验性治疗

44. [单选题] 患者男，49岁。胃溃疡病史12年，近3个月上腹痛无规律，食欲减退，粪便隐血检查多次阳性。3个月前行全麻外科手术，术后出现腹胀、呕吐等胃肠症状。最有可能的诊断是

- A) 溃疡并出血
- B) 幽门管溃疡
- C) 幽门梗阻
- D) 应激性溃疡
- E) 溃疡伴息肉

45. [单选题] 病人发生绞窄性肠梗阻时，其病理生理改变中错误的是

- A) 脱水
- B) 有效循环血量减少
- C) 严重的代谢性碱中毒
- D) 大量毒素吸收
- E) 最终发生肠坏死和穿孔

46. [单选题] 耻骨和坐骨骨折的特有体征是

- A) 肢体长度不对称
- B) 骨盆分离试验阳性
- C) 挤压试验阳性
- D) 腹腔内脏器损伤
- E) 会阴部瘀斑

47. [单选题] 关于淋病的描述，以下哪项错误

- A) 宫颈充血、水肿、脓性分泌物
- B) 分泌物淋球菌培养阳性率低，不可靠
- C) 分泌物涂片检查，找到革兰染色阴性双球菌，即可诊断
- D) 作后穹窿穿刺，抽出液中可找到淋球菌
- E) 淋病的治疗首选大剂量青霉素治疗

48. [单选题] 二尖瓣狭窄时X线检查心影呈梨形是由于

- A) 左右房增大
- B) 主动脉弓突出
- C) 左右室均扩大
- D) 肺动脉主干、左心耳及右心室增大
- E) 左房左室扩大

49. [单选题] 切除子宫做病理检查，光镜下见子宫壁深肌层内有大量异型的滋养层细胞浸润，并有绒毛结构，应诊断为

- A) 子宫内膜癌
- B) 侵蚀性葡萄胎
- C) 绒毛膜癌
- D) 子宫颈癌
- E) 水泡状胎块

50. [单选题] 最常见的栓子是

- A) 血栓栓子
- B) 空气栓子
- C) 细菌栓子
- D) 肿瘤栓子
- E) 羊水栓子

51. [单选题]男, 37岁。十二指肠球部溃疡病史7年, 突发剧烈上腹痛, 迅速波及全腹。查体: 板状腹, 全腹压痛、反跳痛, 肌紧张。高度怀疑球部溃疡合并穿孔。此时最不能考虑的检查是 ()。
- A) 急诊胃镜
 - B) 饮水超声
 - C) X线钡餐
 - D) 腹部立位X线平片
 - E) 吞线试验
52. [单选题]男, 57岁, 左小腿疼痛8年。每年秋冬季起病, 近年来症状明显, 左小趾发黑。吸烟30余年, 下列临床表现最不可能出现的是
- A) 寒冷刺激加重症状
 - B) 皮肤苍白
 - C) 行走后患肢肿胀
 - D) 间歇性跛行
 - E) 抬高患肢后疼痛
53. [单选题]治疗烧伤休克的主要措施是
- A) 止痛
 - B) 补液
 - C) 吸氧
 - D) 抗感染
 - E) 正确处理创面
54. [单选题]高血压的预防和健康教育下列哪项不正确
- A) 增加新鲜蔬菜水果
 - B) 限制钠盐摄入
 - C) 过量的体力活动和体育运动
 - D) 减轻体重
 - E) 限酒禁烟
55. [单选题]病变部位呼吸音显著减低或消失的情况不见于
- A) 胸腔积液
 - B) 肺不张
 - C) 肺实变
 - D) 气胸
 - E) 胸膜肥厚
56. [单选题]关于脑震荡的诊断不正确的是
- A) 意识丧失小于20分钟
 - B) 头痛、恶心等症状
 - C) 常有逆行性健忘
 - D) 头颅CT显示轻微异常
 - E) 神经系无阳性体征
57. [单选题]初孕妇, 26岁。孕1产0, 孕40周, 阵发性腹痛6小时入院, 骶耻外径18cm, 坐骨结节间径8cm, 查宫高38cm, 腹围98cm, 骶左前, 胎心140次/分, 肛查, 宫口开3cm, 未破膜, 足先露, 入院后5小时宫缩30秒/6~7分, 产程无进展, 其处理哪项最恰当
- A) 静滴催产素
 - B) 温肥皂水灌肠
 - C) 人工破膜

- D) 不需处理，继续观察
- E) 剖宫产

58. [单选题]心脏中传导速度最快的组织是

- A) 窦房结
- B) 心房优势传导通路
- C) 房室交界
- D) 心室肌
- E) 浦肯野纤维

59. [单选题]下列疾病一般情况下不需要应用抗菌药物的是

- A) 毛囊炎
- B) 丹毒
- C) 开放性骨折
- D) 结肠手术前
- E) 人工关节术后

60. [单选题]结肠手术前准备哪项是不必要的

- A) 术前晚清洁灌肠，手术日晨再灌一次
- B) 术前2日，进全流食
- C) 术前5~7日，进低渣饮食
- D) 术前3日用静脉抗生素
- E) 术前2日，口服缓泻剂和肠道杀菌剂

61. [单选题]无尿路刺激征的尿路感染

- A) 急性肾盂肾炎
- B) 急性膀胱炎
- C) 无症状细菌尿
- D) 尿道综合征
- E) 慢性肾盂肾炎急性发作

62. [单选题]奇脉可见于

- A) 主动脉瓣关闭不全
- B) 高血压
- C) 主动脉瓣狭窄
- D) 缩窄性心包炎
- E) 肥厚型心肌病

63. [单选题]腹部外伤时作诊断性腹腔穿刺，抽出不凝固血液，最可能的诊断为

- A) 空腔脏器破裂
- B) 误穿入腹腔血管
- C) 前腹壁血肿
- D) 实质性器官破裂
- E) 后腹膜间隙血肿

64. [单选题]β内酰胺酶类

- A) 抑制细菌细胞壁合成
- B) 抑制细菌蛋白质合成
- C) 抑制细菌DNA合成
- D) 抑制细菌二氢叶酸还原酶
- E) 抑制细菌DNA依赖的RNA聚合酶

65. [单选题]不符合对慢性粒细胞白血病加速期描述的是

- A) 血或骨髓原始细胞 $\geq 20\%$
- B) 不明原因的血小板进行性减少或增高
- C) 除Ph染色体外又出现其他染色体异常
- D) 可持续几个月到几年
- E) 外周血嗜碱性粒细胞 $>20\%$

66. [单选题]下列关于梅毒分期，错误的是

- A) 根据传播途径分为后天梅毒和先天梅毒
- B) 根据病期分为早期梅毒和晚期梅毒
- C) 根据有无临床表现分为显发梅毒和潜伏梅毒
- D) 根据传播途径还可分为获得性和胎传梅毒
- E) 根据病期还可分为一期和二期梅毒

67. [单选题]关于可兴奋细胞动作电位的描述，正确的是

- A) 动作电位是细胞受刺激时出现的快速而不可逆的电位变化
- B) 在动作电位的去极相，膜电位由内正外负变为外正内负
- C) 动作电位的大小不随刺激强度和传导距离而改变
- D) 动作电位的大小随刺激强度和传导距离而改变
- E) 不同的细胞，动作电位的幅值都相同

68. [单选题]金黄色葡萄球菌肺炎，痰的性状

- A) 粉红色泡沫样痰
- B) 脓血痰
- C) 砖红色胶冻样痰
- D) 铁锈色痰
- E) 脓臭痰

69. [单选题]下肢静脉曲张并发溃疡的最好发部位是

- A) 足趾末端
- B) 足背内侧
- C) 足背外侧
- D) 踝周及足靴部位
- E) 小腿下1/3外侧

70. [单选题]下列哪项不属于扁骨？（ ）

- A) 胸骨
- B) 肩胛骨
- C) 肋骨
- D) 髌骨
- E) 颅盖骨

71. [单选题]女性26岁，初产后1周哺乳。右乳房外上象限红肿、痛、压痛(+)、皮温高、发热、波动感不明显，如判断乳房内有无脓汁应如何处置最佳。选何种检查最佳

- A) 乳房B超
- B) 乳房红肿明显处试穿
- C) 乳房CT
- D) 试验性抗生素治疗
- E) 观察病情变化

72. [单选题]初产妇，28岁，足月妊娠，合并风湿性心脏病，心功能Ⅰ级。检查枕左前位，胎心率正常，无头盆不称，决定经阴道分娩，其产程处理，下列哪项正确
- A) 出现心衰征象时吸氧
 - B) 第2产程鼓励产妇屏气用力
 - C) 产后常规注射麦角新碱
 - D) 产妇取平卧位休息
 - E) 胎肩娩出后腹部放置沙袋并用腹带包扎固定
73. [单选题]患者男，55岁。2天前发生急性心肌梗死。1小时前突发喘憋、咳粉红色泡沫痰，不能平卧，既往体检时心脏听诊无异常发现。体检BP90/60mmHg，心尖部可闻及4/6级粗糙的收缩期杂音，双肺满布中小水泡音及哮鸣音。该患者喘憋最可能的原因是
- A) 心肌梗死后综合征
 - B) 心脏乳头肌断裂
 - C) 心脏游离壁破裂
 - D) 心室膨胀瘤
 - E) 肺动脉栓塞
74. [单选题]溃疡性结肠炎患者容易并发中毒性巨结肠的情况是
- A) 重症患者接受激素治疗时
 - B) 重症患者接受柳氮磺吡啶治疗时
 - C) 重症患者接受胆碱能受体拮抗剂时
 - D) 重症患者接受抗生素治疗时
 - E) 重症患者接受全肠外营养治疗时
75. [单选题]不符合支原体肺炎X线改变的是（ ）。
- A) 两肺呈弥漫性网状结节样改变
 - B) 肺下野出现片状阴影
 - C) 均质性的片状阴影
 - D) 胸腔积液
 - E) 肺尖圆形高密度影
76. [单选题]患者男，19岁。精神失常3个月，表现为言语凌乱无章，情绪变化无常，忽哭忽笑，时而冲动兴奋，打人毁物，时而裸体狂奔或学鸡狗叫，吃脏物，躯体及神经系检查无异常。其诊断最可能是
- A) 躁狂症
 - B) 精神分裂症（单纯型）
 - C) 精神分裂症（青春型）
 - D) 精神分裂症（偏执型）
 - E) 精神分裂症（紧张型）
77. [单选题]处理开放性颅脑损伤最重要的原则是（ ）。
- A) 无专科条件者，立即转院
 - B) 注射破伤风抗毒素
 - C) 止血、清创
 - D) 止痛、镇静
 - E) 输血、输液
78. [单选题]女，40岁。发现室间隔缺损38年。3个月前拔牙后持续发热至今。查体：体温37.6℃，睑结膜苍白，有瘀点，胸骨左缘第3肋间可闻及全收缩期杂音，脾肋下可触及。最有助于确诊的检查是（ ）。
- A) 腹部B超
 - B) 血常规
 - C) 血培养

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/608142120113006072>