

# 2023 年-2024 年主治医师之全科医学 301 真题练习

## 试卷 A 卷附答案

### 单选题（共 45 题）

1、6 个月女婴来院急诊，主诉鼻塞、流涕 1 天，半天来抽搐 3 次，抽时双眼上翻，面肌、眼肌及四肢肌抽动，持续 2~3min，抽后吃奶好。人工喂养。体格检查：营养发育中，枕后有脱发圈，前囟 2.5cm×2.5cm，咽轻充血，颈无抵抗。于体检时患儿再次抽搐，此时最妥当的处理是

- A. 积极快速补钙，同时止惊，后即用维生素 D
- B. 先补钙，同时吸氧，止惊，然后用维生素 D
- C. 先止痉及缓慢静注钙剂，后改口服钙 3~5 天，再用维生素
- D. 先用维生素 D，同时补充钙，再吸 O
- E. 先补钙剂与维生素 D，然后止惊，吸 O

【答案】 C

2、男孩，15 岁。近 7 天来食欲不振、恶心、呕吐，伴乏力、尿黄来医院就诊。病前 5 周曾注射过丙种球蛋白 1 支。检查：巩膜黄染，肝肋下 2cm，轻度触痛，脾肋下未触及。化验：肝功 ALT 660U/L，AST 480U/L、T-Bil 146.5 μmol/L，抗-HAV-IgG 阳性，抗-HAV-IgM 阴性，HBsAg 阳性，HBeAg 阳性，抗-HBc-IgM 阳性，抗-HCV 阳性。应诊断为

- A. 急性乙型肝炎，甲型肝炎病毒携带者，丙型肝炎
- B. 急性甲型肝炎，慢性乙型肝炎，丙型肝炎
- C. 急性乙型肝炎，既往感染过甲型肝炎，丙型肝炎
- D. 被动获得甲型肝炎抗体，急性甲型肝炎，乙型肝炎病毒携带，丙型肝炎
- E. 被动获得丙型肝炎抗体，急性乙型肝炎，急性甲型肝炎

【答案】 C

3、有关月经初潮以下哪项是错误

- A. 月经初潮是女孩性成熟过程中的一项生理标志
- B. 初潮年龄在 13~15 岁
- C. 初潮后月经不规律，因此不可能受孕
- D. 第一次月经叫月经初潮
- E. 初潮年龄与人民生活水平有关

【答案】 C

4、柏油样大便常见于

- A. 急性肠炎
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 细菌性痢疾
- D. 上消化道出血
- E. 霍乱、副霍乱

【答案】 D

5、食管误服碱性液可服用的中和剂是

- A. 食醋
- B. 氢氧化钠
- C. 氢氧化锌凝胶
- D. 泻药
- E. 激素

【答案】 A

6、男性患者，28岁，发现高血压半年，因头痛，多汗、烦躁，伴心悸、气促来院急诊，诊断为高血压危象，处理后血压降至125/80mmHg，症状消失，嘱患者应

- A. 长期服降压药治疗
- B. 继续服药，查明病因
- C. 低钠饮食，注意休息，不用药
- D. 随访并根据血压高低间歇用药
- E. 血压稳定后可以停药

【答案】 B

7、女性，30岁，双手、足心可见对称性红斑上成群淡黄色针头至粟粒大小脓疱。反复发作5年。掌部初发于大小鱼际，后渐扩展至掌心。部分脓疱已经干涸、结痂及脱屑，鳞屑下反复出现成群新疱

- A. KogOj 微脓肿
- B. 棘层变薄
- C. 颗粒层变薄
- D. 角化不伴角化过度
- E. 表皮突规则下延

【答案】 A

8、下述指标中哪项是计数指标

- A. 红细胞计数
- B. 尿蛋白
- C. 男婴出生比例
- D. 男婴心率

E. 血压

【答案】 C

9、以下哪项不是痔形成的危险因素

A. 便秘

B. 不良的排便习惯

C. 不良饮食习惯

D. 过多进食高胆固醇食物

E. 妊娠和分娩

【答案】 D

10、某患者，男，15岁，右耳闷，耳聋，查右耳听力为传音性聋，耳镜检查提示右耳鼓室积液，经鼓膜穿刺抽出淡黄色液体 1.5ml，初步诊断为分泌性中耳炎，行鼓膜穿刺术更符合下列治疗原则中哪一项

A. 改善中耳通气引流

B. 改善咽鼓管功能

C. 清除中耳积液

D. 病因治疗

E. 上述都不是

【答案】 C

11、男性患者，67岁。半月来在爬楼梯时常感心前区疼痛，为压迫样痛，并向左肩、左上肢放射，持续 1~2 分钟，休息后能缓解。近 5 天来在工作时上述症状常出现，尤其工作较为紧张时发作为多，含服硝酸甘油疼痛能迅速缓解。有高血压病病史三年，无冠心病史及药物过敏史。嗜烟，无嗜酒。父母有高血压病史。查体：T36℃、R20 次 / 分、P78 次 / 分、BP180mmHg / 100mmHg，一般情

况尚可。心界不大，心率 78 次 / 分，律整，未闻病理性杂音。双肺叩诊清音，未闻干湿啰音。腹软，肝脾未扪及。双下肢无水肿。

- A. 安静休息，心电监护
- B. 药物使用：硝酸酯类药物、 $\beta$  受体阻滞剂、钙离子拮抗剂、抗血小板制剂以及降脂药物的应用
- C. 控制各种危险因素：降低血压，维持血压平稳等
- D. 大剂量连续含服硝酸甘油
- E. 必要时采取 PTCA 治疗

【答案】 D

12、以下哪一项不是溺水濒死期的临床特征

- A. 神志清醒
- B. 血压下降
- C. 呼吸停止
- D. 四肢厥冷
- E. 上腹部膨隆

【答案】 A

13、女性，30 岁，已婚，停经 40 天，下腹钝痛 3 天，伴心悸、乏力、头晕。查体：口唇苍白，血压 80/50mmHg，心率 100 次/分，腹胀，中下腹有轻压痛，未触及包块，移动浊音阳性，血常规 Hb90g/L。为尽快确诊应首先作

- A. 急诊 CT
- B. 腹腔穿刺抽液检查
- C. 血管造影
- D. 胸片+胸腹透视

E. 结肠镜检查

【答案】 B

14、患者，男，56岁。反复头痛，平素咳嗽咳痰，头昏蒙，胸脘满闷，呕恶痰涎，苔白腻，脉滑。

A. 平肝潜阳

B. 化痰降逆

C. 养血为主

D. 养阴补肾

E. 滋阴补阳

【答案】 B

15、患儿，女，2岁，流涕伴发热1天，发热38.5℃左右，今起出疹，由面颊迅速扩展到躯干四肢，到医院就诊：T37.8℃，P112次/分，R50次/分。皮疹为红色斑丘疹，颜面、四肢皮疹较稀疏，背部皮疹较密集，有部分融合。咽充血，扁桃体稍大，充血。耳后及颈部数个淋巴结黄豆大小，有压痛，活动。心肺腹无特殊。四肢，关节无异常，神经反射正常。

A. 飞沫传播

B. 食物传播

C. 粪便传播

D. 水源传播

E. 昆虫媒介传播

F. 血液传播

【答案】 A

16、一名 23 岁女性，因甲亢服他巴唑治疗已半年。为了解甲亢控制情况不宜做哪一项检查

- A. 血清 TT
- B. 血清 FT
- C. 甲状腺摄
- D. 血清 TSH
- E. 测定 TSI

【答案】 C

17、病人，70 岁，以远事记忆受损，智能减退，难以胜任简单家务劳动，不能正确回答自己亲人的名字与年龄，但尚能记住自己的名字，饮食不知饥饱，外出找不到家门，举止幼稚，不知羞耻等为主要表现。

- A. 乙酰胆碱酯酶抑制剂
- B. 维生素
- C. 抗抑郁剂
- D. 抗精神病药物
- E. 营养脑细胞治疗

【答案】 A

18、以下各项关于流行病实验研究的论述不正确的是

- A. 需随机化分组
- B. 实验组和对照组是自然形成的
- C. 必须有干预措施
- D. 有严格的平行可比的对照
- E. 是前瞻性研究，必须观察实验结果

【答案】 B

19、药品说明书中未载明的不良反应是

- A. 药品不良反应
- B. 药品不良事件
- C. 药品严重不良反应/事件
- D. 新的药品不良反应
- E. 药品突发性群体不良反应/事件

【答案】 D

20、女，23岁，无症状性高血钙症，最近进行颈部手术探查：甲状旁腺不增大，术后一直高钙血症，其家庭成员筛选，母亲和30岁姐姐血钙升高。应进一步检查

- A. 垂体激素水平及促胃液素
- B. 测甲状旁腺激素，8小时钙灌注
- C. 24小时高钙和肌酐排泄
- D. 24小时病人肾上腺素及代谢产物血清降钙素
- E. 腰椎骨密度

【答案】 C

21、患者，女性，55岁。反复发作性右上腹痛半年余，伴恶心、呕吐胃内容物，伴右肩部放射。查体：T36.5℃，BP115 / 85mmHg，P90次 / 分，右上腹轻度压痛，无腹肌紧张。保守治疗后症状持续性加重，右上腹压痛、反跳痛明显，腹肌紧张，体温38.0℃，此时可诊断为

- A. 结石性急性坏疽性胆囊炎
- B. 胆总管结石

- C. 细菌性肝脓肿
- D. 坏死性急性胰腺炎
- E. 急性化脓性胆管炎

【答案】 A

22、我国正常人眼压范围(mmHg)为

- A. 10~21
- B. 9~20
- C. 9~21
- D. 11~21
- E. 10~20

【答案】 A

23、某社区总人口约 10 万人，2003 年因各种疾病死亡 1000 人。该年共发生结核病 300 例，原有结核病人 400 例，2003 年全年共有 60 人死于结核病。

- A. 60/10 万
- B. 400/10 万
- C. 300/10 万
- D. 300/1000
- E. 400/1000

【答案】 C

24、45 岁女性，双下肢大隐静脉曲张 12 年，近 2 年出现左下肢瘙痒，足靴区色素沉着，皮下硬结，湿疹。并有时出现轻度下肢肿胀。以下临床表现中哪项不是由于皮肤营养性变化引起的

- A. 瘙痒
- B. 湿疹
- C. 皮下硬节
- D. 下肢肿胀
- E. 色素沉着

【答案】 D

25、某女性患者，18岁，于受凉淋雨后，突发寒战、高热、胸痛、咳嗽、气急、咳铁锈色痰，体检左下肺有实变体征。

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 支气管扩张
- C. 肺结核
- D. 支气管哮喘
- E. 上呼吸道感染

【答案】 A

26、患儿，8岁，血液检查显示：Hb64g / L;Hct25%; RBC $3.20 \times 10^{12} / L$ 。

- A. 地中海贫血
- B. 慢性病性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 白血病
- E. 缺铁性贫血

【答案】 A

27、乳腺癌

- A. 疼痛随月经呈周期性改变
- B. 多为哺乳期妇女
- C. 乳房皮肤橘皮样改变
- D. 好发于 18~20 岁青少年女性
- E. 无乳头溢液

【答案】 C

28、9 个月婴儿，疑似患脑膜炎，已住院。下列中哪一项是本例腰穿的禁忌证

- A. 未被纠正出血倾向
- B. 2 天前做过腰穿
- C. 前凶膨隆
- D. 病人极不合作
- E. 患儿父母不同意

【答案】 A

29、儿童三浴锻炼指

- A. 水浴、日光浴和空气浴
- B. 阳光浴、空气浴和温水浴
- C. 寒冷浴、空气浴和日光浴
- D. 擦浴、淋浴、日光浴
- E. 冷水浴、空气浴和日光浴

【答案】 A

30、患者，男，78岁。右侧阴囊可复性肿物2年。查体：肿物于平卧时可手法还纳，肿物脱出时直径约25cm。患者既往有慢性支气管炎20年，10年前有腰部外伤史。对该患者最恰当的处理措施是

- A. 放置疝带
- B. 硬膜外麻醉下，无张力疝修补术
- C. 局部麻醉下，无张力疝修补术
- D. 硬膜外麻醉下，疝囊高位结扎
- E. 局部麻醉下，疝囊高位结扎

【答案】 A

31、男性，20岁，篮球赛后左膝关节疼痛。查体：左膝关节肿胀，内侧压痛。

- A. 骨折
- B. 肌肉拉伤
- C. 骨肿瘤
- D. 皮下血肿
- E. 骨软骨瘤

【答案】 B

32、女性，26岁，现孕30周，既往心肌炎史，自觉心慌、憋气，经检查，考虑左束支完全传导阻滞，该患者的处理方法为

- A. 吸氧，静脉给予能量合剂
- B. 观察，休息
- C. 及时治疗并转院
- D. 无关系，右束支完全传导阻滞才需积极处理
- E. 药物对胎儿有害，只需吸氧即可

【答案】 C

33、骨折愈合的第三期是

- A. 血肿机化演进期
- B. 原始骨痂形成期
- C. 骨痂改造塑形期
- D. 膜内化骨吸收期
- E. 软骨化骨吸收期

【答案】 C

34、下列疾病中，哪一种咳黏稠黯红色血痰

- A. 心绞痛
- B. 心包炎
- C. 肺梗死
- D. 心肌梗死
- E. 心包积液

【答案】 C

35、患者，女，50岁。反复低热1年，伴四肢大小关节肿痛。WBC $8.0 \times 10$

- A. 风湿性关节炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 骨关节炎
- D. 类风湿关节炎
- E. 结核菌感染引起的关节炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/615324041313012012>