

2022 护士职业资格考试《实践能力》考前检测试题 D 卷 含答案

考试须知：

- 1、考试时间：120 分钟，本卷满分为 380 分。
- 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。
- 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

姓名：_____

考号：_____

得分	评卷人
	A1 型题（本题共 50 题，每小题 3 分，共 150 分）

1、洗胃时，一次洗胃液灌入量应不超过（ ）。

A、100ml

B、200ml

C、300ml

D、400ml

E、500ml

2、佝偻病初期患儿的临床表现是（ ）。

A、颅骨软化

B、下肢畸形

C、有郝氏沟

D、出现枕秃

E、形成鸡胸

3、宫颈糜烂最常用的有效治疗方法是（ ）。

A. 物理治疗

B. 中药治疗

C. 硝酸银烧灼

D. 局部应用消炎药

E. 宫颈锥形切除术

4、婴儿手足搐搦症的主要死亡原因是（ ）。

A. 无热惊厥

B. 心力衰竭

C. 喉痉挛

D. 呼吸衰竭

E. 手足搐搦、

5、慢性便秘患者最主要的临床表现是（ ）。

A、缺乏便意、排便艰难

B、腹痛

C、里急后重感

D、恶心、呕吐

E、腹部下坠感

6、在护理脱水补液的患儿时，如输液后患儿出现乏力、腹胀、肠鸣音减弱、腱反射消失、心音低钝，应考虑（ ）

A. 低钾血症

B. 低氯血症

C. 低钙血症

D. 低镁血症

E. 低磷血症

7、关于炎f生浸润期压疮的描述，不正确的是（ ）。

A. 皮肤呈紫色

B. 皮下结节

C. 有大、小水疱

D. 水泡表皮剥脱露出湿润的创面

E. 创面上有脓性分泌物

8、脑复苏中首选的脱水剂为（ ）。

A. 25%葡萄糖溶液

B. 50%葡萄糖溶液

C. 20%甘露醇

D. 速尿

E. 尿素

9、对手术器械最有效的灭菌法是（ ）。

A、燃烧法

B、高压蒸汽灭菌法

C、煮沸消毒法

D、烤箱干热灭菌法

E、微波消毒灭菌法

10、对有活动义齿病人的口腔护理活动，下列错误的是（ ）

A. 取下的义齿用冷水冲洗干净

B. 病人漱口后，协助将义齿戴回

C. 用牙膏彻底清洗义齿

D. 暂时不用的义齿可置于热水中浸泡

E. 协助病人戴义齿前，应先浸湿

11、全身麻醉未清醒的病人采用去枕仰卧位的目的是（ ）。

A. 有利于静脉回流

B. 防止颅内压降低

C. 防止呕吐物流入气管

D. 减轻伤口疼痛

E. 减少局部出血

12、血栓闭塞性脉管炎 II 期的典型表现是

A. 静息痛

B. 间歇性跛行

C. 足背动脉搏动减弱

D. 患肢麻/卜发凉

E. 足趾溃疡坏死

13、心包腔内液体可起到的生理作用 ()。

A. 体液免疫

B. 加强心肌收缩力

C. 营养细胞

D. 润滑

E. 营养心肌

14、马斯洛将人的基本需要分为五个层次，由低到高依次为 ()。

A. 生理，爱与归属，安全，尊重，自我实现

B. 生理，安全，爱与归属，尊重，自我实现

C. 安全，生理，爱与归属，尊重，自我实现

D. 安全，生理，尊重，爱与归属，自我实现

E. 生理，安全，尊重，爱与归属，自我实现

15、下列有关适应特性的叙述，不正确的是 ()。

A、适应是有一定限度的

B、适应本身也具有应激性

C、应激源来的越突然，个体越难以适应

D、面对应激源机体只能做出一个层次的适应

E、适应是区别有生命机体和无生命物质的一个特征

16、抢救病人中护士进行的工作下列哪项不正确（ ）。

A、口头医嘱复诵后再执行

B、用完的空安瓿应及时处理

C、抢救后应及时请医生补写医嘱

D、抢救记录字迹清晰及时准确

E、医生未到时可先建立静脉通道

17、新生儿时期应预防接种的疫苗是（ ）。

A. 乙肝疫苗，乙脑疫苗

B. 麻疹疫苗，卡介苗

C. 卡介苗，乙肝疫苗

D. 百白破疫苗，脊髓灰质炎疫苗

E. 脊髓灰质炎疫苗，乙脑疫苗

18、符合恶性肿瘤特点的描述是（ ）。

A. 细胞分化程度高

B. 与周围组织无粘连

C. 有完整包膜

D. 边界清楚

E. 瘤细胞呈异型或幼稚型

19、胎儿在子宫内急性缺氧初期，主要表现为胎动（ ）。

A. 减弱

B. 消失

C. 增强

D. 频繁

E. 次数减少

20、典型急性心肌梗死患者最早出现、最突出的症状是（ ）。

A. 心前区剧烈疼痛

B. 恶心、呕吐

C. 心源性休克

D. 心律失常

E. 心力衰竭

21、中暑时最易发生肌肉痉挛的部位是（ ）。

A. 腹斜肌

B. 腓肠肌

C. 前臂肌群

D. 肱二头肌

E. 臀大肌

22、李某，颈椎骨折，现需搬运至平车上，平车与床的适当位置是（ ）。

A、头端与床尾相接

B、头端与订头平齐

C、头端与床头呈锐角

D、头端与床尾呈锐不可当角

E、头端与床头呈钝角

23、属于心源性呼吸困难的主要护理措施是（ ）。

A. 加强皮肤护理，预防压疮

B. 夜间睡眠时保持半卧位

C. 准确测量尿量和体重

D. 加强心电监护

E. 饮食中限制蛋白质摄入量

24、对青少年痤疮的护理措施，不恰当的是（ ）。

A. 多吃清淡食物

B. 不吸烟，不饮酒

C. 保持乐观情绪

D. 保持皮肤清洁

E. 挤净痤疮内容物

25、关于慢性胃炎的叙述，正确的是（ ）。

A. 多好发于青壮年

B. 自身免疫性胃炎可伴有贫血

C. 常有特征性腹部疼痛特点

D. 均应进行抗幽门螺杆菌治疗

E. 萎缩性胃炎年龄增加症状可逐渐减轻

26、对于下肢急性深静脉血栓形成患者，正确的护理措施是（ ）。

A. 床上活动

B. 卧床休息，患肢抬高

C. 行走练习

D. 患肢热敷

E. 按摩，促进血液循环

27、以下可用热水坐浴的病人是（ ）。

A、阴道出血病人

B、会阴部充血病人

C、急性盆腔炎病人

D、妊娠8个月的孕妇

E、月经量过多的病人

28、一般择期手术病人的术前呼吸道准备措施是（ ）

A. 进行体位引流

B. 应用抗生素

C. 应用支气管扩张剂

D. 口服地塞米松

E. 戒烟

29、子宫内膜癌首选的治疗方法是（ ）。

A. 化学治疗

B. 手术治疗

C. 放射治疗

D. 内分泌治疗

E. 免疫治疗

30、治疗单纯高位肛瘘，能有效避免肛门失禁的方法是（ ）。

A. 1:5000高锰酸钾溶液坐浴

B. 挂线疗法

C. 局部换药治疗

D. 瘻*搔抓

E. 使用抗菌药物

31、关节脱位治疗中不妥的是（ ）。

A. 治疗原则是复位、固定、功能锻炼

B. 合并关节内骨折需手术治疗

C. 早期手法复位效果好

D. 固定期间勿活动患肢关节

E. 固定解除后进行病变关节为重点的功能锻炼

32、关于子宫颈癌叙述正确的是（ ）。

A. 多为鳞癌和腺癌，以腺癌为主

B. 转移途径以直接蔓延和淋巴转移为主，血行转移较少见

C. 病变多发生在子宫颈外口处

D. 宫颈原位癌不属于宫颈上皮内瘤样变

E. 可表现为菜花型、浸润型、溃疡型三种类型

33、最严重的输血反应是（ ）。

A. 空气栓塞

B. 过敏反应

C. 溶血反应

D. 循环负荷过重

E. 枸橼酸钠中毒

34、某早产儿出生后因Apgar转入新生儿病房，治疗12好转，今日医生通知家长出院，护士在出院指导时应向家长重点强调（ ）。

A. 及时添加辅食

B. 预防感染

C. 培养良好生活习惯

D. 预防外伤

E. 及早训练按时排便

35、血液COHb浓度达到下列哪项时，提示氧化碳重度中毒（ ）。

A. 5%~10%

B. 15%~20%

C. 25%~30%

D. 35%~40%

E. 50%以上

36、外伤后出现急性硬脑膜外血肿的患者，典型的意识障碍形式是（ ）。

A. 清醒与朦胧状态交替出现

- B. 持续性昏迷加重
- C. 早期清醒，随后逐渐昏迷
- D. 清醒，随后昏迷，再次清醒
- E. 昏迷，随后清醒，再次昏迷

37、给予肺炎高热患者降温处理时，正确的操作是（ ）。

- A. 为防止病情加重，患者出汗后减少擦拭，更衣
- B. 小儿患者应及时用阿司匹林降温，防止惊厥
- C. 采取物理方法逐渐降温，防止脱水
- D. 快速降温，使体温降至正常
- E. 松解衣服，自行降温

38、日光浴一般于婴儿早餐后（ ）。

- A. 0.5小时内为宜
- B. 1~1.5小时为宜
- C. 2~2.5小时为宜
- D. 2.5~3小时为宜
- E. 3~3.5小时为宜

39、流行性乙型脑炎极期最严重的三种症状（ ）。

- A. 高热、意识障碍、呼吸衰竭
- B. 意识障碍、呼吸衰竭、循环衰竭
- C. 高热、惊厥、呼吸衰竭
- D. 高热、惊厥、循环衰竭
- E. 惊厥、呼吸衰竭、循环衰竭

40、胎动减少是指胎动12小时少T（ ），

- A. 5次
- B. 10次

C. 15 次

D. 20 次

E. 25 次

41、肛门坐浴的作用，错误的是（ ）。

A. 能增进局部血运

B. 促进炎症吸收

C. 缓解肛门括约肌痉挛

D. 清洁作用

E. 有止血作用

42、罗伊适应模式对护理学四个基本概念的阐述正确的是（ ）。

A. 人是一个适应系统，具有生物和社会的属性

B. 人通过生理调节达到适应

C. 健康是一个完整的适应状态，并不是一个动态变化的过程

D. 护理的目标是促进人在生理功能上的适应

E. 人在适应环境变化时不需要付出能量

43、头罩式给氧法适用的病人是（ ）

A. 一氧化碳中毒

B. 肺心病

C. 心绞痛

D. 婴幼儿缺氧

E. 气管切开

44、抢救肺结核咯血窒息病人时，病人应采取的体位是（ ）。

A. 平卧位

B. 端坐位

C. 俯卧位

D. 头低脚高位

E. 患侧卧位

45、拔火罐的适应证是（ ）。

A. 外感风寒，风寒湿痹

B. 急性腰扭伤

C. 各种疮疡疔肿

D. 平素体质虚弱

E. 高热、抽搐、昏迷

46、患儿男出生后十天，因口腔粘膜有异常来院就诊。查体可见口腔粘膜有白色乳凝块样小点，汇集成小片，家长称不易拭去，。目前患儿饮食正常。无全身症状。为该患儿进行口腔粘膜局部治疗，应选用的是（ ）。

A. 2%的利多卡因

B. 3%的过氧化氢溶液

C. 10万U/ml制霉菌素鱼肝油混悬溶液

D. 2%碳酸氢钠溶液

E. 2.5%的金霉素鱼肝油

47、完全胃肠外营养液中，提供热能的最主要的来源是（ ）。

A. 葡萄糖

B. 脂肪

C. 氨基酸

D. 维生素

E. 电解质

48、早产儿，生后2天，胎龄34周。因发绀给予氧气吸入，为预防其氧中毒，正确的做法是（ ）。

A. 维持动脉血氧分压在80~90mmHg

B. 维持经皮血氧饱和度在85%~93%

C. 连续吸氧时间不超过7天

D. 吸氧浓度在70%~80%

E. 基于机械正压通气

49、患者林某，女性，32岁，会阴侧切伤口红肿，给予红外线灯照射，灯距应为（ ）。

A. 5-10cm

B. 10-20cm

C. 20-30cm

D. 30-50cm

E. 50-70cm

50、产检项目中能够反映胎儿生长发育状况最重要的指标是（ ）。

A、孕妇体重

B、胎方位

C、宫高与腹围

D、胎动

E、胎心率

得分	评卷人
----	-----

A2 型题（本题共 50 题，每小题 3 份，共 150 分）

1、患者女，53岁。患类风湿关节炎，接受药物治疗。近日因天气变湿冷，手指间关节疼痛加重，晨僵可达数小时，同时伴活动障碍。目前正确的护理措施是（ ）。

A. 睡前戴手套

B. 晨起冷敷手关节

C. 保持手关节伸展

D. 加大手关节活动度

E. 增加手关节活动量

2、患儿，3岁，诊断为缺铁性贫血，血红蛋白80g / L，为改善贫血症状最佳的食物是（ ）。

- A. 牛奶及乳制品
- B. 鱼虾及高热量饮食
- C. 动物肝脏及高蛋白饮食
- D. 紫皮茄子及高蛋白饮食
- E. 海带，紫菜及低蛋白饮食

3、患者男，72岁。因急性前壁心肌梗死收入院。入院后已行面罩吸氧，建立静脉通路，心电图监护示频发多源性室性早搏，护士在床边准备抢救用品，最重要的是（ ）。

- A. 血氧饱和仪
- B. 气管切开包
- C. 吸氧器
- D. 除颤仪
- E. 呼吸机

4、患者，女性，25岁，身高160cm，体重43kg，“三多一少”症状明显，空腹血糖及尿糖均显著增高，诊断为I型糖尿病，住院后采用速效胰岛素治疗，其饮食总热量应（ ）。

- A. 按实际体重计算再酌增
- B. 按实际体重计算再酌减
- C. 按理想体重计算
- D. 按理想体重计算再酌增
- E. 按理想体重计算再酌减

5、患儿男，16岁。因患“痤疮”3年入院，经实验室和影像学检查后首要的护理评估是（ ）。

- A. 心理状态
- B. 营养状态
- C. 皮肤黏膜状态
- D. 意识状态
- E. 心率、心律

6、患者男，28岁。突发胸痛2小时，以自发性气胸诊断入院。查体：T36.8℃，P90次/分，

呼吸22次/分；右侧胸部肋间隙增宽，语颤消失，叩诊鼓音。其肝浊音界的改变是（ ）。

- A. 下移
- B. 上移
- C. 左移
- D. 右移
- E. 不变

7、男性，28岁，右侧胸外伤后，出现呼吸困难、发绀，胸壁伤处可听见空气进出的声音，首先考虑为（ ）。

- A. 多根多处肋骨骨折
- B. 闭合性气胸
- C. 开放性气胸
- D. 张力性气胸
- E. 进行性血胸

8、患者男性，31岁，糖尿病2年，病情稳定，2天前因事外出未服降糖药，并过度进食，之后感乏力，恶心，口渴，头痛，呼Ⅱ发深大，行烂苹果味，意识不清，皮肤弹性差，初步诊断（ ）。

- A. 糖尿病酮症酸中毒
- B. 胃炎
- C. 昏迷
- D. 呼吸性酸中毒
- E. 脑血管病

9、患儿女，早产，母乳喂养，经过10天观察，身体状况良好，医生通知家长接其出院；护士应给予家长的正确指导是（ ）。

- A. 培养良好的生活习惯

B. 训练按时排便

C. 及早添加辅食

D. 预防感染

E. 预防外伤

10、患者，男性，52岁。饮用高度白酒约500ml后被诊断为酒精中毒。下列医嘱中，对治疗酒精中毒无效的是（ ）。

A. 反复洗胃

B. 静推纳洛酮

C. 静滴抗生素

D. 静滴葡萄糖

E. 静滴电解质

11、患者女，32岁，因白带增多伴下腹坠痛3个月就诊，诊断为宫颈柱状上皮异位，2日前行宫颈锥形切除术。护士指导患者出院后禁止性生活及盆浴的时间是（ ）。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 4个月

E. 5个月

12、患者，男性，20岁，因“突起高热3天”以“流行性乙型脑炎”收治入院。查T39.8℃，P120次/分，R38次/分，节律不整，瞳孔对光反应迟钝，肺部可闻及干、湿啰音，颈强直(+)。患者在此阶段出现的三个最主要的凶险症状是（ ）。

A. 昏迷、呼吸衰竭、高热

B. 高热、昏迷、惊厥

C. 高热、惊厥、循环衰竭

D. 昏迷、惊厥、呼吸衰竭

E. 高热、惊厥、呼吸衰竭

13、患者女，26岁，半年前开始出现反复发作的腹泻、腹痛、排黏液脓便，疑诊溃疡性结肠炎，拟行肠镜检查，门诊护士告知患者应在行肠镜检查的（ ）。

A、前4小时可进食

B、前1天晚餐后禁食

C、前2天停用铁剂

D、前2天清洁灌肠

E、前3天停用阿司匹林类药物

14、患儿男，34岁。左足麻木、疼痛，走路时小腿酸胀、易疲劳，足底有硬胀X，初步诊断为血栓闭塞性脉管炎。可X诊的辅助检查是（ ）。

A. 肢体抬高试验

B. 静脉注射硫酸镁10ml

C. 仔细检查肢体各种脉搏动情况

D. 行交感神经阻滞

E. 行动脉造影

15、李先生，45岁，因违反工作程序被电击伤，判断为心脏骤停，进行现场抢救时，首先应（ ）。

A、触摸大动脉搏动

B、呼叫病人

C、找医生来抢救

D、听心脏有无搏动

E、开放气道

16、患者男，34岁。损伤性气胸。遵医嘱给予胸腔闭式引流，其引流装置如图所示（图片暂缺）。目前该装置给予其胸腔施加的压力是（ ）。

A. -60cmH₂O

B. -4cmH₂O

C. 0cmH₂O

D. -8cmH₂O

E. 60cmH₂O

17、刘先生，22岁，胸部刺伤20分钟，呼吸急促，血压70 / 50mmHg，X线示左胸腔大量积液，纵隔向右移位。为明确诊断最好采用的检查是（ ）。

A. B超

B. CT

C. 心电图

D. 血常规

E. 胸腔穿刺

18、患者男，13岁游泳时不幸发生淹溺，就以后，急救人员应该给予该患儿首要的治疗措施（ ）。

A. 给予强心药

B. 建立静脉通道

C. 口对口人工呼吸

D. 胸外心脏按压

E. 保持呼吸道通畅

19、患者女，35岁，职员。因双肘、胸、手指近端指间关节肿痛2年。加重2周，以类风湿关节炎收入院，医嘱给予泼尼松、布洛芬和青霉胺等药物治疗。现患者诉恶心、反酸和胃部不适。护士向患者解释引起此症状的原因最可能是（ ）。

A. 病情加重

B. 青霉胺的不良反应

C. 泼尼松的不良反应

D. 布洛芬的不良反应

E. 未按照医嘱服药

20、患者女，55岁。因绝经五年后出现阴道不规则流血住院，经检查后诊断为子宫内膜腺癌，患者咨询本病最常用的治疗方案，正确的回答（ ）。

A. 化疗

B. 手术治疗

C. 中药治疗

D. 放疗

E. 放化疗结合

21、患者女性，48岁，因“转移性右下腹痛12小时，以“急性阑尾炎”收住院，查体：精神萎靡，蜷曲体位、体温39.5℃、右下腹压痛、反跳痛明显，对该患者护理诊断的陈述，正确的是（ ）。

A. 体温过高：体温39.5℃，与阑尾炎有关

B. 腹痛：炎症引起

C. 急性阑尾炎

D. 高热：体温39.5℃，由于阑尾炎症所致

E. 萎靡：由于高热、疼痛所致

22、洪先生，脑中风右侧肢体瘫痪，预防压疮最好的护理方法是（ ）。

A. 每2h为患者翻身按摩1次

B. 每天请家属检查皮肤是否有破损

C. 骨隆突处用气圈

D. 使患者保持左侧卧位

E. 鼓励患者做肢体功能锻炼

23、患者男，48岁。胃癌根治术后1个月，今日复诊时诉进食半小时内出现心悸、出汗、面色苍白、头痛、上腹部饱胀不适等。护士对其进行健康教育，不恰当的内容是（ ）。

A. 饮食方面宜少量多餐

B. 用餐时间限制饮水喝汤

C. 进餐后宜活动20分钟后休息

D. 宜进低碳水化合物，高蛋白饮食

E. 避免过甜、过咸、过浓的流质饮食

24、患者，女性。30岁，慢性肾小球肾炎，为减轻肾小球的高灌注、高压、高滤过状态，其

饮食应选择（ ）。

- A. 普通蛋白饮食即可
- B. 低蛋白低磷低钠饮食
- C. 高蛋白饮食
- D. 高蛋白低钠饮食
- E. 高蛋白低磷饮食

25、患儿女，3岁。换法洛四联症，新功能IV级。护士建议其家长该患儿最合适的手术时机是（ ）。

- A. 立即
- B. 择期
- C. 学龄前
- D. 成年后
- E. 心功能改善后

26、患者女，25岁，因“白带增多7天”就诊。妇产检查：外阴阴道正常，宫颈糜烂，糜烂面积占宫颈面积的1/2. 护士评估该患者宫颈糜烂的程度是（ ）。

- A、轻度
- B、中度
- C、中重度
- D、重度
- E、特重度

27、某孕妇，妊娠32周，因“胎膜早破”“14小时入院，检查发现胎心正常，无腹痛。错误的处婣措施是（ ）。

- A. 给予抗生素
- B. 严密观察孕妇生命体征
- C. 监测白细胞计数
- D. 监测胎儿宫内安危

E. 无需使用抗生素

28、患者女，65岁。遵医嘱每天服用补钙制剂阿仑膦酸钠1次。正确的服药时间是()。

A. 晨起

B. 早饭后

C. 午饭后

D. 晚饭后

E. 睡前

29、患者女性，27岁，产后3周体温升高，右侧乳房疼痛，局部红肿，有波动感。最主要的处理措施是()。

A. 吸乳器排出

B. 33%硫酸镁湿敷

C. 局部物理疗法

D. 及时切开引流

E. 全身应用抗生素

30、患者男，45岁。直肠肛管检查是取膝胸位，病变部位为11点，若患者改为截石位时，其病变部位是()。

A. 5点

B. 11点

C. 9点

D. 7点

E. 3点

31、孟先生，56岁，行胃大部切除术后第2天，须密切观察病情，巡视病人的适宜时间为()。

A、每5-10min一次

B、每15-30min一次

C、每30-60min一次

D、每1-2h一次

E、每日2次

32、某初孕妇，28岁，妊娠30周，胎儿臀位，为减轻孕妇的焦虑情绪，护士对孕妇的指导，不正确的是（ ）。

A. 可采用膝胸卧位进行矫正

B. 矫正无效时，可提前入院待产

C. 膝胸卧位需排空膀胱

D. 可行外转胎位术校正

E. 胎儿可自行转为头先露

33、患者女性，65岁。突然出现心前区疼痛伴大汗3小时，急诊就医，诊断为急性心肌梗死。给患者的护理措施中。下列正确的是（ ）。

A. 鼓励病人大量进食

B. 尽量避免搬运

C. 增加探望，增加信心

D. 静脉输液速度宜快

E. 如有便秘立即灌肠

34、患者女，48岁。哮喘持续发作，呼吸36次/分，吸气时脉搏明显减弱，此时该患者的脉搏属于（ ）。

A、奇脉

B、短绌脉

C、洪脉

D、交替脉

E、水冲脉

35、患者女，36岁。以重型再生障碍性贫血入院。查体：四肢皮肤散在瘀斑，口腔多处溃疡，最大约1.1~1.5cm，触痛，牙龈渗血。X部轻度充血。针对目前情况，预防口腔感染的护理措施是（ ）。

- A. 住单人病房
- B. 嘱患者带上口罩
- C. 根据pH值选择消毒液漱口，每日3次
- D. 每日刷牙3次以上
- E. 暂时不要外出活动

36、患者林某，女性，32岁，会阴侧切伤口红肿，给予红外线灯照射，灯距应为（ ）。

- A、5-10cm
- B、10-20cm
- C、20-30cm
- D、30-50cm
- E、50-70cm

37、患者刘某，48岁，患有乙型肝炎，下列用于浸泡其使用餐具的消毒液是（ ）。

- A. 含有效氯0.02%的消毒液
- B. 含有效氯0.05%的消毒液
- C. 含有效氯0.2%的消毒液
- D. 含有效氯0.5%的消毒液
- E. 含有效氯2%的消毒液

38、患者女，70岁，急性下壁心肌梗死，收入CCU病房。患者出现下列哪种心律失常最危险（ ）。

- A. 窦性心动过速
- B. 偶发房性期前收缩
- C. 窦性心律不齐
- D. 三度房室传导阻滞
- E. 偶发室性期前收缩

39、患者女，40岁。支气管哮喘，感冒3天，晨突发胸闷，咳嗽，咳黄色脓痰，继而昏睡，不易唤醒，紧急行（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/616005205030010050>