

泰安卫生系统招聘 2022 年考试真题及答案 解析【可复制版】

1: 医患之间的契约关系取决于 ()。

单项选择题:

- A、双方是生疏人
- B、双方是熟人
- C、双方地位有差别
- D、双方都有独立人格
- E、双方构成供求关系

2: 在体内的维生素 B1 主要以哪种形式存在 ()。

单项选择题:

- A、TMP
- B、TDP
- C、TPP
- D、TTP
- E、ATP

3: 不适于“损其有余”治疗原则的是

单项选择题:

- A、阴阳偏衰

- B、阴阳偏盛
- C、阳偏盛
- D、阴偏盛
- E、以上均非

4: 药物与受体形成不可逆复合物的键合形式是
单项选择题:

- A、疏水键和氢键
- B、电荷转移复合物
- C、偶极相互作用力
- D、共价键
- E、范德华力和静电引力

5: 中医的五脏是指心、肝、脾、肺和
单项选择题:

- A、胆
- B、三焦
- C、小肠
- D、胃
- E、肾

6: 阴虚火旺及年老体弱者慎用的中成药是

单项选择题：

- A、明目地黄丸
- B、石斛夜光颗粒
- C、明目上清片
- D、障眼明片
- E、明目蒺藜丸

7：测定蛋白样品中某种相对分子质量的蛋白选用最佳的方法是
()。

单项选择题：

- A、免疫 PCR
- B、ELISA 法
- C、蛋白印迹试验 (Western blotting)
- D、斑点杂交
- E、Southern blotting

8：未经批准擅自开办医疗机构行医的，担当以下法律责任，除了

单项选择题：

- A、警告
- B、没收其违法所得及其药品器械，并处 10 万元以下罚款
- C、对医师吊销执业证书
- D、给患者造成损害的，担当赔偿责任

E、构成犯罪的，追究刑事责任

9：两变量的分布类型未知时进行相关分析可选用（ ）。

单项选择题：

A、积差相关系数

B、皮尔逊相关系数

C、等级相关系数

D、总体相关系数

E、打算系数

10：有关大气污染的慢性危害叙述，哪一项是错误的（ ）。

单项选择题：

A、SO₂、NO₂ 及硫酸雾、硝酸雾等刺激黏膜引起炎症如咽炎、眼结膜炎

B、呼吸道炎症反复发作，支气管上皮的分泌量增加，内膜增厚，气道狭窄形成 COPD

C、大气污染使肺部产生疾患，肺动脉高压，继发了肺心病

D、大气污染物如 CO、NO₂ 等能使血红蛋白携氧力量下降而造成组织缺氧，加重心脏负担而导致肺心病

E、发达国家 COPD 发病率高于我国

11：生物药剂学讨论中的剂型因素不包括

单项选择题：

- A、药物的理化性质
- B、药物的处方组成
- C、药物的剂型及用药方法
- D、药物的疗效和毒副作用
- E、药物制剂的工艺流程

12：下列何种降血糖药易引起乳酸血症

单项选择题：

- A、正规胰岛素
- B、阿卡波糖
- C、格列本脲
- D、甲苯磺丁脲
- E、苯乙双胍

13：反应速度与酶浓度成正比的前提条件是（ ）。

单项选择题：

- A、底物被酶饱和
- B、反应速度达最大
- C、酶浓度远大于底物浓度
- D、底物浓度远大于酶浓度
- E、反应刚开头

14: 患者, 男性, 48 岁。脑出血, 入院第 2 天发生颅内压增高, 遵医嘱静脉滴注 20%甘露醇 250ml 时应留意

单项选择题:

- A、慢
- B、极慢
- C、一般速度
- D、快速滴注
- E、按血压凹凸调整滴注速度

15: 临床诊疗工作中的有效原则, 要求医务人员应做到 ()。

单项选择题:

- A、学习和把握偏方等诊疗手段
- B、仔细实施有效治疗
- C、治疗中若消失偏差, 自己知道就行了
- D、依据病人自我推断诊断治疗效果
- E、医疗操作常规依据病人状况不同可以进行修改

16: 患儿, 男, 1 岁。2 天前受凉后, 消失发热、犬吠样咳嗽、声音嘶哑、烦躁担心、查体 T 37. 9℃, 宁静时有吸气性喉鸣和三凹征, 双肺可闻及喉传导音或管状呼吸音, 心率加快。护士应提出的护理诊断是

单项选择题：

- A、体温过高
- B、体液不足
- C、低效性呼吸型态
- D、气体交换受损
- E、清理呼吸道无效

17：护士为张某做青霉素过敏试验，20 分钟后观看，其结果是：局部皮丘隆起，消失红晕，直径 1.5cm，应推断为

单项选择题：

- A、阳性
- B、弱阳性
- C、强阳性
- D、阴性
- E、假阳性

18：试验性讨论是以人为讨论对象，故须慎重考虑（ ）。

单项选择题：

- A、讨论对象的职业
- B、讨论对象的性别
- C、讨论对象的样本量
- D、医德问题

E、讨论工作的持续时间

19: 慢性胃炎最牢靠的临床诊断手段是 ()。

单项选择题:

A、胃镜检查 and 胃黏膜活检

B、x 线钡餐检查

C、胃液分析

D、幽门螺杆菌检测

E、抗壁细胞抗体测定

20: 脑干网状结构上行激动系统是 ()。

单项选择题:

A、具有上行唤醒作用的功能系统

B、通过丘脑特异投射而发挥作用的系统

C、单突触接替的系统

D、阻挡巴比妥类药物发挥作用的系统

E、与感觉无关的中枢神经系统

21: 地西洋经体内代谢, 1 位脱甲基, 3 位羟基化生成的活性代谢产物为

单项选择题:

A、去甲西洋

- B、劳拉西洋
- C、替马西洋
- D、奥沙西洋
- E、氯硝西洋

22: 对甲状腺功能亢进症重度浸润性突眼的护理不应

单项选择题:

- A、抬高头部
- B、鼓舞多食略咸食品
- C、外出时用眼罩
- D、生理盐水纱布局部湿敷
- E、抗生素眼膏涂眼

23: 下列相宜于老年人养分需要的是 ()。

单项选择题:

- A、蛋白适量而优质
- B、脂肪摄人不宜过多
- C、不宜食用高蔗糖食物
- D、总热能摄人适当降低
- E、以上皆是

24: 关于妊娠合并心脏病, 下述哪项不对

单项选择题：

- A、妊娠合并心脏病是孕产妇死亡的主要缘由之一
- B、妊娠 32~34 周血容量增加达高峰
- C、其次产程比第一产程心脏负担重
- D、第三产程心脏负担仍很重
- E、产后 2~3 天心脏负担减轻

25：从预防有机磷农药中毒角度，推断下列哪一种做法是错误的（ ）。

单项选择题：

- A、施药时使用浸酸液纱布口罩，防止吸入中毒
- B、施药时穿长袖衣、长裤、使用塑料围裙、鞋套、鞋盖等及防护口罩
- C、配药和检修施药工具时戴胶皮手套
- D、污染的工作服用碱液浸泡后用清水洗净
- E、施药前用肥皂涂抹皮肤，削减药剂经皮汲取

26：夏季热暑伤肺胃型，在初起症见鼻塞、壮热、无汗、舌苔薄白者，用方首选

单项选择题：

- A、藿香正气散
- B、新加香薷饮

- C、清暑益气汤
- D、白虎汤
- E、以上都不是

27：苷类酸催化水解的机制是

单项选择题：

- A、苷键原子先质子化，然后与苷元之间键断裂生成阳碳离子，再溶剂化成苷元
- B、苷键原子先质子化，然后与糖之间键断裂生成阳碳离子，再溶剂化成糖
- C、苷键原子与苷元之间键先断裂生成阳碳离子，然后质子化，再溶剂化成苷元
- D、苷键原子与糖之间的键先断裂生成阳碳离子；然后质子化，再溶剂化成糖
- E、以上均不正确

28：社会医学讨论的特点是（ ）。

单项选择题：

- A、讨论结果的理论性
- B、讨论对象的简洁性
- C、讨论方法的多学科性
- D、以患者为讨论对象

E、讨论方法的单一性

29: 食品中所含热能和养分素能满足人体需要的程度被称为()。

单项选择题:

A、食品的养分素密度

B、食品的养分价值

C、食品的热能密度

D、食品的养分质量指数

E、以上都不是

30: 维护医患之间相互信任的关系, 应除外 ()。

单项选择题:

A、主动赢得患者信任

B、珍惜患者的信任

C、对患者所提要求言听计从

D、努力消退误会

E、对患者消失的疑虑尽量澄清

31: 社区卫生服务的特点 ()。

单项选择题:

A、有效、经济

B、便利

- C、综合
- D、连续
- E、以上均是

32: 在临床医学讨论开头之前, 必需要把讨论方案提交到哪个部门进行审查

单项选择题:

- A、医院党委
- B、科研处
- C、科研评定委员会
- D、伦理委员会
- E、病人所在病房的领导

33: 打算溶胶溶液稳定性的主要因素是

单项选择题:

- A、离子化作用
- B、电位差
- C、水化作用
- D、pH
- E、吸附作用

34: 黄药子中毒的症状有

多项选择题

- A、肝胆炎症
- B、皮肤瘙痒
- C、恶心呕吐
- D、肾脏损伤
- E、时有脱发

35：国家颁布的与流行病学有关的防治法有

单项选择题：

- A、糖尿病防治法
- B、艾滋病防治法
- C、心血管病防治法
- D、传染病防治法
- E、肿瘤防治法

36：我国的《公共浴室卫生标准》对以下项目提出了卫生要求，除了

()。

单项选择题：

- A、小气候
- B、池水温度与浑浊度
- C、噪音
- D、空气质量

E、以淋浴为主

37: 下列哪一项与疔疮关系最亲密

单项选择题:

- A、好发于易受压迫及磨擦的部位
- B、气血亏虚，或因局部受压，肌肤失养
- C、多由湿热下注，瘀血凝滞经络所致
- D、好发于儿童与少年
- E、痰浊分散，风寒侵袭是病因

38: 应用滴眼剂的留意事项包括

多项选择题

- A、先滴左眼后滴右眼，以免用错药
- B、若同时使用 2 种药液，宜间隔 10min
- C、一次滴 1~2 滴，滴后轻轻闭眼 1~2min
- D、滴药时应距眼睑 2~3cm，勿使滴管口触及眼睑或睫毛
- E、不宜多次打开使用，连续应用 1 个月不应再用，即使肉眼检查药液外观无特别

39: 直接吞服可能导致患者窒息的剂型是

单项选择题:

- A、分散片

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/616125211230010041>