

2024 年公共卫生与预防医学题库

第一部分 单选题(300 题)

1、紫外线消毒的有效距离是【单选题】——

- A. 10m
- B. 2m
- C. 1m
- D. 5m 15m

【答案】： B

2、拟定各级医院感染管理政策【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】： A

3、关于压力蒸汽灭菌效果监测要求正确的是【单选题】——

- A. 工艺监测每天进行
- B. 化学监测每包进行
- C. 生物监测每周进行
- D. B-D 试验每天灭菌后进行 B-D 试验每锅进行

【答案】： B

4、根据我国下列卫生标准回答:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C.

各级医院的医院感染管理委员会

- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

5、根据我国卫生标准回答以下问题：对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析，提出控制措施，并组织实施的应是【单选题】

——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
B. 省医院感染管理专家咨询委员会
C. 各级医院的医院感染管理委员会
D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

6、对特殊感染而无保留价值的物品，最彻底的灭菌方法是【单选题】

——

- A. 煮沸消毒灭菌法
B. 过氧乙酸浸泡法
C. 燃烧灭菌法
D. 高压蒸汽灭菌法 日光曝晒法

【答案】：C

7、若需提高煮沸温度，可在水中加入【单选题】 ——

- A. 碳酸氢钠
B. 高锰酸钾
C. 乙醇
D. 亚硝酸钠 氯化钠

【答案】：A

8、血液净化室的医院感染管理下列哪项不正确【单选题】 ——

- A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
B. 工作人员定期体检，加强个人防护
C. 透析器、管道应专人专用
D. 传染病病人在隔离血液净化间内进行，专机透析

急诊病人不需固定透析机

【答案】：E

9、有关隔离的概念,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 咽白喉应严格隔离,皮肤白喉需接触隔离
- B. 流行性腮腺炎进行呼吸道隔离,脊髓灰质炎进行肠道隔离
- C. 大面积烧伤进行接触隔离
- D. 多重耐药株感染应列入接触隔离 活动性肺结核的隔离期是有效治疗后6周

【答案】：E

10、传染病区医务人员使用的隔离衣一般情况下更换时间是【单选题】——

- A. 24h
- B. 6h
- C. 48h
- D. 12h 72h

【答案】：A

11、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最迟不得超过【单选题】——

- A. 72h
- B. 48h
- C. 24h
- D. 12h 4h

【答案】：D

12、关于医院感染的概念错误的是:【单选题】——

- A. 入院时处于潜伏期的感染不是医院感染
- B. 医院感染是指在医院内获得的感染
- C. 慢性感染急性发作是医院感染
- D. 与上次住院有关的感染是医院感染

婴幼儿经胎盘获得的感染不是医院感染

【答案】：C

13、每日 I 级手术间开始前,提前开启净化空调系统时间【单选题】——

- A. 10 分钟
- B. 30 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟 40 分钟

【答案】：B

14、后勤人员在治疗室要安置新的紫外线灯做空气消毒,护理人员指导安装其灯管离地面的距离为【单选题】——

- A. <4m
- B. <2m
- C. <2.5m
- D. <3m <3.5m

【答案】：B

15、对怀疑医院内感染的病例取标本进行病原体检查,错误的是【单选题】——

- A. 在使用抗菌药物前送标本
- B. 为节约经费,应该在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
- C. 采集标本后及时送检
- D. 采集标本时防止污染 接到临床标本后及时正确接种

【答案】：B

16、取无菌纱布的正确方法是【单选题】——

- A. 戴手套拿取纱布
- B. 以上都不是
- C. 用灭菌换药镊子夹取纱布
- D. 用无菌持物钳夹取纱布 用消毒的手指拿取纱布

【答案】：D

17、对一次性卫生用品、消毒药械的购置查检许可证,对其抽检进行细菌学检查【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：D

18、引起医院感染的病原微生物主要是【单选题】——

- A. 条件致病菌
- B. 细菌
- C. 弓形体
- D. 衣原体 真菌

【答案】：A

19、某霍乱患者在行严密隔离时,其具体措施不包括【单选题】——

- A. 只能在休息日探视
- B. 病人住单人病室,门窗关闭,病人不外出
- C. 接触病人需戴口罩、帽子,穿隔离衣、裤、鞋
- D. 病室每天消毒1次 病人的一切用物应严格消毒处理

【答案】：A

20、发生医院感染时,停止收容新病人的时间是【单选题】——

- A. 该病最长潜伏期过去
- B. 该病平均潜伏期过去
- C. 该病常见潜伏期过去
- D. 该病最短潜伏期过去 观察一段时间没有新病人发生

【答案】：A

21、HICPAC 隔离预防指南第一部分最重要,主要是指对所有患者均实施

【单选题】——

- A.

基础预防

- B. 标准预防
- C. 接触隔离
- D. 空气隔离 飞沫隔离

【答案】： B

22、煮沸消毒灭菌时,错误的操作是【单选题】——

- A. 大小相同的盆应重叠
- B. 玻璃类用纱布包好
- C. 物品完全浸没在水中
- D. 煮沸过程中再加物品,应在第二次水沸后重新计时 有轴节的器械宜打开

【答案】： A

23、下列带入感染描述正确的是【单选题】——

- A. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 病人在家中已发生的感染 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

【答案】： A

24、在医院感染暴发流行或流行得到证实后,医院应在多长时间内报告上级卫生行政部门【单选题】——

- A. 48h
- B. 36h
- C. 24h
- D. 12h 6h

【答案】： C

25、经血液、体液传播的病原体不包括【单选题】——

A. 乙型肝炎病毒

B.

丙型肝炎病毒

- C. 人类免疫缺陷病毒
- D. 麻疹病毒 疟原虫

【答案】：D

26、关于洗手指征,下述哪项是错误的【单选题】——

- A. 接触病人前后
- B. 进行无菌技术操作前后
- C. 戴口罩和穿、脱隔离衣前后
- D. 接触血液、体液和被污染的物品前后 脱手套后无须洗手

【答案】：E

27、根据我国卫生标准回答以下问题:对本地区的医院内感染管理进行技术指导的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：B

28、根据我国卫生标准回答:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

29、取无菌溶液时,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 倒溶液时可不顾及瓶签的朝向
- B. 用前核对瓶签
- C.

保持瓶盖内侧面无菌

D. 用后立即盖上 检查药液是否有沉淀

【答案】：A

30、使用中消毒液细菌菌落总数应【单选题】——

A. $\leq 200\text{cfu/ml}$

B. $\leq 100\text{cfu/ml}$

C. $\leq 15\text{cfu/ml}$

D. $\leq 10\text{cfu/ml}$ $\leq 5\text{cfu/ml}$

【答案】：B

31、使用无菌包的正确方法是【单选题】——

A. 打开无菌包时,必须保护包内面的无菌面

B. 从无菌包内取出的物品若未使用,应立即放回包内

C. 无菌包潮湿时,应待干燥后再用

D. 打开无菌包时,应用手指捏住包布四角的内面展开 无菌包打开后无须注明开包日期和时间

【答案】：A

32、下列消毒剂中属高水平消毒剂的是【单选题】——

A. 戊二醛

B. 聚维酮(络合碘)

C. 苯扎溴铵(新洁尔灭)

D. 乙醇 碘酊

【答案】：A

33、下列隔离操作中哪项是错误的【单选题】——

A. 操作过程中应用手扶好露出鼻部的口罩

B. 用避污纸打开床旁桌上的瓶塞灌开水

C. 测脉搏时持手表放入塑料袋内

D. 用避污纸取回病人用过的药杯 用过的体温表放于消毒液
中

【答案】：A

34、在我国医院内感染中,病人最常发生感染的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 呼吸道 胃肠道

【答案】：D

35、医院感染监测;管理监督;评价效果;发现问题提出对策【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：C

36、B-D 试验合格的标准是【单选题】——

- A. 指示图各部位颜色变化由深变浅
- B. 指示图各部位颜色变化为浅灰色
- C. 指示图各部位颜色变化为深黑色
- D. 指示图各部位颜色变化大致均匀 指示图各部位颜色变化深浅一致均匀

【答案】：E

37、医院内最多见的多重耐药菌株是【单选题】——

- A. 耐甲氧西林/苯唑西林的金黄葡萄球菌(MRSA)
- B. 耐万古霉素肠球菌(VRE)
- C. 耐万古霉素金黄葡萄球菌(VRSA)
- D. 产超广谱酶大肠埃希菌 耐青霉素的肺炎链球菌

【答案】：A

38、穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理. 化学灭菌方法
- B. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中. 低效消毒剂
- D. 应用物理灭菌方法 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

【答案】： A

39、医院感染的含义是【单选题】——

- A. 所有发生在医院内的细菌感染
- B. 因医疗器械消毒不严造成的感染
- C. 病人在住院期间发生的感染
- D. 病人在住院期间或医院职工在护理或治疗患者过程中发生的感染
医院内病人直接或间接传播引起的感染

【答案】： D

40、重症监护病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】： B

41、妊娠妇女不宜用的抗菌药物是【单选题】——

- A. 青霉素
- B. 磷霉素
- C. 林可霉素
- D. 四环素 头孢菌素

【答案】： D

42、无菌区的定义是【单选题】——

- A. 经过灭菌处理的区域

B. 不使已灭菌的物品再污染并保持灭菌

C.

未经灭菌处理的区域

- D. 经过灭菌未被污染的区域 灭菌处理后被污染的区域

【答案】：D

43、治疗室的管理中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 注射治疗时要铺无菌盘,抽出的药液存放不能超过2小时
B. 治疗室中开启的各种溶酶不能超过24小时
C. 治疗室中开启的无菌溶液需在4小时内使用
D. 碘酒、乙醇瓶应保持密闭,每周更换并灭菌容器1~2次 经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不能超过48小时

【答案】：E

44、SARS传播最重要的途径是【单选题】——

- A. 接触传播
B. 飞沫传播
C. 气溶胶传播
D. 血液-体液传播 空气传播

【答案】：B

45、下列细菌是目前医院内感染常见的细菌,但除外【单选题】——

- A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌
B. 大肠埃希菌
C. 沙门菌属
D. 铜绿假单胞菌 肺炎杆菌

【答案】：C

46、根据我国卫生标准回答以下问题:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
B. 省医院感染管理专家咨询委员会
C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科

临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

47、避污纸的正确使用方法为【单选题】——

- A. 污染的手取避污纸可掀页撕取
- B. 从页面抓取
- C. 随便撕取
- D. 掀开页面抓取第一页 清洁手取避污纸需他人传递

【答案】：B

48、某医院收入一痢疾患者,该患者在入院时又感染了白喉杆菌,入院后发生白喉,这属于【单选题】——

- A. 交叉感染
- B. 医源性感染
- C. 自身感染
- D. 带入感染 以上都不是

【答案】：D

49、有关抗生素管理下列哪项错误【单选题】——

- A. 把抗菌药物分成一线、二线药物,二线药物应控制使用
- B. 二线药物毒副作用大、价贵、疗效低
- C. 在同类抗生素中应留有替代性药,在必要时再启用
- D. 无药敏结果参考时,可按经验选药原则用药 定期全院菌株的药敏统计结果公布,为临床用药与药剂科进药提供信息

【答案】：B

50、对洗衣房的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

- A. 布局上要求洁、污分区,路线由污到洁,不能逆行
- B. 运送车辆应洁、污分开,浸有血液、体液的布类应置于防水袋内封闭运送
- C. 洗衣房应有定期清洁消毒制度
- D. 各类衣服应分类清洗,感染病人与普通病人的衣物应分开清洗对血污布类应区分其感染性,必要时按感染性布类处理

【答案】：E

51、下列细菌是目前医院感染常见的细菌,但除外【单选题】——

- A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 沙门菌
- D. 铜绿假单胞菌 克雷伯肺炎杆菌

【答案】：C

52、属于高度危险性物品的是【单选题】——

- A. 手术器械和用品
- B. 体温表
- C. 呼吸机管道
- D. 胃肠道内窥镜和气管镜 麻醉机管道

【答案】：A

53、临床科室医院感染管理小组的职责下列哪项错误【单选题】——

- A. 制定本科室医院感染管理规章制度
- B. 监督检查本科室有关医院感染管理的各项工作,对医院感染可疑病例,可能存在感染的环节进行监测,并采取有效防治措施
- C. 对医院感染散发病例按要求登记报告,并立即向当地卫生行政机构报告
- D. 按要求对疑似或确诊病例留取临床标本,进行细菌学检查和药敏试验 监督检查本科室抗生素使用情况

【答案】：C

54、使用戊二醛达到灭菌的时间是【单选题】——

- A. 6小时
- B. 2小时
- C. 10小时以上
- D. 8小时以上 4小时

【答案】：C

55、关于医院感染知识培训要求,下述中错误的是【单选题】——

- A.

培训内容包括管理知识和专业知识

- B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- C. 非专职人员每年培训不少于 2 小时
- D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】： C

56、关于医院感染知识培训错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 非专职人员每年不少于 2 小时培训
- C. 培训对象包括管理. 医务. 工勤人员
- D. 实习医师必须培训 进修医师必须培训

【答案】： B

57、二级医院【单选题】——

- A. 医院感染发生率 $\leq 8\%$
- B. 切口感染率 $\leq 0.5\%$
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】： C

58、根据我国卫生标准回答:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】： A

59、肛管煮沸消毒时,操作错误的是【单选题】——

A. 先将肛管洗刷干净

B.

水沸后开始计时

- C. 肛管腔内注水,用纱布包好
- D. 冷水时放入 在沸水中持续 5~10 分钟

【答案】：D

60、医源性感染【单选题】——

- A. 病原体来源于病人本身的感染
- B. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人 病人在家中已发生的感染

【答案】：B

61、下列哪种情况属于医院感染【单选题】——

- A. 烧伤创面培养出金黄色葡萄球菌
- B. 经产道感染的乙型肝炎
- C. 红霉素静脉滴注后发生静脉炎;拔出的导管在血平皿上滚动培养,细菌菌落数 8 个
- D. 羊肠线吸收不佳的炎症反应 入院后 5 天发生的甲型肝炎

【答案】：B

62、医院发现一次性使用无菌医疗用品不合格产品或质量可疑产品时,应【单选题】——

- A. 立即停止使用,与供应商联系进行退、换货处理
- B. 立即停止使用,并报告医院管理部门进行退、换货处理
- C. 可继续使用,但应注意密切观察有无不良反应发生
- D. 立即停止使用,并及时报告当地药品监督管理部门,不得自行作退、换货处理 立即停止使用,并及时报告医院管理部门,就地销毁不合格产品

【答案】：D

63、输血科预防医院感染的措施错误的是：【单选题】——

A.

每月对储血冰箱的内壁进行生物学监测,不得检出致病性微生物和霉菌

- B. 保持环境清洁,每天清洁桌面
- C. 血浆置换术应在II类环境中进行并注意消毒隔离
- D. 工作人员上岗前应注射乙型肝炎疫苗,并定期检查抗体水平
被血液污染的台面可用新洁尔灭消毒处理

【答案】: E

64、损伤性废物【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】: A

65、不属于高度危险物品的是【单选题】——

- A. 腹腔镜
- B. 导尿管
- C. 体温表
- D. 穿刺针 手术器材

【答案】: C

66、新紫外线灯管输出功率不低于【单选题】——

- A. 60uw/cm²
- B. 100uw/cm²
- C. 80uw/cm²
- D. 90uw/cm² 110uw/cm²

【答案】: D

67、自身感染【单选题】——

- A. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C.

在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

D. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染 病人
人在家中已发生的感染

【答案】： B

68、关于使用中的灭菌剂的监测正确的是【单选题】——

- A. 生物监测每周一次
- B. 生物监测每天一次
- C. 生物监测不得检出致病微生物
- D. 化学监测每月一次 灭菌后的物品不得检出任何微生物

【答案】： E

69、铺无菌盘时,使用无菌持物钳的操作如下,其中正确的是【单选题】——

- A. 夹取物品时钳端触及罐口边缘
- B. 使用中钳端始终朝下,无反转动作
- C. 用无菌持物钳夹取消毒油纱布
- D. 到远处夹取物品后立即返回放回浸泡容器内 从浸泡容器中取放时先将钳前端打开

【答案】： B

70、用紫外线灯做空气消毒时,照射时间不少于【单选题】——

- A. 20min
- B. 25min
- C. 15min
- D. 35min 30min

【答案】： E

71、以 15%过氧乙酸原液配制 0.3%过氧乙酸 100mL,下列方法中正确的是【单选题】——

- A. 原液稀释 200 倍
- B. 原液 30mL 加水 70mL
- C.

原液 20mL 加水 80mL

D. 原液 15mL 加水 85mL 原液 2mL 加水 98mL

【答案】：E

72、术前皮肤消毒应由【单选题】——

A. 巡回护士完成

B. 未洗手的手术医生完成

C. 手术护士完成

D. 已洗手的手术医生完成 麻醉医生完成

【答案】：D

73、为阳离子表面活性剂,对阴离子表面活性剂有拮抗作用的是【单选题】——

A. 乙醇

B. 甲醛

C. 苯扎溴铵

D. 过氧乙酸 纯乳酸

【答案】：C

74、目前引起输血后肝炎的主要的肝炎病毒为【单选题】——

A. 乙型肝炎病毒

B. 甲型肝炎病毒

C. 戊型肝炎病毒

D. 丙型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】：D

75、根据我国下列卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的是【单选题】——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

76、烧伤病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】： B

77、下列情况属于医院感染的是【单选题】——

- A. 在皮肤、粘膜开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者
- B. 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎性反应
- C. 婴儿经胎盘获得的感染,如 CMV,弓形虫发生在出生后 48 小时以内者
- D. 住院中由于治疗措施而激活的感染 由于输注碳酸氢钠溶液(苏打)外渗引起的局部炎性反应

【答案】： D

78、对患者或怀疑患者传染病的产妇用过的一次性用品及胎盘必须【单选题】——

- A. 放入黄色塑料袋内,密闭运送,无害化处理
- B. 放入红色塑料袋内,密封后丢弃
- C. 放入黑色塑料袋内,按垃圾处理
- D. 放入黑色塑料袋内,密闭运送,无害化处理 放入白色塑料袋内,标记处理

【答案】： A

79、洗手过程中手触及未消毒物品应【单选题】——

- A. 更改浸泡用药液
- B. 重新洗手
- C. 延长浸泡时间
- D. 继续原有洗手步骤 多戴一副手套

【答案】： B

80、根据我国卫生标准回答:使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】: D

81、目前引起输血后肝炎的主要肝炎病毒为【单选题】——

- A. 甲型肝炎病毒
- B. 乙型肝炎病毒
- C. 丙型肝炎病毒
- D. 戊型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】: C

82、AFB 隔离指的是【单选题】——

- A. 空气隔离
- B. 接触隔离
- C. 结核菌(病)隔离
- D. 严密隔离 血液-体液隔离

【答案】: C

83、使用紫外线照射消毒,关灯后至再使用前须间隔【单选题】——

- A. 3~4min
- B. 5~6min
- C. 1~2min
- D. 7~8min 9~10min

【答案】: A

84、下列监测的控制指标中,哪项是错误的【单选题】——

- A.

凡经消毒的物品不能检出任何微生物

- B. 手术室医务人员手上带菌数应少于 5 个/cm²
- C. 新生儿室、儿科病室的物体表面不得检出沙门菌
- D. 手术室、产房、新生儿室空气中含菌量应少于 200 个/m³ 紫外线消毒灯管在使用中的功率应大于 70 μW/cm²

【答案】：A

85、下列哪种情况属于医院感染：【单选题】——

- A. 皮肤、粘膜的开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者
- B. 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎症
- C. 婴儿经胎盘获得的感染,如 CMV、弓形虫病发生在出生后 48 小时以内者
- D. 住院中由于治疗措施而激活的感染 由于输注苏打外渗引起的局部炎症

【答案】：D

86、传染病区中划分为清洁区的是【单选题】——

- A. 走廊
- B. 洗漱室
- C. 配餐室
- D. 化验室 浴室

【答案】：C

87、霍乱病人应采取【单选题】——

- A. 接触隔离
- B. 保护性隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 消化道隔离 严密隔离

【答案】：E

88、医院感染最重要的传染来源是【单选题】——

- A. 病原携带者

B. 血液制品

C.

食品

D. 动物 各种病人

【答案】：E

89、医院内下呼吸道感染的常见诱因是【单选题】——

A. 留置导尿管

B. 气管切开

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：B

90、关于医院内感染的概念,错误的是【单选题】——

A. 医院内感染是指在医院内获得的感染

B. 与上次住院有关的感染是医院内感染

C. 出院之后发生的感染可能不是医院内感染

D. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院内感染 婴幼儿经
胎盘获得的感染是医院内感染

【答案】：E

91、关于无菌器械保存液和消毒剂的描述,下列哪项是正确的【单选题】——

A. 无菌器械保存液应该是无菌的,最多允许检出少量微球菌

B. 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 200 cfu/mL,致病性微生物不得检出

C. 无菌器械保存液细菌总数应 ≤ 5 cfu/mL,致病性微生物不得检出

D. 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 10 cfu/mL,允许检出金黄色葡萄球

菌 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 100 cfu/mL,致病性微生物不得检出

【答案】：E

92、小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是:【单选题】——

A. 青霉素

B. 磺胺嘧啶

C. 氨苄青霉素

D. 头孢唑啉 林可霉素

【答案】：C

- 93、对病室进行紫外线消毒,下列做法错误的是【单选题】——
- A. 紫外线穿透性差,被消毒的物品不可有任何遮蔽
 - B. 灯管使用期限不能超过 2000 小时
 - C. 紫外线灯管要保持清洁透亮
 - D. 为检查紫外线杀菌效果,定期进行空气细菌培养 照射前,先做好病室的清洁工作

【答案】： B

- 94、须现配现用的消毒剂是【单选题】——

- A. 过氧乙酸
- B. 乙醇
- C. 苯扎溴铵
- D. 纯乳酸 甲醛

【答案】： A

- 95、 I 、 II 级手术室空气采样的时间【单选题】——

- A. 手术开始前 30 分钟
- B. 彻底清扫后 30 分钟
- C. 手术结束后 30 分钟
- D. 采样前提前开启空气消毒机 30 分钟后 手术开始前 1 小时

【答案】： D

- 96、下述各项中错误的是【单选题】——

- A. 小儿呼吸道感染不需要隔离
- B. 医院污物应分类收集、分别处理,以防止污染扩散
- C. 大面积烧伤或多重耐药菌感染应进行接触隔离
- D. 洗手是预防医院感染的重要措施 传染病区应严格划分清洁区、半污染区、污染区

【答案】： A

- 97、下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 无菌器械保存液应该是无菌的,最多允许检出少量微球菌
- B.

使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 200 cfu/mL,不得检出致病性微生物

- C. 无菌器械保存液细菌总数应 ≤ 5 cfu/mL,不得检出致病性微生物
- D. 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 10 cfu/mL,允许检出金黄色葡萄球菌
- 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 100 cfu/mL,不得检出致病性微生物

【答案】：E

98、下列各项中错误的是【单选题】——

- A. 医护人员在采血、输血前后要洗手
- B. 每批一次性注射器均应注明出厂日期、灭菌日期和有效期
- C. 使用过的一次性注射器、输血器材应消毒毁灭或焚烧
- D. 实验工作人员不能用口吸管,处理污物时要戴手套 艾滋病的潜伏期内无传染性

【答案】：E

99、III类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 ≤ 20 cfu/cm²,未检出致病菌
- B. 细菌总数 ≤ 25 cfu/cm²,未检出致病菌
- C. 细菌总数 ≤ 10 cfu/cm²,未检出致病菌
- D. 细菌总数 ≤ 5 cfu/cm²,未检出致病菌 细菌总数 ≤ 15 cfu/cm²,未检出致病菌

【答案】：C

100、牙科手机和耐湿热、需要灭菌的口腔诊疗器械,首选灭菌方法为

【单选题】——

- A. 环氧乙烷熏蒸灭菌
- B. 压力蒸汽灭菌
- C. 等离子体灭菌
- D. 化学方法进行浸泡灭菌 煮沸消毒

【答案】：B

101、注射室属于【单选题】——

A. I类地区

B.

II类地区

C. III类地区

D. IV类地区 非分类地区

【答案】：C

102、铺盖手术巾者应该是【单选题】——

A. 已戴好手套的手术医生

B. 洗完手但未泡手的手术医生

C. 穿好手术衣但未戴手套的手术医生

D. 泡完手但未穿手术衣的手术医生 未洗手的手术医生

【答案】：D

103、根据我国卫生标准回答：接触皮肤的医疗用品【单选题】——

A. 必须无菌

B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出

C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ，致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ，致病性微生物不得检出

【答案】：C

104、ICU的医院感染管理措施错误的是【单选题】——

A. 探视者进入ICU应更衣、换鞋

B. 工作人员进入ICU要穿专用工作服、换鞋、戴帽子、口罩、洗手

C. ICU应布局合理，分治疗室(区)和监护区

D. 病人的安置应感染病人与非感染病人分开，特殊感染病人单独安置 监护区每床使用面积不少于 9.5m^2

【答案】：A

105、护理传染病病人，在离开传染病房时要按照要求刷手。正确的刷手顺序是【单选题】——

A. 手掌. 腕部. 手指. 指甲. 指缝. 手背

B.

腕部.前臂.手掌.手背.手指.指甲

C. 前臂.腕部.指甲.指缝.手指.手背.手掌

D. 手指.指甲.指缝.手背.手掌.腕部.前臂 前臂.腕部.手背.手掌.手指.指缝.指甲

【答案】：E

106、医疗区域属于半污染区的是【单选题】——

A. 患者洗涤间

B. 病区化验室

C. 病室及厕所

D. 治疗室 病区营养配餐室

【答案】：B

107、调查医院内感染的最佳方法是【单选题】——

A. 从医院微生物室获得病例来源

B. 临床医院填报病例

C. 专职护士到病案室前瞻性发现病例

D. 病室监控护士报告病例 专职护士到病案室从出院病历中
找查病例

【答案】：C

108、下列有关护理工作的描述,不正确的是【单选题】——

A. 各种治疗、护理、换药操作应按清洁伤口、感染伤口、隔离伤口
依次进行

B. 起封抽吸的各种溶媒超过 36 小时不得使用,最好采用大包装

C. 无菌物品必须一人一用一灭菌

D. 灭菌物品提倡使用小包装,无菌棉球或纱布罐一经打开,使用时
间不得超过 24 小时 治疗室、处置室布局合理,清洁区、污染区分
区明确

【答案】：B

109、接触传染病患者后隔离衣应放在【单选题】——

A. 治疗区,清洁面向外

B.

走廊,清洁面向外

- C. 走廊,清洁面向内
- D. 办公室,清洁面向外 病室,清洁面向外

【答案】： B

110、预防免疫功能低下患者发生医院感染,不正确的是【单选题】——

- A. 保护皮肤黏膜的完整性
- B. 保护性隔离
- C. 全身使用广谱抗生素
- D. 治疗局部感染病灶 注射相关疫苗

【答案】： C

111、张某,大面积烧伤病人,创面出现铜绿假单胞菌感染,创面换药后敷料的正确处理方法为【单选题】——

- A. 扔入污物桶
- B. 焚烧
- C. 清洗后放日光下曝晒
- D. 清洗后再消毒 灭菌后再清洗

【答案】： B

112、一级医院【单选题】——

- A. 医院感染发生率 $\leq 8\%$
- B. 切口感染率 $\leq 0.5\%$
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】： D

113、医院的医院感染管理委员会的主要职责不包括【单选题】——

- A. 依据有关政策法规,制定全院控制医院感染规划、管理制度,并组织实施
- B. 根据《综合医院建筑标准》有关卫生学标准及预防医院感染的要

求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见
C.

建立会议制度,定期研究、协调和解决有关医院感染管理方面的重大
事项;遇有紧急问题随时召开

D. 定期总结、分析细菌学检测监测资料,向有关部门反馈,并向全
院公布 对医院感染管理科拟定的全院医院感染管理工作计划进
行审定,对其工作进行考评

【答案】: D

114、内镜室的医院感染管理,下列哪项错误【单选题】——

- A. 内镜室应设检查区和清洗消毒区
- B. 病人进行检查前必须先做肝功能、HBV、HCV 等标记物检查
- C. 需要隔离者留于最后作检查
- D. 每例内镜使用后应用高效消毒剂进行消毒处理,每天工作结束后
对内镜进行终末消毒 每天清洗消毒容器

【答案】: C

115、潜伏病毒的激活感染是【单选题】——

- A. 麻疹恢复期
- B. 隐性乙型脑炎病毒感染
- C. 乙型肝炎病毒携带者
- D. 单纯疱疹反复发作 慢性活动性肝炎

【答案】: D

116、我国医院内感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 呼吸道 胃肠道

【答案】: D

117、II类区域空气消毒合格的标准是【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 300\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 400\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌

- C. 细菌总数 ≤ 200 cfu/m³, 未检出致病菌
- D. 细菌总数 ≤ 10 cfu/m³, 未检出致病菌

细菌总数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$, 未检出致病菌

【答案】：C

118、肾移植患者应采取哪种隔离措施【单选题】——

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 消化道隔离 保护性隔离

【答案】：E

119、目前医院内感染的研究对象主要是【单选题】——

- A. 住院患者
- B. 工作人员
- C. 陪护人员
- D. 探视人员 门诊患者

【答案】：A

120、同一病房内住有伤寒与痢疾患者,3周后伤寒患者的大便培养出痢疾杆菌,其属【单选题】——

- A. 病人在家中已发生的感染
- B. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病
- C. 病原体来源于病人本身的感染
- D. 病人之间引起的交叉感染 同时患伤寒和痢疾

【答案】：D

121、关于普通 30W 直管型紫外线灯消毒效果监测正确的是【单选题】——

- A. 新灯辐照强度 $\geq 100\text{uW}/\text{cm}^2$ 为合格
- B. 新灯辐照强度 $\geq 90\text{uW}/\text{cm}^2$ 为合格
- C. 灯辐照强度 $\geq 80\text{uW}/\text{cm}^2$ 为合格
- D. 灯辐照强度 $\geq 70\text{uW}/\text{cm}^2$ 为合格 使用中紫外线灯辐照强度 $\geq 60\text{uW}/\text{cm}^2$ 为合格

【答案】：B

122、医院感染区别于其他感染的不同点错误的是【单选题】——

- A. 医院感染的菌株大多为多重耐药性
- B. 易感人群抵抗力低,病死率高
- C. 在医院内一旦发生医院感染很容易引发群发性感染
- D. 在医院感染治疗效果好,一般不会出现死亡 医院感染病原体来源广泛

【答案】：D

123、手术中切开空腔脏器前用纱垫保护的目的是【单选题】——

- A. 防止内脏器官暴露过久
- B. 防止细菌污染
- C. 防止出血
- D. 防止损伤 防止术后腹胀

【答案】：B

124、从医院获得幽门螺杆菌感染的高危人群中主要是【单选题】——

- A. 检验人员
- B. 消化内科医师
- C. 消化内科护士
- D. 腹部外科医师 口腔科医师

【答案】：B

125、传染病区使用的拖把【单选题】——

- A. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用
- B. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净
- C. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用
- D. 拖把应有明显的标记,严格分区使用 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用

【答案】：C

126、测定压力蒸汽灭菌效果的指示菌是【单选题】——

- A. 白色念珠菌(ATCC10231)
- B. 金黄色葡萄球菌(ATCC6538)
- C. 大肠杆菌(ATCC8099)
- D. 枯草杆菌黑色变种(ATCC9372) 嗜热脂肪杆菌芽胞(ATCC9753)

【答案】：E

127、在医院中幽门螺杆菌的传播以下列哪种方式最多见【单选题】——

- A. 空气传播
- B. 接触传播
- C. 血液传播
- D. 唾沫传播 内镜操作传播

【答案】：E

128、关于各种危险性物品的处理方法不正确的是【单选题】——

- A. 凡是高度危险的物品,必须选用灭菌法
- B. 凡中度危险性物品,一般情况下达到消毒即可
- C. 中度危险性物品的消毒要求并不相同,部分内窥镜必须达到高效消毒
- D. 凡低度危险性物品,一般可用低效消毒方法 而对便器、卫生洁具等物品则只作一般的清洁处理即可

【答案】：E

129、免疫功能低下病人的医院感染预防,下列哪项错误【单选题】——

- A. 保护皮肤粘膜的完整性
- B. 广谱抗生素肠道预防感染
- C. 保护性隔离
- D. 治疗局部感染病灶 疫苗注射

【答案】：B

130、浸泡无菌持物钳的容器应是【单选题】——

- A. 大口容器,盛用消毒液
- B. 大口容器,底部垫纱布
- C. 大口容器,盛用消毒液,底部垫无菌纱布
- D. 盛用消毒液,底部垫无菌纱布 大口容器,盛用消毒液,底部垫纱布

【答案】：A

131、黏膜消毒可使用下列哪一种药液【单选题】——

- A. 苯扎溴铵(新洁尔灭)
- B. 聚维酮碘(碘伏)
- C. 乙醇
- D. 碘酊 氯己定

【答案】：B

132、做洁净手术间空气培养,培养皿暴露时间【单选题】——

- A. 10 分钟
- B. 20 分钟
- C. 15 分钟
- D. 30 分钟 40 分钟

【答案】：D

133、需要采取血液-体液隔离的疾病是【单选题】——

- A. 肺结核
- B. 艾滋病
- C. 器官移植者
- D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】：B

134、下列有关医院感染的管理人员培训要求描述错误的是【单选题】

——

- A. 300 张床位以上的医院设医院感染管理科
- B.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/617142133161006105>