

《基本护理技术》复习题

基本护理技术

一、单选题：

- 1、病室最适宜的温度和相对湿度为()
 - A、14—16℃20%—30%
 - B、16—18℃30%—40%
 - C、18—22℃50%—60%
 - D、20—22℃69%—70%
 - E、22—24℃70%—80%
- 2、保持病室安静的措施不包括()
 - A、建立健全有关安静制度
 - B、医护人员进行各种操作时做到“四轻”
 - C、病室桌、椅脚安装橡胶垫
 - D、治疗车轴、门轴应经常润滑
 - E、关好门窗，避免噪音
- 3、下列不属于医院社会环境调控范畴的是()
 - A、人际关系
 - B、工作态度
 - C、病友关系
 - D、医院规则
 - E、病室装修
- 4、不适于采取端坐的病人是()
 - A、心力衰竭
 - B、心包积液
 - C、休克
 - D、支气管哮喘
 - E、急性肺水肿()
- 5、铺备用床的目的是
 - A、供暂时床活动的病人使用

- B、保持病室整洁，准备接受新病人
 - C、便于接受麻醉后尚未清醒的病人
 - D、防止皮肤并发症的发生
 - E、为方便病人的治疗和护理
- 6、麻醉盘内不需准备的物品是()A、输氧导管 B、通气导管
- C、导尿管
 - D、吸痰管
 - E、牙垫
- 7、住院办理入院手续的根据是()
- A、单位介绍信
 - B、转院证明
 - C、门诊病历
 - D、住院证
 - E、欠费医疗证
- 8、急性心肌梗死病人需住院治疗，入院处护理人员首先应给病人()
- A、卫生处置
 - B、进行护理诊断
 - C、介绍医院规章制
 - D、氧气吸入，立即用平车送入病区
 - E、留尿便标本检查
- 9、下列哪项不是病人入病区的初步护理工作()
- A、准备病床单元
 - B、填写有关表格
 - C、卫生处置
 - D、介绍入院须知
 - E、了解病人身心需要
- 10、患者刚出院，对病床单元的处理下列哪项不妥()
- A、撤下被服送洗
 - B、床垫、棉胎置于日光下曝晒

- C、病床单元用消毒液擦拭
- D、痰杯、便盆浸泡于消毒液中
- E、立即铺好暂空床

11、颅脑手术后，病人头部翻转过剧可引起（ ）

- A、蛛网膜下腔出血
- B、血栓形成
- C、脑疝
- D、脑溢血
- E、栓塞

12、二人搬运病人上平车时，平车头端与床尾端与床尾应呈的夹角是（ ）

- A、30—40°
- B、40—60°
- C、60—90°
- D、80—90°
- E、大于90°

13、用平车运送病人，做法不妥的是（ ）

- A、下坡时，病人头在平车后端
- B、输液者不可中断
- C、进门时不可用车撞门

D、病人向平车挪动时，护士应该抵住病人 19、下列哪种约束方法可以用于限制患者坐起（ ）

- A、约束腕部
- B、约束踝部
- C、固定膝部
- D、固定肘部
- E、固定肩部

床 20、下列为病人翻身的处理中错误的是（ ）

- E、腰椎骨折病人，车上应垫木板

14、做膀胱镜检查病人的体位应该是（ ）

- A、膝胸卧位
- B、头低足高位
- C、去枕仰卧位
- D、俯卧位
- E、截石位

15、半坐卧位常用于 ()

- A、行颅骨牵引者
- B、十二指肠引流者
- C、肛门部位检查者
- D、呼吸困难者
- E、产妇胎膜早破时

16、脊髓腔穿刺后病人给予去枕平卧，目的是 ()

- A、有利于脑部血液循环
- B、防止脑缺血
- C、减轻脑膜刺激症状
- D、预防颅内压减低引起头痛
- E、防止呕吐物流入器官引起窒息

17、使用约束具时，病人肢体应处于 ()

- A、治疗的强迫位置
- B、容易变换的位置
- C、功能位置
- D、生理的运动位置
- E、病人喜欢的位置

18、中凹卧位适用于下列哪种病人 ()

- A、昏迷
- B、腹部检查
- C、心肺疾患
- D、休克
- E、全身麻醉 A、手术后病人，先检查敷料，必要时换药后再翻身
- B、颅脑手术后的病人，只能卧于患侧或平卧

C、颈椎或颅骨牵引的病人，翻身时不可放松牵引
D、石膏固定和有较大伤口的病人，翻身后将患侧放于适当位置，防止受压

E、翻身时注意节力

21、病区护士接到住院处通知有新病人住院，首先应（ ）

A、安排床位，将备用床变暂空床

B、到门口迎接新病人

C、向病人作入院指导

D、填写有关表格

E、收集病史及作护理体检

22、最有效的物理灭菌法是（ ）

A、燃烧法

B、高压蒸汽灭菌法

C、煮沸消毒灭菌法

D、日光暴晒法

E、紫外线消毒法

23、紫外线照射消毒物品时，应从.....时开始计时（ ）

A、灯亮即计时

B、灯亮 3~5 分钟

C、灯亮 5~7 分钟

D、灯亮 10 分钟

E、灯亮 15 分钟

24、对芽胞无杀灭作用的消毒剂是（ ）

A、甲醛

B、高浓度漂白粉

C、戊二醛

D、过氧乙酸

E、乙醇

25、浸泡消毒手的常用消毒剂有（ ）

A、0.1 新吉尔灭

- B、70%酒精
- C、0.2 过氧乙酸
- D、0.5%碘伏
- E、0.02%洗必泰

26、无菌包在未被污染的前提下可保存()

- A、4h
- B、24h
- C、3天
- D、7天
- E、15天

27、无菌操作中发现手套破损应()

- A、用胶布将破裂处贴好
- B、用碘酊棉球擦拭手套
- C、用乙醇棉球擦拭手套
- D、再加一副手套
- E、立即更换

28、铺无菌盘时，下列步骤哪项不正确的是()

- A、用无菌持物钳夹取无菌治疗巾
- B、双折铺于治疗盘上
- C、上面一层向远端呈扇形折叠
- D、开口边向内
- E、防止触及治疗巾内面

29、为防止交叉感染，必须做到()

- A、无菌物品应放在清洁、干燥的地方
- B、治疗室每日紫外线消毒一次
- C、取无菌物品，用无菌持物钳
- D、一份无菌物品只供一人使用
- E、操作者需戴好口罩帽子

30、传染病区就设置在()

- A、市中心

- B、交通方便的地方
- C、远离公共场所
- D、水源充足的地方
- E、靠近综合性医院

31、传染病区区域的划分的依据是()

- A、隔离种类
- B、病人所接触的环境
- C、医务人员接触的环境
- D、微生物种类
- E、病情轻重

32、穿隔离衣时至哪一环节手开始污染()

- A、穿隔离衣领取下隔离衣
- B、穿衣袖
- C、系领口
- D、系袖口
- E、系腰带

33、取用避话纸正确的方法是()

- A、从页面抓取
- B、掀页撕取
- C、掀开页面取第二页
- D、随便撕取
- E、请别人传递

34、为昏迷病人做口腔护理时下列说法不正确的是()

- A、操作前将病人的义齿取下浸于冷开水中
- B、从门齿处放入开口器
- C、禁止漱口
- D、浸泡义齿的水应每天更换
- E、棉球蘸水不易过多

35、用于真菌感染的漱口溶液是()

- A、生理盐水

B、0.02%呋喃西林

C、3%过氧化氢

D、4%碳酸氢钠

E、0.1%醋酸溶液

36、引起褥疮的主要原因是()

A、局部组织长期受压

B、全身营养缺乏

C、皮肤经常受潮湿刺激

D、高热

E、年老体弱

37. 卧床病人头发纠结成团时，用于湿润打结处的溶液是()

A. 冷开水 B. 百部酊

C. 30%乙醇 D. 生理盐水

E. 百部含酸煎液

38. 为一右上肢外伤的病人更换上衣的顺序是()

A. 先脱右侧后穿右侧 B. 先脱左侧后穿左侧

C. 先脱右侧先穿右侧 D. 先脱左侧先穿左侧

E. 先脱患侧后穿患侧

39、各期压疮局部处理均可采用()

A、定时翻身

B、3%过氧化氢溶液冲洗

C、抗生素

D、红外线照射

E、按摩

40、病人仰卧时，压疮好发于()

A、面部

B、耳廓

C、肋骨

D、肩峰

E、肘部

41、以口腔温度为标准划分低热范围 ()

- A、36°以下
- B、36.3°c—37.2°c
- C、37°c—38°c
- D、38°c—35°c
- E、38°c—39°c

42、测量呼吸时护士的手不离开诊脉的部位主要为了()

- A、保持患者体位不变
- B、保持护士姿势不变，以免疲劳
- C、易于观察呼吸的深浅度
- D、不被患者察觉，以免紧张
- E、易于记录时间

43、代谢性酸中毒患者的呼吸为()

- A、浅快呼吸
- B、蝉鸣样呼吸
- C、鼾声呼吸
- D、叹息样呼吸
- E、深而规则的大呼吸

44、发生绀脉提示 ()

- A、心力衰竭
- B、心源性休克
- C、房室传导阻滞
- D、心房颤动
- E、心律不齐

45、脉搏短绌指()

- A、单位时间内脉率不齐
- B、单位时间内心率不齐
- C、单位时间内脉率增加
- D、心率低于脉率
- E、单位时间内脉率少于心率

46、测血压时，应该注意()

- A、测量前嘱患者先休息 10~20 分钟
- B、固定袖带时应紧贴肘窝，松紧能放入一指为宜
- C、测量时血压计“0”点与心脏、肱动脉在同一水平
- D、听诊器胸件应塞在袖带内便于固定
- E、放气速度应慢，2mmHg/s

47、测血压时若袖带过紧，则测得血压结果()

- A、偏高 B 偏低
- C、脉压差小
- D、脉压差大
- E、无影响

48、属于医院基本饮食的是()

- A、高蛋白饮食
- B、软质饮食
- C、高热量饮食
- D、低盐饮食
- E、糖尿病饮食

49、低蛋白饮食的成年患者，每天蛋白质的摄入量应低于()

- A、20g
- B、30g
- C、40g
- D、50g
- E、60g

50、无盐低钠饮食要求患者每天摄入的食物中自然存在的含钠量低于()

- A、0.5g
- B、1.0g
- C、1.5g
- D、2.0g
- E、2.5g

51、潜血试验前3天，患者应禁食()

- A、牛奶
- B、西红柿
- C、肉类
- D、豆制品
- E、土豆

52、洗胃插管长度为()

- A、15~25cm
- B、25~35cm
- C、35~45cm
- D、45~55cm
- E、55~65cm

53、可采用冷疗法的部位是()

- A、枕后
- B、耳廓
- C、指端
- D、足底
- E、腹部

54、面部危险三角区感染化脓时，禁忌用热疗的主要目的是防止()

- A、出血
- B、贻误诊断
- C、皮肤烫伤
- D、疼痛
- E、颅内感染

55、属于热疗适应症的是()

- A、急性踝关节扭伤
- B、急腹症
- C、胃出血
- D、腰肌劳损
- E、扁桃体摘除术后

56、一般病人用热水袋的水温是()

A、40-50°C

B、50-55°C

C、60-70°C

D、40-55°C

E、30-60°C

57、持续用冷或用热 1 小时后，出现短暂的相反作用是()

A、局部效应

B、继发效应

C、远外效应

D、后续效应

E、反射效应

58、肝昏迷病人用肥皂水灌肠可导致()

A、电解质平衡失调

B、脂性腹泻

C、腹胀

D、氨的产生和吸收增加

E、对肠道刺激性增强

59、腹泻严重的患者，应予以()

A、清淡的普食

B、软食

C、半流质

D、暂时禁食

E、流质

60、便秘患者排便时，可进行腹部按摩，顺序为：

A、升结肠、横结肠、降结肠

B、横结肠、升结肠、降结肠

C、升结肠、降结肠、横结肠

D、降结肠、升结肠、横结肠

E、降结肠、横结肠、升结肠

- 61、病人上消化道出血时粪便的颜色是()
- A、鲜红色
 - B、陶土色
 - C、果酱样便
 - D、柏油样便
 - E、暗红色
- 62、护理尿潴留病人的措施中，错误的一项是()
- A、让病人听流水声
 - B、轻轻按摩下腹部
 - C、导尿术
 - D、口服利尿剂
 - E、用温水冲洗会阴
- 63、发口服药不适合要求的是()
- A、根据医嘱给药
 - B、做好心理护理
 - C、鼻饲患者暂缓发药
 - D、患者提出疑问须重新核对
 - E、危重患者要喂服
- 64、下列哪类药物服后需多饮水()
- A、铁剂
 - B、止咳糖浆
 - C、助消化药
 - D、健胃药
 - E、磺胺类药
- 65、下列外文缩写的中文意译，错误的是()
- A、qod：隔日一次
 - B、qd：每日一次
 - C、hs：每晚一次
 - D、qid：每日四次
 - E、biw：每周两次

66、实施无痛肌肉注射的措施，下列哪项不妥()

- A、患者侧卧位时，上腿弯曲，下腿伸直
- B、患者俯卧位时足尖相对，足跟分开
- C、推注药液速度缓慢
- D、同时注射两种药液时，应先注射刺激性强的药液
- E、不在有硬结的部位进针

67、注射法消毒皮肤直径应为()

- A、2cm
- B、3 cm
- C、4 cm
- D、5 cm
- E、6 cm

68、皮内注射时，皮肤消毒剂为()

- A、70%乙醇
- B、2%茂二醛
- C、2%过氧碘酊
- D、15%过氧乙酸
- E、3%双氧水

69、用皮内注射法接种卡介苗，正确的步骤是()

- A、注射前询问过敏史
- B、进针部位在前臂掌侧上段
- C、进针时针头与皮肤呈 5°角
- D、注入药物前要抽回血
- E、拔针后用干棉签轻压针刺处

70、下列皮试液 1ml 含量错误的是()

- A、青霉素：500U
- B、链霉素：2500U
- C、TAT：150IU
- D、细胞色素 C：7.5mg
- E、先锋霉素：500ug

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/618021106057006034>