

2024年四川雅安市卫生健康委员招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、最常见肉眼血尿反复发作的肾小球疾病是（ ）。

- A. 急性链球菌感染后肾小球肾炎
- B. 急进性肾小球肾炎
- C. 糖尿病肾病
- D. IgA肾病
- E. 狼疮性肾炎

【正确答案】

D

【答案解析】

IgA肾炎是以反复发作性肉眼或镜下血尿为临床特征，病理见肾小球系膜细胞增生，基质增多，伴广泛IgA沉积为特点的原发性肾小球疾病。A项，急性肾炎确实均有血尿，但属于自限性疾病，没有反复发作的特点。B项，急进性肾炎的临床特点是肾功能急剧恶化，病理为肾小球囊腔内有大量新月体形成（壁层上皮细胞增生+纤维蛋白沉积=新月体），常有尿异常，以少尿或无尿为主，一般不出现血尿，更无反复发作的特点。C项，糖尿病肾病首先要有糖尿病病史，临床表现出现最早的是水肿和蛋白尿（一般不出现血尿），还可见特征性眼底改变。E项，狼疮性肾炎会反复出现血尿和蛋白尿，但是不如IgA肾病常见。

2、麻醉中的手术病人输入几十毫升血后即出现手术区渗血和低血压，应考虑（ ）。

- A. 变态反应
- B. 出血倾向
- C. 过敏反应
- D. 细菌污染反应
- E. 溶血反应

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3、易导致主动脉瓣狭窄患者晕厥的情况为（ ）。

- A. 服用硫氮䓬酮
- B. 静坐休息
- C. 剧烈运动
- D. 睡眠
- E. 窦性心律，心率70次/分

【正确答案】

C

【答案解析】

剧烈运动时对于心脏的搏出量需求增加，但主动脉瓣狭窄患者无法满足，故而易产生晕厥。

4、用于治疗人破伤风的抗毒素血清对人是（ ）。

- A. 抗原
- B. 半抗原
- C. 抗体
- D. 不完全抗体
- E. 抗原抗体复合物

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

5、地高辛治疗心房纤颤的主要作用是（ ）。

- A. 抑制窦房结
- B. 缩短心房有效不应期
- C. 减慢房室传导
- D. 降低浦肯野纤维的自律性
- E. 直接降低心房的兴奋性

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

6、关于转氨酶的叙述，正确的是（ ）。

- A. 体内只有少数氨基酸参与转氨基作用
- B. 转氨酶只存在肝和心肌组织
- C. 磷酸吡哆醛将氨基转给 α -酮酸
- D. 以L-谷氨酸与 α -酮酸的转氨酶最为重要
- E. 磷酸吡哆胺从氨基酸接受氨基

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

7、因支气管静脉曲张破裂所致咯血最常见于（ ）。

- A. 肺结核
- B. 肺脓肿
- C. 肺栓塞
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 肺肉质变

【正确答案】

D

【答案解析】

支气管静脉曲张破裂所致咯血最常见于二尖瓣狭窄。由于严重二尖瓣狭窄，左心房压力突然增高，肺静脉压增高，支气管静脉曲张破裂出血所致，可为二尖瓣狭窄首发症状，多见于二尖瓣狭窄早期。后期因静脉壁增厚，以及随着病情进展致肺血管阻力增加及右心功能不全，大咯血发生率降低。

8、血清钙离子低于多少，可引起手足搐搦症发作（ ）。

- A. $<1.0\text{mmol/L}$ (4mg/dl)
- B. $1.75\sim 1.88\text{mmol/L}$ ($7\sim 7.5\text{mg/dl}$)
- C. 2.25mmol/L (9mg/dl)
- D. 1.38mmol/L (5.5mg/dl)
- E. 2.75mmol/L (11mg/dl)

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

9、正常儿，体重7.5kg、身长62cm，会翻身，能独坐很久，不会爬，能发出“爸爸”、“妈妈”等复音，但无意识，能听懂自己的名字，其月龄最

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/618037021062006041>