

2020 年医疗三基三严考试题库含答案（21）

一、单选图（每题 1 分，共 40 分）

1、我国艾滋病最常见的传播途径是

- A、输血和血制品 B、静脉注射毒品 C、母婴垂直传播
D、性传播 E、儿童疫苗注射

答案：B

2、下列消毒剂中哪一种为高效消毒剂

- A、聚维铜碘 B、碘酊 C、乙醇 D、含氯消毒剂
E、酚类消毒剂

答案：D

3、洗手的指征中哪一项不合理

- A、新生儿室入室常规规定应彻底洗手 B、接触污物前、后
应
洗手 C、侵入性操作前、后应洗手 D、接触病人后应洗
手 E、脱手套后需洗手

答案：B

4、下列哪项不属医院感染

- A、阑尾穿孔引起的腹膜炎 B、入院 72 小时后发生的肺炎
C、无症状导管菌尿症 D、烧伤 6 小时入院的创面感染
E、产道分娩吸入阴道分泌物的新生儿肺炎

答案：A

5、MRSA 感染的最佳选药

- 星 D、磷霉素 E、阿米卡星

答案：A

6、产超广谱酶(ESB1. s) 菌株所致感染的最佳选药是

- A、阿莫西林 B、头孢西丁 C、头孢唑肟 D、氨曲南 E、哌拉西林

答案：B7、《医院感染管理规范》对抗菌药物合理使用的要求中哪一项错误

- A、医院应安排抗感染专家或有经验医师负责医院抗感染药物使用的指导、咨询工作 B、提高细菌培养的送检率，促进抗菌药

物合理使用水平 C、医院抗菌药物使用率力争控制在 60%以

下 D、检验科和药剂科分别负责定期公布医院主要病原菌及其药敏试验结果 E、有条件的医院应开展抗感染药物临床应用

的监测答案：C8、抗菌药物应用中，下列哪项属错误

A、病毒感染不用抗菌药物 B、疑为细菌感染，应先送培养标

本而后经验性选药 C、培养结果出来，根据其药敏结果调整

药物 D、当应用抗菌药物 24 小时未见效立即改选其他药物

E、一般感染抗菌药物用至症状体征消失后 3 4 天

答案：D

9、艾滋病感染的预防，下列哪项错误

A、晚期病人应接受保护性隔离 B、病人血中 CD⁺T 淋巴细胞

<0.2*10⁷/L 时应接受抗肺孢子虫感染的预防 C、一旦发病即

应用广谱抗菌药预防全身感染 D、医务人员受 HIV 污染针头刺

伤，应立即报告并接受药物 (AZT) 预防 E、确诊并发感染应早

期抗生素治疗

答案：C

10、从医院获得幽门螺杆菌感染的高危人群中主要是

A、检验人员 B、消化内科医师 C、消化内科护士

D、腹部外科医师 E、口腔科医师

答案：B

11、目前输血后肝炎以哪一种最多见

A、丁型肝炎 B、乙型肝炎 C、庚型肝炎 D、TTV

肝炎 E、丙型肝炎 答案：E

12、下列抗菌药物中哪一种为窄谱抗菌药

A、万古霉素 B、阿米卡星 C、阿奇霉素 D、磷霉

素 E、环丙沙星 答案：A

13、对厌氧菌有治疗作用的抗菌药物是

A、妥布霉素 B、红霉素 C、头孢他定 D、哌拉西

林 E、氨曲南

答案：D

14、小儿流感嗜血杆菌感染首选的药物是

A、青霉素 B、氨苄西林 C、磺胺嘧啶 D、头孢唑

啉 E、林可霉素

答案：B

15、潜伏病毒的激活感染是

- A、麻疹恢复期
B、隐性乙型脑炎病毒感染
C、乙型肝炎病毒携带者
D、单纯疱疹反复发作
E、慢性活动性肝炎

答案：D

16、关于胃镜检查的适应证，下列哪项不正确

- A、上腹痛原因未明
B、呕血原因未明
C、胃溃疡性质未明
D、咯血查因
E、锁骨上淋巴结肿大查因

答案：D

17、关于胃镜检查的禁忌证，下列哪项不正确

- A、严重心衰
B、精神病不合作者
C、溃疡病急性穿孔者
D、吞腐蚀剂急性期
E、食管癌有吞咽梗阻者

答案：E

18、关于胆道镜检查，下列哪项应慎重

- A、可疑胆道残余结石的诊断 B、胆道出血的定位或止血
C、进行选择性肝内胆管造影 D、胆总管十二指肠瘘病人
E、高龄或高危胆道结石

答案：D

19、下列哪项不宜做纤维支气管镜检查

- A、原因不明的咯血 B、原因不明的咳嗽 C、原因不明
的喉返神经麻痹 D、痰检结核菌阳性，*线胸片肺无病灶
E、肺心病并肺门肿大，原因未明， $PaO_2 40\text{mmHg}$ 答案：

E20、有关纤维支气管镜检，下列哪项不正确

- A、术前应禁食 4 6 小时 B、术前
应作*线胸片检查 C、
术前均应做肺通气功能检查及血气分析 D、术前半小时内注射
阿托品及苯巴比妥 E、术后应禁食 2 小时 答案：C
- 21、下列
哪项不宜通过纤维支气管镜检进行治疗
- A、取气管、支气管内异物 B、肿瘤的电凝、电切或激光治
疗
C、病灶局部药物注射 D、止血治疗 E、气
胸时经支气

管抽气治疗答案：E22、有关纤维支气管镜检查，下列哪项不正确

A、可直接窥视 1—4 级支气管内肿块 B、可发现叶、段支气管腔阻塞 C、可进行选择性支气管造影 D、可直接窥视肺野浸润性病灶 E、可进行肺浸润性病灶或肺外周肿块的活检

答案：D

23、关于肺功能检查应用范围下列哪项是错的

A、确定肺功能障碍的程度 B、判定肺功能障碍的类型
C、可以发现肺部较小的病变 D、可用以判断某些药物的疗效
E、可以区别心源性和肺源性呼吸困难

答案：C

24、诊断心房颤动最重要的证据是

A、出现异常的 p 波 B、P 波消失 C、Q-R 间期不规则
D、QRS 波群形态不一致 E、心室率快

答案：B

25、诊断急性心肌梗死最重要的心电图表现是

- A、病理性 Q 波或 QS 波
B、ST 段弓背向上型上移
C、T 波倒置
D、对应导联 ST 段下移
E、多发室性期前收缩

答案：A

26、在鉴别室上性阵速与室性阵速时，以下哪项对室性阵速的诊断有肯定的意义

- A、心室夺获及室性融合波
B、QRS 波群宽大畸形
C、频率 200 次/min
D、T 波与 QRS 波群方向相反
E、以上都不是

答案：A

27、以下哪项最有助于房性期前收缩的诊断

- A、P-R 间期 $\leq 0.12s$
B、P 波倒置
C、QRS 波群正常
D、代偿间隙完全
E、以上都不是

答案：A

28、出现下述哪种波即可肯定病人处于轻睡期

- A、高波幅 6 节律 B、无。节律 C、额部。活动较多
D、阵发性短程 12 16 波/s E、颞部尖波

答案：D

29、脑电图检查每一病人应至少记录

- A、10 分钟 B、20 30 分钟 C、1 小时 D、2 小时
E、24 小时

答案：B

30、精神运动性发作的脑电波异常波为

- A、额叶棘波 B、双侧对称同步 3 波/s 棘慢综合 C、高
幅失律 D、颞叶放电 E、各导多棘慢波综合

答案：D

31、同心针电极能探测

- A、针极周围 1mm 左右范围内的电活动 B、整块肌肉的电活
动
C、一个完整的运动单位范围的电活动 D、一根神经纤维支
配
肌肉范围的电活动 E、一根肌纤维的电活动

答案：A

32、束颤电位代表

- A、肌纤维兴奋性增高
B、肌束兴奋性增高
C、运动单位兴奋性增高
D、肌束兴奋性降低
E、运动单位兴奋性降低

答案：C

33、一侧耳蜗神经核受损，将导致

- A、同侧耳全聋 B、对侧耳全聋 C、两耳全聋 D、
两耳听力均减弱 E、两耳听觉均正常

答案：A

34、下列动脉中，哪些没有分支到胃

- A、腹腔干 B、肠系膜上动脉 C、肝固有动脉 D、脾动脉 E、
胃十二指肠动脉

答案：B

35、腹股沟淋巴结收集

- A、下肢的淋巴 B、腹壁的淋巴 C、腰背部的淋巴

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/618131076106006123>