

# 介入血管外科实习生出科考试

## 一、选择题

1.动脉硬化性闭塞症特征性表现为 ( ) [单选题] \*

- A. 静息痛
- B. 溃疡
- C. 坏死
- D. 间歇性跛行✓

2.肝叶切除病人术后护理中错误的是 ( ) [单选题] \*

- A. 应专人护理
- B. 常规吸氧
- C. 鼓励早期下床活动✓
- D. 术后取平卧位
- E. 术后给予静脉补充营养

3.肝性脑病患者暂停蛋白质饮食是为了 ( ) [单选题] \*

- A. 减少氨的产生✓
- B. 减少氨的吸收
- C. 促使氨的转化
- D. 降低血尿素氮
- E. 降低肠道内 pH 值

4. 自外周静脉推注发泡剂应限制持续时间少于 ( ) [单选题] \*

- A. 5min
- B. 10min
- C. 20min
- D. 30min✓

5.实施静脉治疗护理技术操作的医务人员应为(), 并应定期进行静脉治疗所必须的专业知识及技能培训

( ) [单选题] \*

- A. 注册护士, 医师和乡村医生✓
- B. 注册护士, 医师, 实习护士和乡村医生
- C. 注册护士, 医师和医生

6.三腔两囊管用于治疗 ( ) [单选题] \*

- A. 胃癌出血
- B. 消化性溃疡出血
- C. 应激性溃疡出血
- D. 食管胃底静脉曲张破裂出血✓
- E. 急性糜烂出血性胃炎

7.指导慢性阻塞性肺气肿患者做腹式呼吸时, 吸气与呼气时间之比为 ( ) [单选题] \*

- A. 1:1SPQR
- B. 1:1. 5SPQR
- C. 1:2 或 1:3SPQR
- D. 2:1SPQR
- E. 1. 5:1SPQR✓

8. PORT 治疗间歇期常规多长时间进行维护一次? ? ( 1.0 分 ) [单选题] \*

A. 1周

B. 2周

C. 4周✓

D. 8周

9. PICC 穿刺成功后按预测长度长度修剪导管体外保留导管 ? ( 1.0 分 ) [单选题] \*

A. 2-3cm

B. 3-4cm

C. 5-7cm✓

D. 1-2cm

10.我国门静脉高压症病人的最常见原因 ( ) [单选题] \*

A. 胆汁性肝硬化

B. 血吸虫性肝硬化

C. 肝炎后肝硬化✓

D. 先天性门静脉狭窄

E. 酒精性肝硬化

11. 男性 ,34 岁 ,为肺脓肿病人 ,住院治疗 4 个月余仍有咯血 ,反复发作 ,最佳治疗方法是 ? ( 1.0 分 )

[单选题] \*

A. 祛痰及体位引流 KBLF

B. 痰培养选用敏感抗生素 KBLF

C. 超声雾化吸入药物 KBLF

D. 气管滴入药物 KBLF

E. 肺叶切除 KBLF✓

12. PICC 穿刺时以 ( ) 角穿刺血管，见回血，降低角度，推进穿刺针外套管，确保进入静脉。 ? ( 1.0 分 ) [单选题] \*

- A. 5~10°
- B. 15~30° ✓
- C. 35~40°
- D. 45~50°
- E. 以上都不对

13. 目前对小肝癌定位诊断最优者为 ( ) [单选题] \*

- A. CT
- B. MRI
- C. B 超
- D. 肝动脉造影 ✓
- E. X 线检查

14. 患者，男性，38 岁，吸烟 15 年，每天 30 支左右，冷库工作 8 年。近来，右小腿持续性剧烈疼痛，不能行走，夜间加重，到医院就诊，体检：右小腿皮肤苍白，肌萎缩，足背动脉搏动消失。可能的诊断是 ( ) [单选题] \*

- A. 血栓闭塞性脉管炎 ✓
- B. 动脉硬化闭塞
- C. 下肢静脉血栓
- D. 动脉栓塞
- E. 动静脉瘘

15. 中心静脉导管途径锁骨下静脉时，夹在锁骨与第 ( ) 肋之间，影响导管功能，称为夹闭综合征。 ?

(1.0分)[单选题]\*

A. 1✓

B. 2

C. 1~2

D. 2~3

E. 3

16.动脉硬化性闭塞症早期患者可出现患肢麻木.发凉，脚趾有（ ）[单选题]\*

A. 疼痛

B. 针刺样感✓

C. 发黑

D. 溃疡

17. PICC. CVC. PORT 的冲管和封管应使用（ ）或一次性专用冲洗装置。？(1.0分)[单选题]\*

A. 2ml

B. 5ml

C. 10ml 及以上✓

D. 1ml

18. 患者，男，46岁，自觉上腹部不适，恶心，1小时前突发呕吐大量鲜血，内含少量残渣。既往有乙肝病史。体检：一般情况较差，贫血貌，巩膜无黄染，血压10.6/8kPa，脉搏116次/分。心肺无异常，腹平软，无压痛，肝肋下未触及，无移动性浊音。血红蛋白70g/L,血小板计数 $56 \times 10^9/L$ ，该患者的护理措施不正确的是（ ）[单选题]\*

A. 立即配血，插三腔管

B. 开放较大静脉，快速补液

C. 及时准确应用止血药

D. 限制液体输入，使用利尿剂✓

E. 加强病情观察，防止急性肝衰竭

19. 静脉导管堵塞时，用尿激酶溶栓，尿激酶的浓度是（ ）[单选题] \*

A. 1000U/ml

B. 2000U/ml

C. 2500U/ml

D. 5000U/ml✓

E. 10000U/ml

20. 患者，女性，48岁，理发员。下肢酸胀、沉重5年，活动或休息后减轻。体检见小腿内侧有蚓状团

块，足靴区有色素沉着。该患者出现此病的主要诱因是（ ）[单选题] \*

A. 深静脉阻塞

B. 动脉硬化

C. 循环血量增多

D. 长期站立工作✓

21. 肝癌最常用的定位诊断方法和高发人群首选的普查工具是（ ）[单选题] \*

A. 肝动脉造影

B. CT

C. B超✓

D. 正电子发射计算机断层扫描

E. MRI

22. 男性，60岁。诊断为原发性肝癌，行肝切除术后3天，出现嗜睡、烦躁不安、黄疸、少尿等，应

考虑 ( ) [单选题] \*

- A. 胆汁性腹膜炎
- B. 膈下脓肿
- C. 肝性脑病✓
- D. 内出血
- E. 休克

23. 踝/肱指数的正常值是 ( ) [单选题] \*

- A. 1.0
- B. 0.9-1.3✓
- C. 1.0-1.3
- D. >1.0

24. 液体渗出按照 INS 标准分为 ? ( 1.0 分 ) [单选题] \*

- A. 2 级
- B. 3 级
- C. 4 级
- D. 5 级✓

25. 王先生, 60 岁, 阑尾切除术后第 5 天, 下床大便后, 突然出现胸部疼痛伴呼吸困难, 患者面色苍

白. 冷汗应 考虑的诊断为 ( ) [单选题] \*

- A. 呼吸困难
- B. 虚脱
- C. 胸痛
- D. 肺栓塞✓

26.诊断肺栓塞最可靠的检查是 ( ) [单选题] \*

- A. 动脉血气分析
- B. 肺动脉造影✓
- C. 心电图
- D. X 线胸片

27. 患者,男性,38岁,吸烟15年,每天30支左右,冷库工作8年。近来,右小腿持续性剧烈疼痛,不能行走,夜间加重,到医院就诊,体检:右小腿皮肤苍白,肌萎缩,足背动脉搏动消失。目前该患者最主要的护理诊断是 ( ) [单选题] \*

- A. 知识缺乏
- B. 组织灌注量改变
- C. 潜在皮肤完整性受损
- D. 舒适的改变:疼痛✓

28.深静脉血栓患者经抗凝.溶栓治疗时最严重的并发症是 ( ) [单选题] \*

- A. 肺栓塞
- B. 出血✓
- C. 血肿
- D. 患肢肿胀

29. 门静脉高压症的主要临床表现是 ( ) [单选题] \*

- A.腹胀.食欲减退
- B. 呕血和黑便✓
- C. 白细胞.血小板计数减少
- D. 肝肿大



E. 肝功能障碍

30.肺结核大咯血最主要的致死原因 ( ) [单选题] \*

A. 失血性休克 ILIL

B. 重度贫血 ILIL

C. 窒息 ILIL ✓

D. 心力衰竭 EVUR

E. 呼吸衰竭 EVUR

31. 张先生，男，35岁，呕血黑便2天，2天前因食鱼后出现呕吐，鲜红色血液，量500Mml。胃镜检查提示食管下段静脉曲张，B超提示肝硬化，脾大，中等量腹水。该患者最可能的诊断是？(1.0分) [单选题] \*

A. 门静脉高压症 ✓

B. 胃溃疡

C. 胰腺炎

D. 肝癌

32.诊断呼吸衰竭的血气标准是 ( ) [单选题] \*

A.  $\text{PaO}_2 < 8.6\text{kPa}(65\text{mmHg})$ 和(或)伴有  $\text{PaCO}_2 > 7.3\text{kPa}(55\text{mmHg})$ IL

B.  $\text{PaO}_2 < 6.7(50\text{mmHg})$ 和(或)伴有  $\text{PaO}_2 > 8.0\text{kPa}(60\text{mmHg})$ IL

C.  $\text{PaO}_2 < 8.0\text{kPa}(60\text{mmHg})$ 和(或)伴有  $\text{PaO}_2 > 7.3\text{kPa}(55\text{mmHg})$ IL ✓

D.  $\text{PaO}_2 < 8.0\text{kPa}(60\text{mmHg})$ 和(或)伴有  $\text{PaO}_2 > 6.7\text{kPa}(50\text{mmHg})$ I

E.  $\text{PaO}_2 < 8.6\text{kPa}(65\text{mmHg})$ 和(或)伴有  $\text{PaO}_2 > 6.7\text{kPa}(50\text{mmHg})$ IL

33. 足趾动脉收缩压 ( ) 提示患肢弥漫性缺血改变。( ) [单选题] \*

A.  $\leq 20\text{mmHg}$

B.  $\leq 30\text{mmHg}$  ✓

C.  $\leq 35\text{mmHg}$

D.  $\leq 40\text{mmHg}$

34. 患者, 男性, 38 岁, 吸烟 15 年, 每天 30 支左右, 冷库工作 8 年。近来, 右小腿持续性剧烈疼痛, 不能行走, 夜间加重, 到医院就诊, 体检: 右小腿皮肤苍白, 肌萎缩, 足背动脉搏动消失。为缓解症状, 重要的护理措施是 ( ) [单选题] \*

A. 患肢用热水袋保温

B. 要求患者绝对戒烟 ✓

C. 抬高患肢

D. 减少麻醉性镇痛药的应用

35. 血液从血库取出后 ( ) 输注。 ( ) [单选题] \*

A. 10-15 分钟

B. 30-60 分钟

C. 20-30 分钟

D. 30 分钟以内 ✓

36. 药物外渗指: 静脉输液过程中, ( ) 进入静脉管腔以外的周围组织。 ( ) [单选题] \*

A. 腐蚀性药物 ✓

B. 非腐蚀性药物

C. 刺激性药物

D. 非刺激性药物

37. 患者, 女性, 48 岁, 踝部轻度肿胀, 色素沉着, 久站后出现酸胀, 小腿有迂曲的静脉团, 诊断为原发性大隐静脉曲张, Perthes 试验阴性; 宜采取的治疗方案是 ( ) [单选题] \*

- A. 使用弹力绷带包扎
- B. 局部注射硬化剂
- C. 曲张静脉与深静脉吻合
- D. 大隐静脉高位结扎加分段剥脱术✓

38.术后肝性脑病发生率最高的分流术是 ( ) [单选题] \*

- A. 脾、肾静脉分流术
- B. 门静脉分流术✓
- C. 肠系膜上静脉、下静脉桥式分流术
- D. 肠系膜上静脉、下静脉侧分流术

39.王先生,42岁。2年前出现左下肢行走10余分钟后胀痛。休息片刻缓解,再行走后疼痛又出现。无吸烟史,发病前半年左足部外伤已治愈,护理体检:左下肢皮色较苍白,左足背动脉未触及。血栓闭塞性脉管炎病人的关键护理措施是 ( ) [单选题] \*

- A. 患肢局部加温保暖
- B. 要求病人绝对戒烟✓
- C. 尽量减少止痛剂的应用
- D.休息时抬高患肢,缓解疼痛
- E. 指导晚期病人做伯格运动

40.输液港封管液量应等于PORT系统内部及附加装置的内部容积基础上再加 ( ) [单选题] \*

- A. 20%✓
- B. 10%
- C. 50%
- D. 25%

41. 3 级静脉炎表现不包括 ( ) [单选题] \*

- A. 穿刺部位疼痛，伴有发红疼痛。
- B. 条索状物形成。
- C. 有脓液流出。 ✓
- D. 可触摸到条索状静脉。

42. 动脉手术后病人患肢制动 ( ) [单选题] \*

- A. 1 周
- B. 2 周 ✓
- C. 10 天
- D. 7 天

43. 为预防肺结核的发生和流行，在下列措施中最为关键的一环是 ( ) [单选题] \*

- A. 自出生后开始定期接种卡介苗 C1VD ✓
- B. 隔离排菌结核患者 C1VD
- C. 合理化疗治愈排菌患者 C1VD
- D. 加强营养、锻炼身体增强抵抗力 C1VD
- E. 为易感者及密切接触排菌患者预防性投药 C1VD

44. 经外周静脉置入中心静脉导管置管时应记录哪些内容 ( ) [单选题] \*

- A. 双侧上臂臂围并与置管前对照
- B. 穿刺静脉
- C. 穿刺日期
- D. 导管刻度. 导管尖端位置
- E. 以上全对 ✓

45. 患者，男性，35 岁。长期吸烟，右下肢反复发作静脉炎，并有间歇性跛行，最可能的诊断是( ) [单选题] \*

- A. 雷诺病
- B. 动脉栓塞
- C. 大动脉炎
- D. 血栓闭塞性脉管炎 ✓

46. 静脉血管术后患者患肢宜高于心脏水平( ) [单选题] \*

- A. 10-20cm
- B. 20-30cm ✓
- C. 30-40cm
- D. 20-40cm

47. 肺癌病人进行纤维支气管镜检查后不能立即喝水，是为了防止( ) [单选题] \*

- A. 呕吐 EJWG
- B. 喷嚏 EJWG ✓
- C. 呃逆 EJWG
- D. 误吸 EJWG
- E. 咳嗽 EJWG

48. PORT 在治疗间歇性应至少每( )周维护 1 次？( 1.0 分) [单选题] \*

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周 ✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/62623211114010044>