

助理医师考试临床助理(习题卷132)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]患者，4岁，其父牵拉左手上楼梯时，患儿啼哭，诉肘部疼痛，检查：肘关节无明显异常，桡骨头处有压痛。X线检查无明显异常。上肢关节最容易脱位的部位是

- A) 肘关节
- B) 肩锁关节
- C) 尺桡关节
- D) 腕关节
- E) 肩关节

2. [单选题]胃及十二指肠疾病以出血为主要表现者，其鉴别主要依靠

- A) 钡餐透视
- B) 胃液分析
- C) 下胃管
- D) 急诊胃镜检查
- E) 以上都不是

3. [单选题]外源性致热原的特点，正确的是

- A) 分子量较小
- B) 其致热原性可被蛋白酶类所破坏
- C) 能激活血液中的中性粒细胞和单核细胞
- D) 直接作用于体温调节中枢
- E) 在体内最终由肝、肾灭活和排泄

4. [单选题]中毒性巨结肠的诱因不包括（ ）。

- A) 高钾
- B) 使用阿片类制剂
- C) 钡剂灌肠
- D) 使用胆碱能药物
- E) 低钾

5. [单选题]阑尾残株炎所致的肠梗阻是

- A) 动力性肠梗阻
- B) 粘连性肠梗阻
- C) 单纯性肠梗阻
- D) 肠扭转
- E) 绞窄性肠梗阻

6. [单选题]甲亢手术前准备用

- A) 甲状腺素
- B) α -受体阻滞剂

- C) 复方碘溶液
- D) 氢化可的松
- E) 去氨加压素

7. [单选题]对确诊SLE和判断其活动性参考价值最大的抗体是

- A) 抗核抗体
- B) 抗dsDNA抗体
- C) 抗Sm抗体
- D) 抗RNP抗体
- E) 抗Ro抗体

8. [单选题]生后3个月时应预防接种（初种）上述哪种制剂

- A) 麻疹疫苗
- B) 乙型脑炎疫苗
- C) 脊髓灰质炎疫苗
- D) 百日咳—白喉—破伤风混合疫苗
- E) 卡介苗

9. [单选题]下列哪个疾病属于慢性肉芽肿性炎

- A) 大叶性肺炎
- B) 结核
- C) 慢性阑尾炎
- D) 肠阿米巴病
- E) 慢性支气管炎

10. [单选题]室颤临床表现不包括

- A) 意识丧失
- B) 抽搐
- C) 呼吸停顿甚至死亡
- D) 听诊心音消失
- E) 失忆

11. [单选题]导致非典型苯丙酮尿症，是由于缺乏

- A) 苯丙氨酸羟化酶
- B) 酪氨酸羟化酶
- C) 四氢生物蝶呤
- D) 5-羟色胺
- E) 多巴胺

12. [单选题]新生儿缺氧缺血性脑病时发生惊厥，首选的药物是

- A) 甘露醇
- B) 地塞米松
- C) 苯巴比妥钠
- D) 苯妥英钠
- E) 呋塞米

13. [单选题]"患者仰卧在躺椅上畅所欲言，治疗者在倾听和释问中解释患者的潜意识、情绪或幼年的特殊生活事件的方法"称为

- A) 生物反馈
- B) 自由联想
- C) 系统脱敏

- D) 梦的分析
- E) 厌恶疗法

14. [单选题] 医疗卫生人员在实施接种前应做哪些工作不包括

- A) 医疗卫生人员发现预防接种异常反应、疑似预防接种异常反应或者接到相关报告的，应当依照预防接种工作规范及时处理，并立即报告所在地的疾病预防控制机构
- B) 对符合接种条件的受种者实施接种，并依照国务院卫生主管部门的规定，填写并保存接种记录
- C) 告知受种者或者其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应以及注意事项
- D) 询问受种者的健康状况以及是否有接种禁忌等情况，并如实记录告知和询问情况
- E) 对于因有接种禁忌而不能接种的受种者，医疗卫生人员应当对受种者或者其监护人提出医学建议

15. [单选题] 氨甲苯酸(PAMBA)的作用是

- A) 促进肝脏合成凝血酶原
- B) 对抗纤溶酶原激活因子
- C) 促使毛细血管收缩
- D) 增加血小板聚集
- E) 抑制纤溶酶原

16. [单选题] 诊断颅压高可靠依据是

- A) 视盘水肿
- B) 剧烈头痛
- C) 频繁呕吐
- D) 癫痫发作
- E) 双外展神经麻痹

17. [单选题] 以下是肥厚型心肌病常见的临床表现，除了

- A) 劳力性呼吸困难
- B) 胸痛
- C) 起立或运动时眩晕甚至晕厥
- D) 猝死
- E) 咯血

18. [单选题] 吸收是指药物进入

- A) 胃肠道过程
- B) 血液循环过程
- C) 细胞外液过程
- D) 细胞内过程
- E) 靶器官过程

19. [单选题] 提示血容量不足

- A) 中心静脉压很低，尿量多
- B) 中心静脉压偏低，尿量少
- C) 中心静脉压偏低，尿量多
- D) 中心静脉压偏高，尿量多
- E) 中心静脉压很高，尿量少

20. [单选题] 阴囊疼痛，畏寒，发热

- A) 慢性前列腺炎
- B) 急性附睾炎
- C) 膀胱炎
- D) 淋病性尿道炎

E) 肾积脓

21. [单选题] 医师申请执业注册，卫生行政是否准予注册决定的法定期限是

- A) 15 日
- B) 30 日
- C) 45 日
- D) 60 日
- E) 90 日

22. [单选题] 男性20岁，餐后搬运重物，突然脐周围剧痛，伴恶心呕吐为胃内容物，无血，发病6小时后急诊入院。查体：体温37℃，脉搏120次/分。血压12 / 8kPa，急性病容，大汗淋漓，呼吸急促，心肺未见异常，腹胀左侧脐旁触及可疑肿块，腹肌紧张，压痛明显，可疑移动性浊音，肝浊音界存在，肠鸣音减弱，直肠指诊未见异常，诊断应考虑为

- A) 急性胰腺炎
- B) 急性溃疡病穿孔
- C) 急性胆囊炎
- D) 急性肠扭转
- E) 以上都不是

23. [单选题] 下列哪项措施对股骨头缺血坏死的治疗不利

- A) 早期离床活动，促进局部血运
- B) 股骨头钻孔，促进血管长入
- C) 让患者扶双拐，长期不负重
- D) 手术加压固定
- E) 采用股骨头内血管植入

24. [单选题] 关于动脉血压的影响因素正确的是

- A) 搏出量，主要影响舒张压
- B) 心率，主要影响收缩压
- C) 外周阻力（血管口径），主要影响舒张压
- D) 大中动脉弹性贮器作用减弱，收缩压下降
- E) 循环血量与血管容量的比例减小，收缩压升高

25. [单选题] 肝硬化门脉高压患者，出现全血细胞减少最主要的原因是

- A) 营养不良
- B) 脾功能亢进
- C) 溶血
- D) 消化道出血
- E) 病毒感染

26. [单选题] 低血容量性休克抑制期微循环特点是

- A) 静脉回心血量增加
- B) 微循环收缩
- C) 心排出量正常
- D) 微循环扩张
- E) 弥漫性血管内凝血

27. [单选题] 按测验的组织方式心理测验可分为

- A) 团体测验和个别测验
- B) 速度测验、难度测验
- C) 纸笔测验、操作测验、口头测验、电脑测验
- D) 描述性测验、诊断性测验、预示性测验

E) 能力测验和人格测验

28. [单选题] 男，25岁。发热伴皮肤出血点2周，查体：双下肢皮肤可见出血点，胸骨下段压痛（+），肝肋下3cm，脾肋下1.5cm。血液检查：Hb 105g/L，WBC $2.0 \times 10^9/L$ ，分类可见幼稚细胞，PLT $35 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断是（ ）。

- A) 再生障碍性贫血
- B) 脾功能亢进
- C) 巨幼细胞贫血
- D) 急性白血病
- E) 阵发性睡眠性血红蛋白尿

29. [单选题] 去甲肾上腺素使浦肯野细胞自律性增高通过

- A) 最大复极电位降低
- B) 阈电位水平下降
- C) I_f电流增强
- D) 膜对Ca²⁺通透性增高
- E) I_{si}电流增大

30. [单选题] 炎症的基本病理变化是

- A) 组织、细胞的变性坏死
- B) 组织的炎性充血和水肿
- C) 病变组织变质、渗出、增生
- D) 红、肿、热、痛、功能障碍
- E) 周围血液中白细胞增多和炎性白细胞浸润

31. [单选题] 男婴，6个月。因呕吐腹泻3天，加剧1天，尿少来院急诊，体温38℃，眼窝前囟明显凹陷，皮肤弹性较差。血Na⁺140mmol/L，动脉血气：pH7.2，BE-12mmol/L，最适宜处理是

- A) 静注25%葡萄糖溶液
- B) 禁食6小时，以后牛奶喂养
- C) 静脉注射呋塞米（速尿）
- D) 2:3:1溶液静滴
- E) 1.4%碳酸氢钠静滴

32. [单选题] 颅内压增高时不正确的处理是（ ）。

- A) 应用脱水剂
- B) 液体摄入量限制在每日1500~2000ml
- C) 密切观察生命体征
- D) 轻泻剂疏通大便
- E) 高位灌肠

33. [单选题] 低钾血症患者补钾速度一般不宜超过（ ）。

- A) 12mmol/h
- B) 20mmol/h
- C) 30mmol/h
- D) 40mmol/h
- E) 50mmol/h

34. [单选题] 恶性肿瘤疗效的关键环节是

- A) 手术切除肿瘤
- B) 综合治疗
- C) 免疫和基因治疗
- D) 中西医结合治疗

E) 早期诊断和治疗

35. [单选题] 患者女性，14岁，12岁月经初潮。月经周期紊乱，经期长短不一已有1年。肛门检查：子宫发育正常，双侧附件（-），最可能的诊断是

- A) 黄体萎缩不全
- B) 无排卵性功能失调性子宫出血
- C) 子宫黏膜下肌瘤
- D) 黄体功能不全
- E) 子宫内膜息肉

36. [单选题] 切断动物颈部迷走神经后动物的呼吸将变为

- A) 变深变慢
- B) 变浅变慢
- C) 不变
- D) 变浅变快
- E) 变深变快

37. [单选题] 对高血压合并糖尿病患者，血压控制在

- A) 130/80mmHg
- B) 130/85mmHg
- C) 135/85mmHg
- D) 140/90mmHg
- E) 150/90mmHg

38. [单选题] 患者，女，55岁。门脉高压病史4年，可能的并发症不包括（ ）。

- A) 食管胃底静脉曲张
- B) 痔疮
- C) 腹壁脐周静脉曲张
- D) 下肢静脉曲张
- E) 腹膜后静脉丛充血

39. [单选题] 医师何某在取得医师资格证书和执业证书后的一年里，擅自从事婚前医学检查、遗传病诊断和产前诊断，虽经卫生行政部门制止，仍不改正，并又施行终止妊娠手术。依据《母婴保健法》规定，应对何某给予的行政处罚是

- A) 罚款
- B) 没收违法所得
- C) 没收非法财物
- D) 吊销执业许可证
- E) 行政拘留

40. [单选题] 下列哪种平喘药对 β_2 受体有选择性激动作用

- A) 色甘酸钠
- B) 沙丁胺醇
- C) 异丙肾上腺素
- D) 氨茶碱
- E) 肾上腺素

41. [单选题] 影响子宫复旧的主要因素是（ ）。

- A) 宫内感染
- B) 分娩次数
- C) 卧床时间
- D) 产妇情绪

E) 是否哺乳

42. [单选题] 患者女，39岁。呕吐、腹泻2天，烦躁不安半天急诊入院。查体：BP120/80mmHg，神志恍惚，巩膜中度黄染，颈部可见数枚蜘蛛痣。心肺未见异常，腹软，肝肋下未触及，脾肋下3cm。双上肢散在出血点，Hb90g/L，WBC 2.22×10^9

9

/L，血糖7.0mmol/L，尿糖(+)，尿酮(-)，尿镜检(-)。最可能的诊断是

- A) 肝性脑病
- B) 糖尿病酮症酸中毒
- C) 高渗性非酮症糖尿病昏迷
- D) 尿毒症
- E) 脑血管病

43. [单选题] 女性，40岁，急性化脓性阑尾炎行阑尾切除术后一周，伤口愈合良好，发热，伴里急后重，大便次数增多，6~8次/日，带黏液，直肠指检直肠前壁饱满，有触痛和波动感。可能的诊断是

- A) 盆腔脓肿
- B) 肠梗阻
- C) 肠间脓肿
- D) 肠道菌群失调
- E) 肠粘连

44. [单选题] 男，重体力劳动工人，腰腿痛，并向左下肢放散，咳嗽，喷嚏时加重。检查腰部活动明显受限，并向左倾斜，直腿抬高试验阳性。病程中无低热、盗汗、消瘦症状。首先考虑的诊断是

- A) 腰肌劳损
- B) 腰椎管狭窄症
- C) 腰椎间盘突出症
- D) 强直性脊柱炎
- E) 腰椎结核

45. [单选题] 降结肠癌早期表现

- A) 排便习惯与粪便改变
- B) 腹部肿块
- C) 腹痛
- D) 腹胀
- E) 面色苍白、乏力

46. [单选题] 甲氨蝶呤抗肿瘤的主要机制是

- A) 抑制二氢叶酸合成酶
- B) 抑制二氢叶酸还原酶
- C) 破坏DNA结构和功能
- D) 嵌入DNA干扰转录RNA
- E) 干扰蛋白质合成

47. [单选题] 不属于癌前病变的是

- A) 黏膜白斑病
- B) 甲状腺腺瘤
- C) 膀胱乳头状瘤
- D) 阴茎乳头状瘤
- E) 家族性腺瘤性息肉病

48. [单选题]下列关于脊髓的描述正确的是

- A) 在新生儿下端平齐第1腰椎下缘
- B) 颈膨大由第6颈节至第1胸节
- C) 有31个节段
- D) 前面有一条浅的前正中裂
- E) 成人从枕骨大孔延伸到第2腰椎下缘

49. [单选题]下列哪项符合二度 I 型房室传导阻滞的心电图表现? ()

- A) PP间期及RR间期均不等
- B) 相邻的PP间期进行性缩短
- C) 包含受阻P波在内的RR间期小于正常PP间期的两倍
- D) 最常见的传导比例为2:1
- E) 受阻P波前的一个PR间期延长

50. [单选题]既阻断 β 受体又阻断 α 受体的是

- A) 普萘洛尔
- B) 拉贝洛尔
- C) 阿托品
- D) 酚妥拉明
- E) 美托洛尔

51. [单选题]慢性病性贫血

- A) 血清铁增高, 总铁结合力正常, 血清铁蛋白正常或增高
- B) 血清铁降低, 总铁结合力降低, 血清铁蛋白增高
- C) 血清铁降低, 总铁结合力增高, 血清铁蛋白降低
- D) 血清铁降低, 总铁结合力降低, 血清铁蛋白降低
- E) 血清铁增高, 总铁结合力降低, 血清铁蛋白降低

52. [单选题]病毒性肝炎时, 肝细胞凋亡的病变是

- A) 肝细胞点状坏死
- B) 肝细胞大片坏死
- C) 肝细胞桥接坏死
- D) 肝细胞碎片状坏死
- E) 肝细胞嗜酸性坏死

53. [单选题]关于治疗单纯性肥胖症的措施不正确的是

- A) 限制热卡, 推荐高蛋白、低脂、低脂碳水化合物
- B) 应该养成少吃多餐、减慢进食速度, 细嚼慢咽等良好习惯
- C) 增加运动每天坚持运动30分钟, 活动量以运动轻松愉快
- D) 鼓励孩子自觉地控制食量, 树立信心, 坚持运动结构锻炼
- E) 可以通过节食, 杜绝吃肉食

54. [单选题]对1,25-(OH)₂-D₃的叙述, 错误的是

- A) 维生素D₃在肝、肾经羟化酶催化转变而成
- B) 促进小肠对钙、磷的吸收
- C) 加速破骨细胞的溶骨作用
- D) 促进成骨细胞的成骨作用
- E) 抑制肾小管对钙、磷的吸收

55. [单选题]肿瘤临床表现最主要的特征

- A) 肿物

- B) 消瘦
- C) 贫血
- D) 疼痛
- E) 溃疡

56. [单选题] 女孩，2岁。不会走路和说话。查体：身高65cm，眼裂小，眼距宽，鼻梁低，全身皮肤细腻，胸骨左缘3~4肋间可闻3/6级收缩期杂音。为明确诊断，首选的检查是（ ）。

- A) 心电图
- B) 尿液有机酸分析
- C) 血清T3、T4、TSH测定
- D) 胸部X线片
- E) 染色体核型分析

57. [单选题] 一般对轻度急性糜烂出血性胃炎的治疗，哪项不必要

- A) 去除病因
- B) H₂受体拮抗剂
- C) 内镜下止血
- D) 胃粘膜保护剂
- E) 质子泵抑制剂

58. [单选题] 患儿，10个月，母乳喂养近1个月面色渐苍白，不愿活动，食欲差，查体发现肝脏增大，于右肋下可触及3cm，心率124次/分，节律不整，心音尚有力，其肝大的原因最大的可能是

- A) 急性肝炎
- B) 正常现象
- C) 骨髓外造血
- D) 营养不良
- E) 心功能不全

59. [单选题] 患儿，5周岁。两周前曾患上感。目前不规则发热，易疲倦，脸色略苍白。查体发现，心率增快，心尖部第一心音减弱，并可闻及早搏，心电图检查：P-R间期延长，ST段下移，实验室检查：C反应蛋白增高[问题1][题]该患儿的临床诊断最可能是什么

- A) 病毒性心肌炎
- B) 风湿性心肌炎
- C) 结核性心包炎
- D) 风湿性心包炎
- E) 类风湿性心包炎

60. [单选题] 在队列研究中，提高调查诊断技术，同等地对待每个研究对象，主要是为了减少

- A) 失访偏倚
- B) 信息偏倚
- C) 混杂偏倚
- D) 回忆偏倚
- E) 选择偏倚

61. [单选题] 10名高血压患者服用某种降压药，比较服药前后平均血压有无差别，可进行

- A) 成组设计检验
- B) 成组设计t检验
- C) 配对设计u检验
- D) 配对设计 γ

2

检验

E) 配对设计t检验

62. [单选题]男，58岁，平素健康，近半月来夜间阵发性哮喘发作。被迫坐位。气短，10分钟后自行缓解，今晚加重来诊。肥胖，BP170 / 110mmHg，R25次 / 分，P110次 / 分，两肺底部湿啰音，无哮鸣音，初步诊断为

- A) 支气管哮喘
- B) 心源性哮喘
- C) 喘息性支气管炎
- D) 运动性哮喘
- E) 以上都不是

63. [单选题]肾病综合征出现大量蛋白尿其主要机制是

- A) 肾小球滤过膜内皮窗孔径异常过大
- B) 肾小球滤过膜电荷屏障受损
- C) 肾小球上皮细胞足突裂隙增大
- D) 肾血流量增加
- E) 肾静脉回流障碍

64. [单选题]新生儿唾液不正确的

- A) 3~4个月唾液分泌开始增加
- B) 5~6个月明显增多
- C) 常出现生理流涎
- D) 小婴儿唾液中含淀粉酶高
- E) 新生儿唾液分泌少

65. [单选题]10个月男孩，诊断为"化脓性脑膜炎"，经有效抗生素的治疗10天，病情好转，体温正常，近3天又发烧、抽搐、前卤饱满，颅缝分离。首先考虑到

- A) 脑水肿
- B) 脑室管膜炎
- C) 脑性低钠血症
- D) 硬脑膜下积液
- E) 脑积水

66. [单选题]急性骨髓炎与恶性骨肿瘤鉴别诊断的主要依据是

- A) 局部肿胀的程度
- B) 局部穿刺所见
- C) 发热的程度
- D) 血沉是否增快
- E) 局部疼痛程度

67. [单选题]男，70岁。上腹痛1年，进食后加重，大便10次/天，可见脂肪滴，查体：中腹部压痛（+），腹部B超，胰腺多发钙化灶。应给予的药物是（ ）。

- A) 解痉止痛药物
- B) 胰酶制剂
- C) 消炎利胆药物
- D) 钙离子阻滞剂
- E) 质子泵抑制剂

68. [单选题]肾绞痛发作时，首选的治疗方法是（ ）。

- A) 抗感染治疗
- B) 口服中药

- C) 局部热敷
- D) 针灸
- E) 解痉止痛

69. [单选题]对再生障碍性贫血患者采取输血治疗，应给予输注（ ）。

- A) 全血
- B) 少白细胞的红细胞
- C) 血小板
- D) 冷沉淀
- E) 血浆

70. [单选题]对传染患者或疑似传染患者污染的场所和物品，医疗机构应当及时采取（ ）。

- A) 封闭场所并销毁物品
- B) 强制隔离治疗
- C) 必要的卫生处理
- D) 报告上级卫生行政机关处理
- E) 提请卫生防疫部门处理

71. [单选题]某肝硬化患者，今日进餐时突发呕血，量约400ml，遂急诊来院治疗。医生为预防发展为肝性脑病，重要治疗措施为

- A) 加强保肝治疗
- B) 应用左旋多巴
- C) 弱酸溶液洗肠
- D) 复方氨基酸静点
- E) 纠正酸碱平衡

72. [单选题]哪种疾病用青霉素治疗可引起赫氏反应

- A) 流行性脑脊髓膜炎
- B) 草绿色链球菌心内膜炎
- C) 大叶性肺炎
- D) 气性坏疽
- E) 梅毒

73. [单选题]药物的副作用是指

- A) 治疗量时出现的与用药目的无关的作用
- B) 用量过大或用药时间过长出现的对机体有害的作用
- C) 继发于治疗作用后出现的一种不良后果
- D) 与剂量无关的一种病理性免疫反应
- E) 停药后血药浓度降至阈浓度以下时出现的生物效应

74. [单选题]急性化脓性骨髓炎抗生素治疗应选择下列哪项

- A) 体温正常后继续用药1周
- B) 体温正常后继续用药1~2周
- C) 体温降至正常后即停药
- D) 体温正常后继续用药3天
- E) 体温正常后继续用药2~3周

75. [单选题]患者，女，37岁，近一周感腰痛，伴有尿频、尿急等不适，查体：血压

21.3 / 13.3 kPa (160 / 100 mmHg)，尿蛋白(+)，沉渣红细胞8~10 / HP，白细胞15~20 / HP，肾盂造影示右肾缩小，肾盏扩张，可能的诊断是

- A) 慢性肾炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/636000222204010134>